
BEYKOZ'un KUŞLARI ve TABİAT ALANLARI

Berat Akkaş
Arda Dönerkayalı
Umut Güngör
Ergün Bacak
Vedat Beşkardeş





BeykozBelediyesi

BEYKOZ
KİTAPLIĞI







BEYKOZ'un KUŞLARI ve TABİAT ALANLARI

YAZARLAR

Berat Akkaş • Arda Dönerkayalı • Umut Güngör
Ergün Bacak • Vedat Beşkardeş

FOTOĞRAFÇILAR

Arda Dönerkayalı • Berat Akkaş • Emrah Kayhan
Umut Güngör • Mustafa Özdemir • Hüseyin Buğday
Turhan Alak • Mücahit Oğuzhan Topçu
Ozan Abdullah Karaoğlan • Nevzat Dönerkayalı,
Ergün Bacak • Elif Dilara Gülderen *(İllüstratör)*

BEYKOZ
KİTAPLIĞI

Beykoz Kitaplığı: 4
Çevre & Yaşam

Yayın Koordinasyon
Bünyamin Korkmaz
Basri Akdemir

Yayın Hazırlık
Muzaffer Topcu
Aykut Nasip Kelebek

Beykoz'un Kuşları ve Tabiat Alanları

Yazarlar
Berat Akkaş, Arda Dönerkayalı, Umut Güngör,
Ergün Bacak, Vedat Beşkardeş

Editör
Sezgin Çevik

ISBN: 978-605-06784-1-3

Yapım
buzzagi
media solutions

Baskı: **Seçil Ofset**
100. Yıl Mahallesi, Massit Matbaacılar Sitesi,
4. Cadde No: 77 Bağcılar, İSTANBUL
Sertifika No: 44903

1. Baskı, Temmuz 2020
Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları No: 36

BeykozBelediyesi

İçindekiler

Takdim 10
Sunuş 11

GİRİŞ 13
Kuşlar Hakkında Genel Bilgi 15

BEYKOZ'UN TABİAT ALANLARI VE YABAN HAYATI 23
Polonezköy Tabiat Parkı 29
Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı 32
Mihrabat Tabiat Parkı 34
Göztepe Tabiat Parkı 36
Elmasburnu Tabiat Parkı 38
Riva Deresi, Sazlıkları, Çayırları ve Sahili 40
Toygartepe Göç Gözlem Noktası 46
Beykoz Boğaziçi Sahil Şeridi 51
PoyrazköyLimanı 53
Anadolu Feneri ve Kabakoz 55
Anadolu Kavağı ve Yoros Kalesi 58
Beykoz Korusu 60
Kaymakdonduran Mesire Ormanı 63
Karlıtepe Mesire Alanı 65
Beykoz Ormanları 67

KUŞ BİLGİLERİ 71
Kuş Topoğrafisi 72
Bıldırcın 74
Sülün 75
Kuğu 76
Suna 77
Çıkrıkçın 78
Kaşıkgaga 79
Boz Ördek 80
Fiyu 81
Yeşilbaş 82
Kılkuyruk 83
Çamurcun 84
Elmabaş Patka 85
Tepeli Patka 86
Çobanaldatan 87
Ebabil 88
Boz Ebabil 89
Akkarınlı Ebabil 90
Guguk 91
Kaya Güvercini 92
Tahtalı 93
Gökçe Güvercin 94
Üveyik 95
Kumru 96
Küçük Kumru 97
Sukılavuzu 98
Bataklık Suyelvesi 99
Benekli Suyelvesi 100
Sutavuğu 101
Sakarmeke 102
Turna 103
Küçük Batağan 104
Bahri 105
Karaboyunlu Batağan 106
Uzunbacak 107

Kızkuşu 108
Altın Yağmurcun 109
Gümüş Yağmurcun 110
Halkalı Cılıbıt 111
Halkalı Küçük Cılıbıt 112
Dağ Cılıbıtı 113
Kervançulluğu 114
Çamurçulluğu 115
Döğüşkenkuş 116
Karakarınlı Kumkuşu 117
Küçük Kumkuşu 118
Çulluk 119
Suçulluğu 120
Dere Düdükçünü 121
Yeşil Düdükçün 122
Orman Düdükçünü 123
Kızılbacak 124
Bataklık Düdükçünü 125
Yeşilbacak 126
Bataklıkkırlangıcı 127
İncegagalı Martı 128
Karabaş Martı 129
Küçük Martı 130
Akdeniz Martısı 131
Küçük Gümüş Martı 132
Hazar Martısı 133
Gümüş Martı 134
Karasırtlı Martı 135
Karagagalı Sumru 136
Sumru 137
Bıyıklı Sumru 138
Akkanatlı Sumru 139
Kara Sumru 140
Karagerdanlı Dalgıç 141
Yelkovan 142
Leylek 143
Kara Leylek 144
Küçük Karabatak 145
Tepeli Karabatak 146
Karabatak 147
Çeltikçi 148
Kaşıkçı 149
Balaban 150
Küçük Balaban 151
Gece Balıkçılı 152
Alaca Balıkçıl 153
Sığır Balıkçılı 154
Gri Balıkçıl 155
Erguvani Balıkçıl 156
Büyük Ak Balıkçıl 157
Küçük Ak Balıkçıl 158
Ak Pelikan 159
Balık Kartalı 160
Kızıl Akbaba 161
Küçük Akbaba 162
Yılan Kartalı 163
Küçük Kartal 164
Küçük Orman Kartalı 165
Büyük Orman Kartalı 166
Şah Kartal 167
Bozkır Kartalı 168
Şahin 169
Kızıl Şahin 170
Paçalı Şahin 171
Arı Şahini 172
Saz Delicesi 173
Gökçe Delice 174
Çayır Delicesi 175
Bozkır Delicesi 176
Kara Çaylak 177
Yaz Atmacası 178
Atmaca 179
Çakırkuşu 180
Kulaklı Orman Baykuşu 181
İshakkuşu 182
Alaca Baykuş 183
Kukumav 184
İbibik 185
Gökkuzgun 186
Yalıçapkını 187
Arıkuşu 188
Boyunçeviren 189
Alaca Ağaçkakan 190
Orman Alaca Ağaçkakanı 191

Küçük Ağaçkakan 192
Ortanca Ağaçkakan 193
Küçük Yeşil Ağaçkakan 194
Yeşil Ağaçkakan 195
Küçük Kerkenez 196
Kerkenez 197
Aladoğan 198
Ada Doğanı 199
Bozdoğan 200
Delice Doğan 201
Gökdoğan 202
Yeşil Papağan 203
İskender Papağanı 204
Kızılsırtlı Örümcekkuşu 205
Kızılbaşlı Örümcekkuşu 206
Maskeli Örümcekkuşu 207
Karaalınlı Örümcekkuşu 208
Büyük Örümcekkuşu 209
Sarıasma 210
Alakarga 211
Saksağan 212
Küçük Karga 213
Ekin Kargası 214
Leş Kargası 215
Kuzgun 216
Mavi Baştankara 217
Büyük Baştankara 218
Çam Baştankarası 219
Kayın Baştankarası 220
Uzunkuyruklu Baştankara 221
Orman Toygarı 222
Tarlakuşu 223
Tepeli Toygar 224
Bozkır Toygarı 225
Boğmaklı Toygar 226
Kum Kırlangıcı 227
Kır Kırlangıcı 228
Ev Kırlangıcı 229
Kızıl Kırlangıç 230
Kamışbülbülü 231
Çıvgın 232
Söğütbülbülü 233
Orman Çıvgını 234
Büyük Kamışçın 235
Çalı Kamışçını 236
Saz Kamışçını 237
Kındıra Kamışçını 238
Bataklık Kamışçını 239
Ak Mukallit 240
Sarı Mukallit 241
Karabaşlı Ötleğen 242
Boz Ötleğen 243
Küçük Akgerdanlı Ötleğen 244
Akgerdanlı Ötleğen 245
Maskeli Ötleğen 246
Çizgili Ötleğen 247
Çalıkuşu 248
Sürmeli Çalıkuşu 249
Çitkuşu 250
Sıvacı 251
Bahçe Tırmaşıkkuşu 252
Sığırcık 253
Alasığırcık 254
Karatavuk 255
Tarla Ardıcı 256
Kızıl Ardıç 257
Öter Ardıç 258
Ökse Ardıcı 259
Boğmaklı Ardıç 260
Benekli Sinekkapan 261
Halkalı Sinekkapan 262
Kara Sinekkapan 263
Alaca Sinekkapan 264
Küçük Sinekkapan 265
Kızılgerdan 266
Bülbül 267
Benekli Bülbül 268
Kızılkuyruk 269
Kara Kızılkuyruk 270
Çayır Taşkuşu 271
Taşkuşu 272
Sibirya Taşkuşu 273
Kuyrukkakan 274
Boz Kuyrukkakan 275

Karakulaklı Kuyrukkakan 276
Serçe 277
Ağaç Serçesi 278
Söğüt Serçesi 279
Dağbülbülü 280
Ak Kuyruksallayan 281
Dağ Kuyruksallayanı 282
Sarı Kuyruksallayan 283
Sarıbaşlı Kuyruksallayan 284
Kır İncirkuşu 285
Çayır İncirkuşu 286
Ağaç İncirkuşu 287
Dağ İncirkuşu 288
Kızılgerdanlı İncirkuşu 289
İspinoz 290
Dağ İspinozu 291
Kocabaş 292
Çütre 293
Florya 294
Ketenkuşu 295
Çaprazgaga 296
Saka 297
Küçük İskete 298
Karabaşlı İskete 299
Tarla Çintesi 300
Sarı Çinte 301
Bahçe Çintesi 302
Kirazkuşu 303
Karabaşlı Çinte 304
Bataklık Çintesi 305
Beykoz'da Kaydı Olan
Diğer Kuş Türleri 306
Türlerin Listesi ve Koruma Durumu 308
Kaynakça 317

YAZAR VE FOTOĞRAFÇILAR 319
Yazarlar 321
Fotoğrafçılar 324
Kuş Fotoğrafları ve
Fotoğrafçıları Listesi 329

DİZİN 332

BEYKOZ'un KUŞLARI ve TABİAT ALANLARI

Kıymetli Hemşehrilerim

Güçlü toplumlar sadece kültürlerini değil tabiatlarını da özenle korur, bu ikisinin aynı bütünün parçaları olduğunu bilirler. Beykoz'umuz önemli mimari eserlerinin, kültür ve sanat dünyamızda yer edinmiş şahsiyetlerinin yanı sıra birbirinden değerli doğal güzellikleriyle de gözde bir ilçedir. İstanbul'un coğrafi zenginlikler açısından oldukça elverişli bir noktasında yer alan Beykoz'umuz; Boğaziçi'nde bulunmanın birçok avantajını yaşamakta, Marmara Denizi'yle Karadeniz'in birçok özelliğini bünyesinde barındırmakta ve geniş ormanlık arazilere ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizin çok zengin bir faunası vardır, özellikle de kuşlar bu hayvan çeşitliliğinin çok önemli bir parçasıdır.

"Beykoz'un Kuşları ve Tabiat Alanları" kitabı, Beykoz'daki kuşları ve tabiat alanlarını detaylı bir şekilde anlatmakta ve böylece ilçemizin doğal güzelliklerini fotoğraflar eşliğinde kayıt altına almaktadır. Bu kitapta Beykoz'umuzu büyüleyici renkleri ve gökyüzünü dolduran sesleriyle adeta bir cennet bahçesine dönüştüren 287 kuş türü hakkında kuşatıcı bilgiler de aktarılmış, böylece bu çalışma kuşlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için de bir kaynak kitap seviyesine yükseltilmiştir. Beykoz hakkındaki araştırmalara yeni bir boyut kazandıracak bu çalışmanın, gençlerimizdeki çevre farkındalığının ve tabiatı koruma bilincinin gelişimine de katkı sağlayacağını umuyorum.

Beykoz'umuz için ortaya konan her emek bizim için çok kıymetlidir. Bu vesileyle, başta "Beykoz'un Kuşları ve Tabiat Alanları" kitabının geniş yazar ve fotoğrafçı kadrosu olmak üzere, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Murat Aydın
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Okuyucular

Boğaz'ın incisi olan Beykoz; betonlaşmış şehrin gürültüsünden uzakta, harika doğa olaylarına tanık olabileceğiniz İstanbul'un huzur dolu ender ilçelerinden birisidir.

Kültür, sanat ve kadim tarihinin yanı sıra canlı çeşitliliği bakımından da ülkemiz açısından zengin ve önemli bir değere sahip olan Beykoz; içinde bulunduğu doğal tabiat alanlarıyla önemli bir yaban hayatını barındırmaktadır. Dünyanın önemli kuş göçü rotalarının üzerinde olup binlerce kuşa göç döneminde ev sahipliği yapmaktadır.

Beykoz'un Kuşları ve Tabiat Alanları kitabını hazırlayarak Beykoz'un doğal alanlarının önemini vurgulamayı, yaşadıkları çevrenin doğal potansiyelini okurlarımıza aktarmayı, bugüne kadar ilçe sınırları içinde görülmüş kuş türlerinin listesini detaylı özellikleriyle ve fotoğraflarıyla aktararak bir kaynak oluşturmayı amaçladık. Ayrıca bu kaynağın kuş gözlemciliği veya kuş fotoğrafçılığı yapmak isteyen doğaseverlerimize rehber bir kitap olmasını arzuladık.

Kitapta, yazar ekibinin ve fotoğrafçı ekibinin emeğinin yanı sıra kaynak olarak kullanılan kayıtlardan, kitaplardan ve kaynakları hazırlayan değerli insanların bilgilerinden de yararlanılmıştır.

Kitap çalışmasında bizlere fotoğrafları ile destek veren;
Emrah Kayhan, Mustafa Özdemir, Hüseyin Buğday, Turhan Alak, Mücahit Oğuzhan Topçu, Ozan Abdullah Karaoğlan, Nevzat Dönerkayalı, Burak Biçici'ye ve illüstrasyon çizimleri için Elif Dilara Gülderen'e teşekkürleri borç biliriz.

Bu projeye destek vererek hayata geçmesini sağlayan Beykoz Belediye Başkanı Sn. Murat Aydın'a, Başkan Yardımcısı Sn. Bünyamin Korkmaz'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sn. Basri Akdemir'e şükranlarımızı sunarız.

Yazar Ekibi

Berat AKKAŞ-Arda DÖNERKAYALI-Umut GÜNGÖR

Ergün BACAK-Vedat BEŞKARDEŞ

GİRİŞ



Kuşlar Hakkında Genel Bilgi

Kuşlar mükemmel uçuş kabiliyetleri, harika ötüşleri ve büyüleyici renkleriyle insanları her zaman cezbetmiştir. Bu sebeple insanoğlu, var olduğu günden bu yana yaşamının istisnasız her anında; bilimde, sanatta, sosyal ve kültürel alanda her zaman kuşlardan ya ilham almış ya da yararlanmıştır [1].

Jeolojik devirlere bakıldığında kuşların ilk ortaya çıkışları Mezozoyik dönemde Geç Jura zamanına rastlar. Bu da yaklaşık 160-180 milyon yıl önce ortaya çıktıklarını gösterir. Almanya'da bulunan ve çeşitli açılardan sürüngenlerle kuşlar arasında geçiş formu olarak kabul edilen *Archaeopteryx lithographica* tüylerinin olması sebebiyle en eski kuş fosillerinden biri olarak kabul edilebilir. Kuşlar uçabilmek için çeşitli adaptasyonlar geçirmiştir. Bunların en önemlisi sürüngenlerde olmayan tüylerin ortaya çıkışı, ağırlığın hafifletilmesi için içi boşalmış ve hava ile dolu kemiklerin bulunmasıdır. Bunun yanında uçuşa ve hava direncine uygun olarak kazanılan aerodinamik yapı, baş ağırlığının azaltılması için dişlerin kaybolması, idrar keselerinin olmayışı, yumurtalıkların sadece birinin olması ve gonadların sadece üreme zamanında büyük, normal zamanda küçük olması uçmayı kolaylaştırmak için ortaya çıkan diğer uyumlardır [3, 4].



Kuşların uçma yeteneği, onlara yeryüzünde tüm habitatlarda bulunabilme imkânı sağlar. Bu sebepten, orman, deniz, bozkır, dağların en yüksek zirveleri dahil olmak üzere çöller ve kutuplar gibi hemen hemen her habitat türünde yaşamaya uyum sağlamıştır. Örneğin Antarktika'nın soğuğunda bir pengueni, çölde bir devekuşunu, ormanda bir ağaçkakanı veya yerleşim yerlerinde insanlarla birlikte yaşamaya uyum sağlamış bir serçeyi düşündüğümüzde, kuşların yeryüzündeki canlı ve cansız şartlara (rüzgâr, sıcaklık, hava halleri ve türler arası, tür içi rekabet gibi) uyumda ne kadar başarılı olduklarını da anlayabiliriz.

Kuşlar, uçuşlarında aktif olarak kanat çırpabilir veya pasif olarak süzülme hareketi yapabilir. Kuşlarda kanat çırparak uçmada birçok değişken olduğu için kompleks bir sürü hareketi kapsamaktadır. Ancak basit olarak ifade etmek gerekirse,

uçuş sırasında kanatların önden arkaya doğru bir elips çizdiğini söyleyebiliriz. Süzülerek uçma genellikle büyük kuşların göçlerinde enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla yapılır. Göçmen kuşlar ısınan havanın yükselmesinden (termaller) faydalanarak yükselir, en yükseğe çıktıktan sonra kendilerini buradan bırakarak bir sonraki termale kadar süzülerek uçar. Böylelikle göç sırasındaki enerji kaybını minimuma indirirler [4].

Kuşların uçmalarında kuş tüylerinin önemi yadsınamaz. Bununla birlikte, tüyler kuş vücudunu sararak onları dış ortam şartlarından korur. Kuşlarda çeşitli tüy tipleri bulunmaktadır. Bunlar örtü tüyleri (kanat telekleri, kuyruk telekleri ve örtü telekleri), yarı örtü tüyleri, hav tüyleri, sert tüyler ve kıl tüyleridir. Örtü tüyleri büyük ve sert tüylerdir. Bir kuşun vücut, kanat ve kuyruğunun en uç kısmında bulunur. Hav tüyleri kuşu ortam sıcaklığına karşı korur. Yarı örtü tüyleri yapısal olarak örtü ve hav tüylerine benzer. Sıcaklık yalıtımında yardımcı olur. Sert tüyler özellikle kuşun gagası, burun ve göz etrafında bulunan tüylerdir. Buralara yabancı cisimlerin girişini engeller. [3, 4].

Kuşlar uçmalarının yanı sıra zıplayabilir, koşabilir, yürüyebilir, yüzebilir ve hatta dalabilir. Tipik bir kuş ayağı üçü öne biri de arkaya doğru yönelen parmaklara sahiptir. Tavuklar (Galliformes) takımı bu tipte ayaklara sahiptir. Bununla birlikte kuşların ayakları da yaşam şekillerine göre farklılık göstermektedir. Su kuşlarında ayaklar yüzmeye uyumlu şekilde perdeli veya çamurlu sularda yürümeye uyumlu yarı perdelidir. Ağaçkakanlarda tırmanmaya uygun olarak parmakların ikisi öne ikisi arkaya dönüktür. Yırtıcı olan kuş türlerinde ise avı yakalamaya uygun olarak ayaklar pençe şeklindedir. Penguenlerde kanatlar ve bacaklar yüzmeye elverişli olacak şekilde uyum sağlamıştır[3, 4].

Kuşların göze çarpan bir başka önemli özelliği sert bir gagalarının bulunmasıdır. Gaga nesli tükenmiş bazı dinozor türlerinde, kaplumbağa ve memelilerden ornitorenkte de bulunmasına rağmen kuşlarda en gelişmiş halini almıştır. Gaga kuşun beslenmesine göre farklılık göstermektedir. Bülbül, sinekkapan gibi böcekçil kuşlarda gaga böcekleri yakalamaya uygun olarak ince, kısa ve sivridir. Tohumlarla beslenenler ise tohumu açmaya yönelik olarak daha kalın ve güçlü bir gagaya sahiptir. Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcılarda ise yakaladıkları avı parçalamaya uygun olarak gaga ucu öne doğru çengel şeklinde eğiktir. Balıkçıllarda balığı yakalamaya uygun olarak gaga ince ve uzundur. Kıyı kuşlarında solucan ve böcek larvalarını yakalamaya uygun olarak uzun, ördeklerde suyu süzmeye uygun olarak kaşık şeklinde yayvan yapıdadır[3, 4].

Kuşlar tohum, meyve, böcek, leş ve diğer hayvanların avlama yoluyla birçok farklı besinle beslenebilir. Beslenme şekline göre de isimlendirilirler. Örneğin tohumlarla beslenene tohumcul (granivor), meyvelerle beslenene meyvecil (frugivor), her türlü besini ayırt etmeden tüketene hepçil (omnivor), diğer hayvanları avlayarak onlarla beslenene etçil (carnivor) ve ölü hayvanların leşlerini yiyenlere leşçil (scavenger) ve böceklerle beslenene böcekçil (insectivor) denilmektedir. Örneğin böcekçil kuşların tüm dünyada yaklaşık 400-500 milyon ton böceği avlayarak yok ettiğini düşündüğümüzde [5], kuşların ekosistemdeki besin zincirinde ne kadar değerli olduğunu da kavrayabiliriz. Bunun yanında leşlerin ortadan kaldırılmasında akbabalar, kuzgunlar, kargalar ve diğer leşçil kuşlar hastalıkların dünya üzerinde yayılmasını önlerken bir yandan da organik madde dönüşümüne çok büyük katkıda bulunurlar. Tarımsal açıdan zararlı

olan farelerin ortadan kaldırılmasında da kuşlara büyük iş düşmektedir. Şahinler, leylekler ve baykuşlar tarımsal zararların önlenmesinde çok faydalı işler yapar.

Kuşlar gerek polenlerin taşınmasına yardımcı olarak gerek tohum ve bitkilerle beslenerek birçok bitkinin de döllenmesine ve çoğalmasına hizmet eder. Ardıç ağacı tohumlarının etrafında bir reçine tabakası bulunduğundan tohumun doğrudan ekilmesiyle çimlenme sağlanamaz. Fakat ardıç kuşlarının bu meyveleri yiyerek tohumları dışkıladıklarında reçine tabakası ortadan kalkar. Tohumun çimlenmesi için engel ortadan kaldırılır ve tohum çimlenir. Benzer şekilde alakargalar kestaneleri toplayarak kış için ağaç deliklerine ya da toprağa gömerek saklar. Sakladıkları kestanelerin hepsini tekrar bulamadıkları için, toprağa gömdükleri kestaneler filizlenir. Bu nedenle alakargalar kestane ormanlarının devamlılığının sağlanmasında büyük emek sahibidir.

Görme kuşlardaki en önemli duyu organlarının başında gelmektedir. Bu sebeple gözlerin kafatasındaki büyüklüğü diğer duyu organlarına göre daha fazladır. Özellikle de kuşların uçuşu üç boyutlu bir hareketi kapsadığından, gözlerin diğer duyu organlarından daha gelişmiş ve iyi olması



yadsınamaz. Kuşların işitme duyusu dış kulak gelişmemesine rağmen bir insanınkine eşit düzeyde denilebilir. Kuşlar 10 kHz ile – 30000 kHz arasındaki sesleri duyar. Koklama duyuları ise az gelişmiş olmasına rağmen koku alma lobunun büyüklüğüyle ilişkilidir. Örneğin Hindi akbabaları leşlerin kokularını takip ederek çok uzaklardan leşe ulaşabilir[3, 4].

Kuşlar sıcakkanlı hayvanlardır, ortalama vücut sıcaklıkları 39-40 °C civarındadır. Sıcakkanlı olmak ortamdan bağımsız olarak hareket etmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, birçok kuş türü ortam şartları uygun olmadığında göç ederler [3, 4].

Kuşlar çok eşli veya tek eşli olabilir. Bununla birlikte, yumurtayla çoğalırlar. Dişi kuş yumurtladıktan sonra dişi kuş veya erkek kuş kuluçkaya yatarak yumurtayı dış ortam şartlarından ve yırtıcılardan korur. Yumurtanın çatlayıp içinden yavrunun çıkışı ve yavrunun büyütülmesi sırasında yavru bakımı mevcuttur. Her ne kadar bazen eşler birer birer beslenmek için yumurta ve yavrunun başından ayrılsalar da yumurta ve yavru bakımı genellikle her iki eşey tarafından paylaşılmaktadır [3, 4].

Belirli iki coğrafi alan arasında düzenli tekrarlanan ve periyodik gerçekleştirilen nüfus hareketine göç denir [6]. Memeliler, sürüngenler, balıklar ve böcekler gibi hayvan gruplarında da göç davranışı görülse de bunlardan hiçbiri kuşlardaki kadar gelişmiş, yaygın ve dikkat çekici değildir [7]. Palearktikteki kuşların %40'ı göçmendir. Palearktikte her yıl tahminen 5 milyar göçmen kuş, üreme alanlarını soğuk kışları geçirmek için terk ederek, daha sıcak alanlara yani besinin daha fazla bulunduğu yerlere göç eder. Türkiye'nin bulunduğu enlemlerde kuşlar genellikle kış ayları öncesinde güneye, üreme dönemi öncesi ise kuzeye doğru göç ederler. Yapılan çalışmalar kuşların

göçler sırasında aynı üreme ve kışlama alanlarını, aynı dinlenme noktalarını kullandığını göstermiştir [1, 4].

Günümüzde yaşayan en büyük kuş yaklaşık 2-2.5 m boyunda ve 60-120 kg ağırlığında olan Afrika devekuşu (*Struthio camelus*), en küçüğü ise yaklaşık 5.5 cm uzunluğunda ve 2-2.5 gr ağırlığında olan Arı sinekkuşudur (*Mellisuga helenae*). Hayvanlar aleminde Gökdoğan (*Falco peregrinus*) karadaki hız rekorunu elinde bulundurmaktadır. Avına dalışta hızı 300 km/sa'in üzerine çıkabilmektedir [1].

Kuşlar "La Fontaine'nin Karga ile Tilki" masalındaki gibi insanların düşündüğünün aksine zeki canlılardır. Papağanların taklit yeteneği, kargaların birkaç aşamalı bulmacaları çözerek besine ulaşmaları veya bazı videolarda karganın cevizi kırmak için yaya geçidine atarak arabaların, cevizin üzerinden geçmesini ve cevizin kırılmasını beklemesi ve kırmızı ışık yandığı ve arabalar durduğunda kırılan cevizin içini alarak yemesi, gerçekten parıltılı bir zeka örneğidir. Yine karlı bir günde çatıdan kavanoz kapağıyla kayarak oyun oynayan ve bundan keyif alan karga videosu da kargaların ne kadar zeki olabildiklerini göstermektedir.

Kuşlar, yeryüzünün balıklardan sonra en büyük omurgalı grubudur. Günümüzde 10770'i yaşayan, 158'i de yok olmuş kuş türü bulunmaktadır [2]. Şimdiye kadar ülkemizde 487 ve İstanbul'da 300'den fazla kuş türü gözlenebilmektedir. Beykoz ilçemizde yapılan gözlemlerden elde ettiğimiz verilere dayanarak 287 kuş türünün varlığından bahsedebiliriz. Bu sayı Türkiye'nin neredeyse yarısını kapsamaktadır.

Kuş Popülasyonlarını Tehdit Eden Faktörler

Doğal alanların yok oluşu, her ne kadar kuşların uyum yetenekleri fazla olsa dahi günümüzde birçok kuş türünün nesli, doğal alanların yok oluşuna paralel olarak tehlike altına girmiştir. Ülkemiz bunun en acı örneğini Yılanboyun kuşunda (*Anhinga rufa*) yaşamıştır. Her ne kadar Yılanboyun kuşunun nesli tehlike altında değilse bile Amik gölünün kurutulması sonucunda yaşam alanı tamamen bozulan Yılanboyunlar 1962'den beri ülkemizde görülmemektedir [8].

Bir zamanlar orman, sulak alan veya bozkır olan doğal alanların kullanım şekli, çeşitli sebeplerle (tarımsal alana dönüştürmek, fabrika kurmak gibi) insanlar tarafından değiştirilmektedir. Bu doğal alanların birçoğunun yerinde artık şehirler, fabrikalar veya tarımsal alanlar bulunmaktadır. Bu dönüşüm bazı kuş türlerine yarar sağlarken, bazılarının da buradan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. İnsanlarla yaşamaya uyum sağlamış kumrular, güvercinler ve serçeler gibi türler şehirlerde en fazla rastlanan veya gözlenen türler olurken ağaçkakanlara, bülbüllere, kuyrukkakanlara, kuyruksallayanlara, sıvacı kuşlarına ve daha doğal alanlarda yaşayan birçok türe şehirde rastlamanız çok düşük ihtimaldir.



Tarımsal ilaçlar (pestisit, herbisit ve fungisit gibi), tohumlarla böceklerle beslenen kuş türleri için en büyük tehditlerin başında gelmektedir. Birçok böcekçil ve tohumcul kuş türü zehirlenerek ölebilmektedir. Pestisitler bazen bu kuş türlerini ölümüne sebep olmasa da üreme başarısını azaltarak kuş popülasyonlarını tehdit etmektedir. Ülkemizde Kelaynaklar (*Geronticus eremita*) bunun en tipik örneğini oluşturur. Kelaynakların popülasyonlarının azalmasında pestisitlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Çok daha farklı ve ilginç bir örnek olarak Küçük akbaba (*Neophron percnopterus*) verilebilir. Küçük akbabanın dünya popülasyonunda önemli derecede azalmasının başında çiftlik hayvanlarının tedavisinde kullanılan Diclofenac içerikli ilaçların etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bu etki çiftlik hayvanlarının ölümünden sonra çevreye bırakılması veya vahşi çöp depolama alanlarına atılması ile, bu hayvanlarla beslenen küçük akbabaların üreme başarısının düşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Su hayatın temeli ve başlangıç noktası olarak tüm canlılar için çok önemlidir. Yeryüzünde sulak alanların yok oluşu ve su kirliliği birçok canlıyı dolayısıyla da kuşları olumsuz etkiler. Sulak alanlar ve çevreleri biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu yerleri oluşturur. Su kaynaklarının kurutulması veya insan faaliyetleri sonucunda kirlenmesi, sulak alan ekosistemlerinin dengesini bozar ve kuşların nesillerini tehdit ederek ölümlerine yol açar (bkz. *Anhinga rufa*).

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda kaçak ve kontrolsüz avcılık maalesef birçok hayvan türünün neslinin yok edilmesine sebep olmakta ve kuşlar da bundan nasibini almaktadır. Göçmen av kuşları bu konuda en şanssızı sayılabilir, bunun daha da vahimi kartal, şahin, akbaba ve doğan gibi ekosistemde besin zincirinin en üstünde olan yırtıcı kuşların vurularak öldürülmesidir. Bu da göçmen kuşların kaçak avcılığında uluslararası boyutta mücadele etmenin gerekliliğini ortaya koyar.

Beykoz sahip olduğu mükemmel tabiatı, yaban hayatı ve dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde bulunması nedeniyle çok değerli bir bölgedir. İlçemizde yaşayan tüm canlıların birer zenginlik olduğunu ve bu zenginliğimizi koruyarak gelecek kuşaklara da aktarmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Kuş Gözlemciliği ve Kuş Fotoğrafçılığı Nedir?

Kuş gözlemciliği, kuşların doğal hayatında gözlemlemeyi ve tanımayı esas alan, her yaş grubuna hitap eden, kuşları ve doğayı araştırmayı, anlamayı ve sevmeyi sağlayan çok güzel bir hobidir. Tüm dünyada olduğu gibi günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşması sonucunda ülkemizde de bu hobiye merak salan kişilerin sayısı artmıştır.

Kuş gözlemciliğinde, kuşların tanımlanabilmesi için rehber kitap, uzakta olan kuşları daha yakından görüp tanıyabilmek için bir dürbün ve gözlenen kuşların türünü not almak için bir defter ihtiyaç duyulan ekipmanların başında gelir.



Bunun yanında gözlemin yapıldığı yerin haritası ve GPS cihazı (Global Positioning System – Coğrafik Konumlama Sistemi) da kullanılabilir. Eski zamanlarda altimetre (yükseklik ölçer) ve pusula kullanılırken GPS cihazında tüm bu hizmetler sunulduğundan bir GPS cihazı edinmekte fayda vardır. Gözlenen kuş türünün isminin kaydına ek olarak, gözlendiği yerin GPS koordinatı, habitat tipi (örneğin çalılık, tarımsal alan, sulak alan, dere, göl ve deniz gibi), yüksekliği, bakısının kaydedilmesi kuş türünün habitat olarak nereleri tercih edeceğini ortaya koyarak, ekolojik konularda yapılan çalışmalara altlık sağlayabilir.

Kuş fotoğrafçılığında, gözlemciliğe ek olarak bir fotoğraf makinesi ve uzaktaki cisimleri yakına getirme özelliğine sahip teleobjektiflere gereksinim vardır. Kuş fotoğrafçılığı fotoğraf makinesi ve teleobjektif, bilgisayar ve fotoğraf işleme programlarından dolayı kuş gözlemciliğine göre nispeten daha pahalı ve daha zor bir hobidir. Ek olarak, kuşlara yaklaşarak güzel bir kare yakalamak için kamuflaj giysiler, ayakkabılar ve ekipmanlar gibi başkaca masrafları da içerir. Ancak gözlemciliğe göre bir avantaja sahiptir. Alanda gözlem yaparken tanımlanamayan veya pas geçilen bir kuşun, çekilen fotoğrafından daha sonradan tanımlanması mümkün olabilir. Ayrıca gözlem yapılan bölgede yaygın olmayan kuş türlerinin kaydı da kanıt niteliğindedir.



Kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliğinin en temel koşulu doğa şartlarına uygun kıyafetleri giymek, sessiz olmak ve canlılara saygı göstermektir. Kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı için sabahın erken saatleri ve ikindi ile akşamüzeri vakitler en uygun zamanlardır. Çoğu kuş bu zamanlarda aktif olup, öğle sıcağında gizlenerek dinlenmeyi tercih eder. Öğlen vakti kuş fotoğrafçıları için de uygun zamanlar değildir. Öğlen vakti dik gelen güneş ışığı fotoğrafın gölge ve aydınlık kısımlarında kontrastın aşırı artışına sebep olmaktadır. Dolayısıyla kuşların aktif olduğu zamanlar hem ışığın açısının daha doğru hem de fotoğrafın kalitesinin en iyi olacağı vakitlerdir.

Beykoz'da yılın tüm dönemlerinde kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yapılabilmektedir. Beykoz, sahip olduğu doğal güzellikleri ve Avrupa'daki en önemli göç rotası üzerinde bulunması sayesinde kuş türü çeşitliliği ve birey sayısı açısından çok zengindir. Beykoz'da birçok yerli kuş türüne ek olarak sadece göç dönemlerinde uğrayan veya çok nadir gözlenen kuş türlerinin gözlenme şansının yüksek olması, yurtiçi ve dünyanın çok farklı ülkelerinden birçok kuş gözlemcisini ve kuş fotoğrafçısını Beykoz'a çekmektedir.

Kuş Halkalama Nedir?



"Kuşların halkalama lisansına sahip eğitimli araştırmacılar tarafından güvenli yöntemlerle yakalanmasını, bacaklarına halka takılmasını ve tür, yaş, cinsiyet gibi gerekli bilgilerin kaydedilmesinden sonra serbest bırakılmasını içeren işlemlerin tümüne birden 'halkalama' adı verilir." Halkaların üzerinde her kuşa özel bir kod ve ülkelere özgü sabit bir adres bulunmaktadır [9].

Kuşlara takılan bu halkadaki kodlar sayesinde kuş dünyanın başka bir yerindeki bir halkalama merkezine denk geldiğinde onların hangi ülkede halkalandığı, hangi ülkeye göç ettiği, göç rotaları, üreme alanları ve popülasyonları hakkında bilgi elde edilmektedir.

Halkalama istasyonlarında yapılan bu işlemler aynı zamanda kuşlara ait; tür, yaş, cinsiyet, sağlık, ağırlık, yağlanma ve kuşların göç yollarında konakladığı alanların ne kadar öneme sahip olduğuna dair bilgi birikimi oluşturmaktadır.

Yazar Ekibi

BEYKOZ'UN TABİAT ALANLARI VE YABAN HAYATI





Dünya medeniyetine başkentlik yapmış İstanbul'un kuzeyinde yer alan, onun eşsiz bir parçası olan Beykoz; Boğaz'a bakan uzun bir sahil şeridinin, Boğaz'a ve Karadeniz'e dökülen akarsuların, geniş orman ve çayırlık alanların bulunduğu 239,22 km^2'lik yüzölçümüne sahip bir ilçedir.

Hıdiv Kasrı ve Korusu, Onçeşmeler, Beykoz Korusu, Yoros Kalesi, Mecidiye Kasrı, Anadolu Hisarı Kalesi ve Küçüksu Kasrı gibi tarihi alanlara sahip olan Beykoz; tabiat parkları, mesire alanları, Beykoz Çayırı, Boğaz'ı, Riva Deresi, çayırlık alanları, ormanlık alanları ve köyleri ile muazzam bir beldedir. Çok zengin bir yaban hayatı ve flora çeşitliliğine sahip ilçenin aynı zamanda Boğaz'da ve Karadeniz kıyısında yer alması ile su canlılarının çeşitliliği de dikkat çekmektedir.

Deniz seviyesi ile 300 metreye kadar ulaşabilen rakım aralığında oldukça engebeli bir araziye sahip Beykoz'un vadilerinden irili ufaklı dereler akmaktadır. Geçiş tipi iklime sahip olan ilçe, Karadeniz ikliminin geniş yapraklı, karışık ve iğne yapraklı ormanları ile Akdeniz ikliminin maki denen bodur ağaçlık ve çalılıklarını barındırır. Ormanlık alanlarda çam, meşe, kestane, gürgen, fındık, dişbudak ve ıhlamur ağaçları, makilik alanlarda ise kocayemiş, katırtırnağı, kuşburnu, yabani gül, böğürtlen, ateş dikeni, süpürge çalısı yaygındır. Geniş çayırlık ve meralık alanlarında tahıl ve sebze tarımı, seracılık, at yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı ve küçükbaş ile büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Beykoz; Karadeniz iklimi kadar yoğun yağış almasa da İstanbul'un en çok yağış alan bölgelerinden biri olup, birçok doğal su kaynağına ve yapay baraj göletlerine sahip, adeta bir su deposu gibidir. Yazları da Karadeniz sahilinden aldığı esinti ve yerleşimin ormanlarla iç içe olması nedeniyle İstanbul geneline göre daha serindir.

Beykoz'un ormanlık alanları, geniş çayır ve otlakları, sahil şeridi ve koyları, kayalık yamaçları ve tatlı suları balık çeşitliliğine, zengin bitki örtüsüne, kuşlara, memeli hayvanlara, sürüngenlere, kelebek ve böcek türlerine; yani çok çeşitli bir yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır.

Beykoz, harika doğasının yanı sıra özel konumu nedeniyle çok önemli bir göç yolu üzerinde yer almaktadır. Her sene ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya, sonbaharda ise Avrupa



ülkelerinden Afrika'ya göç eden kuşlara adeta bir koridor vazifesi görmektedir.

Beykoz sınırları içerisinde ve sahilinde bu zamana kadar 287 kuş türü kayıt altına alınmıştır. Türkiye'de görülen kuş türü sayısının 487 olduğunu göz önüne alırsak yarısından fazlasının bir ilçede görülebilmesi Beykoz'un kuş türü zenginliğini göstermekle birlikte Beykoz'da yaban hayatının devamlılığının ne kadar önemli olduğunu işaret etmektedir. Daha önce tespit edilemeyen türlerin fark edilmesine, iklim şartlarına, doğal alanların korunmasına ve kuş gözlemcilerinin artmasına bağlı olarak bu sayıların ilerideki yıllarda yükselmesi de mümkündür.

Yıl içinde Beykoz'da görülebilecek kuş türlerinin hepsi bir anda görülmezler. Tüm yıl boyunca yerli olarak görülebilecek türlerin yanı sıra çoğu tür bahar göçünde Boğazlar'dan geçişi esnasında görülmektedir.

Ötücü kuşlar göçleri sırasında geçiş güzergâhı olan düzlük çayırları, çalılık alanları, fundalıkları, sazlıkları, ormanları hatta koru ve parkları konaklama yeri olarak kullanmaktadır. Kıyı ve deniz kuşları da göç sırasında barınmak ve beslenmek için deniz kenarına, sulak alanlara, sazlıklara ve bataklıklara uğramaktadır. Süzülerek üzerimizden göç eden leylekler ve yırtıcı kuşlar için ormanlık alanlar ve geniş çayırlıklar beslenme ve konaklama ihtiyaçlarını gördükleri hayati öneme sahip alanlardır.

Yerli olan türler haricinde bazı misafir türlerimiz üremek için yaz aylarında Beykoz'da kalmaktadır ve göç zamanları geldiğinde ise ilçeye veda etmektedir. Yazın üremek için gelen türler sonbaharda yavrular uçmaya başladıktan sonra kış şartlarında besin bulamayacaklarından dolayı daha uygun iklimli ülkelere göç etmektedir.

Kış aylarının sert geçtiği Avrupa ülkelerinde bulunan bazı kuş türleri, daha ılık iklimlere doğru gitmek zorunda kaldıklarında ilk durakları İstanbul ve çevresi olmaktadır.


Beykoz bu durumda birçok kuş türüne geçici ev sahipliği yaptığından nadir kuş türlerini kış aylarında Beykoz sahillerinde görmek sürpriz olmaz.

Beykoz'un tabiat parkları:

- Polonezköy Tabiat Parkı
- Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı
- Mihrabat Tabiat Parkı
- Göztepe Tabiat Parkı
- Elmasburnu Tabiat Parkı

Beykoz'un tabiat parkları dışında yoğun canlı çeşitliliğinin bulunduğu alanlar:

- Riva Deresi, Sazlıkları, Çayırları ve Sahili
- Toygartepe Göç Gözlem Noktası
- Beykoz Boğaziçi Sahil Şeridi
- Poyrazköy Limanı
- Anadolu Feneri ve Kabakoz
- Anadolu Kavağı ve Yoros Kalesi
- Beykoz Korusu
- Kaymakdonduran Mesire Ormanı
- Karlıtepe Mesire Alanı
- Beykoz Ormanları



Polonezköy Tabiat Parkı

1856 yılında Polonya'dan kaçan asker ve sivillerin Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Kırım Savaşı'na katılmaları sonucu Sultan Abdülmecit, şimdiki Polonezköy'ün bulunduğu topraklara yerleşim izni vermiştir. 1923 yılında köyün adı Polonezköy olmuştur. 1994 yılında ilan edilen Polonezköy Tabiat Parkı, kapladığı alan bakımından İstanbul'un en büyük ve ilk tabiat parkıdır.

Tabiat parkında köy, yerleşim alanı dışında geyik ve sülün üretim istasyonları da bulunmaktadır. Yaklaşık 3.000 hektar alana sahip tabiat parkı, çok zengin flora ve yaban hayat varlığına sahiptir.



Çevik Kurbağa
(Rana dalmatina)



Polonezköy Tabiat Parkı

Polonezköy Tabiat Parkı, bitki çeşitliliği açısından çok zengindir. Genel olarak alanda yer alan bitkiler: saplı meşe, sapsız meşe, saçlı meşe, Macar meşesi, atkestanesi, Anadolu kestanesi, Avrupa ladini, doğu çınarı, Akdeniz servisi, gürgen, karaağaç, kızılağaç, kayın, ıhlamur, doğu mazısı, Anadolu saparnası, Akdeniz defnesi, kocayemiş, karayemiş, yayılıcı dağ muşmulası, geyikdikeni (alıç), ateş dikeni, funda çalısı, beyaz çiçekli-yaprak döken kartopu türleri ile birlikte karaçam, kızılçam, sarıçam plantasyonları gözlemlenmiştir.

Tabiat parkı içerisinde sülün ve keklik üretim istasyonu ile geyik ve karaca üretim istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, yeşil ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı, ortanca ağaçkakan, karatavuk, ispinoz, saka, üveyik, alaca baykuş, saksağan, büyük baştankara, mavi baştankara, kocabaş, saka, karabaşlı iskete, serçe gibi canlılar bulunmaktadır. İstanbul'da az sayıda görülebilen aksırtlı ağaçkakan da alanda fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

Polonezköy Karaca ve Geyik Üretim İstasyonu

Polonezköy Tabiat Parkı içindeki Polonezköy Karaca ve Geyik Üretim İstasyonu, Yaban Hayatı Şefliği görev alanında bulunmakta olup; 2007 yılında Bahçeköy'deki istasyondan nakledilen geyiklerle Mahmut Şevket Paşa Köyü yolu üzerindeki alana kurulmuştur. Üretme istasyonunda; karaca ve geyiklerin yemleneceği yemlikler, yem deposu mevcut olup karaca ve geyiklerin su içebileceği, güneşlenebileceği ve tuzlama ihtiyaçlarını giderebileceği doğal ortamlar oluşturulmuştur. Alanın etrafı kafes tel ve çit ile çevrilerek üretme istasyonuna yırtıcı canlı giriş ve çıkışı önlenmiştir.

Üretme istasyonunun amacı, üretilen geyik ve karacaların daha önceden tespit edilerek planlanmış uygun yaşam alanlarına salınarak adaptasyonun sağlanması ve popülasyon artışının gerçekleştirilmesidir.

Polonezköy Sülün ve Keklik Üretme İstasyonu

Polonezköy Tabiat Parkı içindeki Polonezköy Sülün ve Keklik Üretim İstasyonu Yaban Hayatı Şefliği görev alanında bulunmakta olup 2007 yılında kurulmuştur. Alanın etrafı kafes tel çit ile çevrilerek üretme istasyonuna yırtıcı canlı giriş çıkışı önlenmiştir. Üretme istasyonunda giriş ünitesi, kuluçkahane, anaçhane, palashane, anaç kümesleri, yem deposu, yaban hayatı tanıtım merkezi hizmet evi, gölet ve üretim makinaları vardır.

Üretim istasyonun amacı; bir zamanlar ormanlarımızda yaşayan, avlayarak neredeyse neslini tüketmek üzere olduğumuz sülünlerin ve kekliklerin, doğaya yerleştirilip çoğaltılmasıyla popülasyon artışının gerçekleştirilmesidir. Sülün ve keklikler doğadaki kene ve süne gibi zararlı böceklerle beslenerek ormanların biyolojik savaşçısı görevini üstlenmişlerdir.

Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı

Tokatköy Validesu mevkiinde bulunan Göknarlık Tabiat Koruma Alanı İstanbul ve çevresinin tek doğal göknarlığıdır. Bu alanda bulunan göknarlar, iğne yapraklılar takımından, çamgiller familyasına ait endemik bir ağaç türü olan Kazdağı göknarıdır. İğne yaprakları parlak ve 3 cm kadar uzunluktadır. 15-20 cm uzunluğunda, 4-5cm çapında, bol reçineli ve dik duran kozalaklara sahiptir.



Kazdağı Göknarı
(Abies nordmanniana subsp. equi-trojani)

Pek bilinmeyen bu göknarlık tehdit altında bulunan ve nadir bir ekosistemdir. Çevresinde gerçekleşebilecek tahribata karşı önlemler alınıp düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Alanda ayrıca fındık, ateş dikeni, süpürge çalısı, karayemiş gibi bitkiler bulunmaktadır.

Göknarlıkta; kızılgerdan, ispinoz, büyük baştankara, florya, karabaşlı iskete, karatavuk, arıkuşu, ibibik gibi kuşlar bulunmaktadır. Alanda kuşlardan başka kirpi, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap gibi türleri gözlemlemek mümkündür.



Kazdağı Göknarı *(Abies nordmanniana subsp. equi-trojani)*

Tilki *(Vulpes vulpes)*





Mihrabat Tabiat Parkı

2011 yılında ilan edilen Mihrabat Tabiat Parkı, ismini Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yaptırdığı Mihrabat Kasrı'ndan almıştır. Kanlıca'da, Boğaziçi manzarasına hakim bir tepede yer alan Mihrabat Tabiat Parkı zengin bir flora varlığına sahiptir.

Korunun bitki örtüsü genel olarak alanda doğal olarak bulunan yaprak döken ağaçlardan, yer yer insanlar tarafından alana getirilen ibreli ağaçlar ve egzotik ağaçlar ve çalılardan oluşmaktadır. Koruda görülen bitkiler arasında; fıstık çamı, Himalaya sediri, meşe, andız ağacı, sedir, servi, mazı, katalpa, erguvan, dişbudak, ardıç, kestane,



Bir mantar üzerinde bulunan, böceklerin kınkanatlılar *(Coleoptera)* takımı yaprak böcekleri familyasından *(Chrysomelidae)* "Chrysolina herbacea"



gürgen, çınar, ıhlamur, akçaağaç, oya ağacı, çitlembik, akasya, süs eriği, büyük çiçekli manolya, defne, kartopu, kocayemiş, katırtırnağı, ateş dikeni, filbahri, çobanpüskülü, ılgın, böğürtlen, yıldız çalısı, dikenli mersin, funda çalısı, alacalı yapraklı kurtbağrı, akçakesme, kuşburnu, muşmula, karaardıç, orman sarmaşığı, zambak, şimşir, biberiye, küçük yapraklı dağ muşmulası, kurtbağrı başlıca sayabileceklerimizdendir.

Tabiat Parkı'nda kargalar, ağaçkakanlar, ötücü kuşlar ve şahin, delice doğan gibi yırtıcı kuş türleri ile kirpi, sincap, kaplumbağa, kertenkele gibi canlılar da yer almaktadır..



Bal Arısı *(Apis mellifera)*



Göztepe Tabiat Parkı

2013 yılında ilan edilen Göztepe Tabiat Parkı, ismini yakınında bulunan Göztepe Mahallesi'nden almıştır. Genellikle iğne yapraklı ağaçlardan oluşan alanda hakim ağaç türü sahil çamıdır. Göztepe Tabiat Parkı'nda gözlemlenen bitkiler karaçam, defne, boylu dişbudak, sapsız meşe, kermes meşesi, kocayemiş, funda çalısı, böğürtlen, Anadolu saparnası, saz bitkisi, mor çiçekli obrizya gibi türlerden oluşmaktadır.



Gelinböceği/Uğurböceği
(*Coccinella septempunctata*)



Alanda yaşayan canlı türleri arasında ötücü kuşlar, ağaçkakanlar, kargalar gibi kuşlar, sincap, tavşan, tilki, çakal ve kirpi gibi memeliler, kaplumbağa, çeşitli kertenkeleler ve nadiren de görülse yılan gibi sürüngenler bulunmaktadır.





Elmasburnu Tabiat Parkı

2011 yılında ilan edilen Elmasburnu Tabiat Parkı'nda kumul ve orman ekosistemi görülmektedir. Kumsal yaz aylarında plaj olarak hizmet vermekte olup ormanlık alanda mesire alanı bulunmaktadır. Piknik için gelen bazı insanların alandaki ağaçların dallarını kırarak ya da altında ateş yakarak zarar vermesi alanda tahribata yol açtığından bu konuda insanlar bilinçlendirilmeli ve önlemler alınmalıdır.

Elmasburnu Tabiat Parkı'nın bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlar ile maki türlerinden meydana gelmektedir. Gözlemlenen bitki türleri: kızılçam, sahil çamı, Macar meşesi sapsız meşe, saçlı meşe, saplı meşe, funda çalısı, akçakesme, kocayemiş, katırtırnağı, tüylü laden, Akdeniz defnesi olarak belirlenmiştir.



Çokgözlü *Mavi*
(*Polyommatus icarus*)



Elmasburnu Tabiat Parkı'nda çakal, tilki, sincap, kirpi, yaban domuzu gibi memeliler ve kertenkele, kaplumbağa gibi sürüngen türleri de bulunmaktadır. Ayrıca saksağan, alakarga, leş kargası, küçük karga, serçe, büyük baştankara, kızılgerdan gibi çeşitli kuş türleri alanda yaşamaktadır. Riva ve çevresi kuş göç yolu üzerinde olduğundan bu alanda da göç eden birçok kuş türünün görülmesi olasıdır.

Böğürtlen (*Rubus caesius*) üzerinde bulunan bir çekirge



Çöp mantarları ailesinden Siyah mürekkep mantarı (*Coprinosis picacea*)





Riva Deresi, Sazlıkları, Çayırları ve Sahili



Karaca
(*Capreolus capreolus*)

Riva sadece Beykoz'un değil, Türkiye'nin de en önemli yaban hayatı ve kuş gözlem alanlarından biridir. Riva'ya ülkemizin birçok şehrinden kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları ender görülen türleri gözlemlemek ve fotoğraflamak için gelmektedir.

Riva'yı bu kadar cazip kılan, göç rotası üzerinde bulunması ve kuşların konaklayabileceği geniş arazilere sahip olmasıdır. Riva Deresi ve derenin oluşturduğu bataklık ve sazlık alanlar, geniş çayırlıklar, fundalık ve ağaçlık alanlar birçok türün konaklama ve beslenme ihtiyacını karşılamaktadır. Bugüne kadar Riva'da 200'den fazla kuş türü kaydı vardır.

İlkbahar ve sonbahar göçünde Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşların yorgun bir şekilde uğradıkları Riva, Alibahadır Köyü ve civarındaki köyler, kuşların yakıt depolayarak zorlu yolculuklarına devam etmelerini sağlayan bir istasyon görevi görmektedir.

Her sene ilkbahar göçünde leylekleri Riva civarındaki çayırlarda kalabalık gruplar halinde konaklarken görmek mümkündür. Bu alanlarda dinlenirken aynı zamanda



Abbasın Çayırı'nda dinlenmekte olan leylekler (*Ciconia ciconia*)

kurbağa, yılan, solucan gibi canlılarla beslenerek göçe devam etmeden önce enerji depolarlar.

Riva Deresi'nde ve sazlıklarında gri balıkçıl, sutavuğu, yalıçapkını, çeşitli ördekler, çeşitli martı türleri, karabataklar, sumrular, farklı türlerde kamışçınlar gibi türler görülebilirken, çayırlık ve fundalık alanlarda kuyruksallayanlar, yağmurcun ve cılıbıtlar, kuyrukkakanlar, ardıçlar, örümcekkuşları, sinekkapanlar, ötleğenler gibi çok çeşitli türleri görmek mümkündür.

Gökyüzünü ise göç dönemlerinde ve yaz aylarında kırlangıçlar, ebabiller, arıkuşları ile yırtıcı kuşlar, kış aylarında ise sığırcık sürüler ve yabani güvercin

Çamurcunlar (*Anas crecca)*





sürüleri kaplamaktadır. Yine Riva'da göç yolu üzerinde olması nedeniyle transit geçen kuşlar gökyüzünde göç ederken görülmektedir. Gece olduğunda da alaca baykuş, ishakkuşu, kulaklı orman baykuşu ve çobanaldatan gibi gece avlanan kuşlar gözlemlenmektedir.

Sahildeki koylarda ve kayalık alanlarda karasırtlı martı, küçük martı, incegagalı martı, kara sumru, akkanatlı sumru gibi sık görülmeyen türlere rastlamak mümkündür.

Kuş türlerinin yanı sıra Riva'da diğer canlılar da oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bitki örtüsü çeşitliliği kelebek türü zenginliğini de beraberinde getirmiştir. Mart ve Nisan ayı gibi baharın gelişi ile artan kelebek hareketliliği Ekim hatta Kasım ayları gibi havalar soğuyuncaya kadar devam etmektedir.

Kelebekleri çiçek açan her bitkinin üstünde, çayırlarda, orman içlerinde ve dere kenarındaki alanlarda görebilmek mümkündür. Kelebekler de kuş türlerinde olduğu gibi

Güneyli Fisto Kelebeği (*Zerynthia polyxena*)



Ağaç Kurbağası (*Hyla orientalis*)





Sarı Kuyruksallayanlar (*Motacilla flava*)

kendi türlerine özgü ortamları ve beslenebileceği çiçek türlerini seçmektedirler.

Alanda siğilli kurbağa, ağaç kurbağası, ova kurbağası, çevik kurbağa, İstanbul kertenkelesi, küçük semender, iri yeşil kertenkele, hazer yılanı, ince yılan, yarı sucul yılan, burunlu engerek, kara kaplumbağası gibi sürüngen türleri görülmektedir.

Yabani tavşan, çakal, tilki, yaban domuzu, gelincik, karaca, kirpi ve çeşitli kemirgenleri bölgede görmek mümkündür.

Sahillerinde ise soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve koparılması kesinlikle yasak olan Kum Zambağı (Pancratium maritimum) yetişmektedir.

Son yıllarda artan yapılaşma nedeniyle ciddi bir şekilde yaban hayat alanı daralan Riva ekosistemi tehdit altında olup tür sayılarında önemli bir azalış gözlemlenmektedir.

Burunlu Engerek (*Vipera ammodytes*)



Yabani Tavşan (*Lepus europaeus*)







Kum Zambağı (Pancratium maritimum)







Toygartepe Göç Gözlem Noktası

Leylek ve yırtıcı kuşların bahar dansları Beykoz'daki birçok noktadan izlenebilmektedir. Sonbahar göçünde İstanbul'un en ideal göç gözlem yeri Beykoz Toygartepe'dir. Toygartepe Beykoz'un en yüksek noktası olup bu alanda rahat bir gözlem açısına sahip orman itfaiyesi ekibi arazözü ile birlikte yangın sezonu boyunca sürekli hazır bir şekilde Beykoz ormanlarını koruyup kollamaktadır. Her yıl ülkemizin dört bir köşesinden ve birçok yabancı ülkeden kuş bilimci ve kuş gözlemcisi Toygartepe'de orman itfaiyesinin alanına gelerek gözlem yapmaktadır. Bu noktada göç zamanı kuş gözlem etkinlikleri düzenlenerek tecrübeli kuş gözlemcilerinden bilgi aktarımı gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde birçok kent kuş gözlemi turizminden büyük gelirler elde etmektedir ve Beykoz böyle bir potansiyele sahiptir.



Genel olarak yerleşik yaşayan ve İstanbul'da çok nadir görülen Sakallı Akbaba (*Gypaetus barbatus*) Toygartepe'de göç izlenirken görüldü.

Sıcak hava akımlarında dönerek yükselen bir şahin (*Buteo buteo*) ve leylek (*Ciconia ciconia*) sürüsü.

Her yıl milyonlarca ötücü kuş, su kuşu, kıyı kuşu ve süzülerek göç eden kuşlar diye adlandırılan Leylek, Kartal, Akbaba, Şahin gibi büyük kanatlı kuşlar ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya doğru, sonbaharda





ise Avrupa'dan Afrika'ya doğru İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinden göç ederler. Göç, kuşların içgüdüsel bir davranışıdır. Göç sayesinde mevsimsel değişimlerden daha az etkilenirler; besin bulma problemleri azalır, yavru yetiştirmek için uygun şartların olduğu bölgelerde ürerler.

Süzülerek göç eden kuşlar güneşin yeri ısıtmasıyla yerden yükselen sıcak hava akımlarını kullanarak kanat çırpmadan ya da çok az çırpma ihtiyacı duyarak yükselirler. Aksi durumda yükselmek için çok fazla



kanat çırpmak zorunda kalır ve binlerce kilometrelik yolda yorgun düşerek telef olurlardı. Karalar üzerinden sıcak hava yükselişi denizlere nazaran daha fazla olduğundan, kuşlar deniz üzerindeki geçiş için daha az enerji harcadıkları en kısa mesafe olan boğazları tercih ederler.

İstanbul Boğazı ilkbahar ve sonbahar göçünde bu görsel şölene sahne olmaktadır. Genel olarak göç eden kuşlar İstanbul'un herhangi bir noktasından da görülebilecek iken, rakım olarak yüksek ve görüş alanı



İnce Kertenkele (*Ablepharus kitaibellii*)

açık alanlar daha rahat ve daha yakından bir gözlem yapabilme imkanı sunmaktadır. Sonbahar göçünde kuşlar Avrupa'dan Anadolu'ya doğru geçtiği için kuşları geliş yönünden izleme şansı sunan Toygartepe, İstanbul için en ideal gözlem noktalarından biridir. Eylül ve ekim aylarında yoğun yırtıcı kuş geçişi gerçekleşmektedir. Ayrıca alanda yerli ve göç eden ötücü kuşları da gözlemlemek mümkündür.

Toygartepe'de 29.09.2018 tarihinde sakallı akbaba türü İstanbul için ilk kez görülmüş ve fotoğraflanmıştır. Aynı şekilde İstanbul için ender görülebilecek türlerden ak çaylak da 24.09.2009 tarihinde Toygartepe'de, kızıl çaylak ise son yıllarda Toygartepe ve Riva'da göç sırasında gözlenmiş nadir türler arasında yer almaktadır.

İstanbul'daki kentleşme ve çevre kir-

Benekli İparhan *(Melitaea didyma)*



Stictocephala bisonia





Beykoz Boğaziçi Sahil Şeridi

Anadolu Feneri'nden Küçüksu'ya kadar uzanan boğaz şeridi buzul çağının yaşandığı 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki deniz yolu bağlantısını sağlayan İstanbul Boğazı, Avrupa Kıtası ile Asya Kıtası arasında göç eden kuşlar için köprü görevi görürken aynı zamanda Karadeniz'in kuzeyi ile Akdeniz arasında geçiş yapan deniz kuşları için de geçit görevi görmektedir.



Sakarca kazı (*Anser albifrons*)

Balık sürülerinin Boğaz'a girdiği dönemlerde peşlerinden gelen yunuslar ile yelkovan, sumru, karagagalı sumru, çeşitli martı türleri Boğaz'ın sığ sularında rahat avlanma imkanı bulmaktadır. Tabii ki vapurlardan atılan simitleri de pas geçmeyen martılar Boğaz'ın sembollerinden biridir. Beykoz ve Paşabahçe Koyu, Çubuklu ve Kanlıca sahili, Anadolu Hisarı ve Küçüksu'da sahilde Boğaz manzaralı bir yerde çayınızı içerken su sathına paralel sürüler halinde uçan yelkovan kuşlarını Boğaz'da bir aşağı bir yukarı hızla giderken görebilirsiniz.

Derelerin boğazla buluştuğu koylar bahri, karaboyunlu batağan, karabaş martı, yalıçapkını, sakarmeke, kuğu gibi türlerin özellikle kış aylarında sığındıkları ve beslendikleri alanlar olmaktadır.

Kış aylarında Beykoz sahillerinde nadir türler de görülebilmektedir. 13.01.2016 tarihinde Sultaniye sahiline sığınan iki birey sakarca fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

Çubuklu sahilinde 22.03.2019 tarihinde bir birey kızılboyunlu batağanın bölgede beslendiği gözlemlenmiş ve fotoğraf ile kayıt altına alınmıştır

Kızılboyunlu Batağan (*Podiceps grisegena*)





Poyrazköy Limanı

Beykoz'un kuzey kesiminde yer alan eski bir balıkçı köyü olan Poyrazköy, 600 yıl önce Cenevizliler tarafından liman olarak kullanılmıştır. 1974 yılında limana mendirek yapılmıştır. Deniz kuşları için fırtınalı havalarda sığınak ve soğuk kış aylarında beslenme imkanı sunan liman bugüne kadar çeşitli kuşları misafir etmiştir. Kuğu, gümüş martı, küçük gümüş martı, küçük martı, karabaş martı, Hazar martısı, karaboyunlu batağan, bahri, karagerdanlı dalgıç, yeşilbaş, sakarmeke, küçük karabatak, karabatak, tepeli karabatak gibi türler görülmektedir. Liman açıklarında ise yelkovan kuşları yoğun bir şekilde geçiş yapmaktadır.

Köyün iç kesimlerinde, meyvelik ve ormanlık alanlarda sülün, çulluk, kızılgerdan, büyük baştankara, mavi baştankara, benekli sinekkapan, benekli bülbül,



Siğilli Kurbağa (*Bufo bufo*)



Karabataklar (*Phalacrocorax carbo*) ve tepeli karabatak (*Phalacrocorax aristotelis*) kayalık üzerinde güneşlenirken

bülbül, maskeli ötleğen, akgerdanlı ötleğen, küçük akgerdanlı ötleğen, taşkuşu, karabaşlı iskete, çaprazgaga, kocabaş, saka, florya, çalıkuşu, küçük ağaçkakan, yeşil ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı, şahin, atmaca, delice doğan, boyunçeviren, üveyik, kızılsırtlı örümcekkuşu gibi türlerden kayıtlar bulunmaktadır. Kuş türleri haricinde yaban domuzu, çakal, tilki, tavşan, kirpi gibi memeliler kaplumbağa, yılanlar, kertenkeleler gibi sürüngenler çok çeşitli kelebekler, böcekler ve örümcekler bulunmaktadır. Ayrıca lodos rüzgarının estiği göç dönemlerinde leylekleri ve çeşitli yırtıcı kuş türlerini göç ederken görmek mümkündür.

Yaban Arısı Örümceği (*Argiope bruennichi*)



Oluklu Kertenkele (*Pseudopus apodus*)





Anadolu Feneri ve Kabakoz

Anadolu Feneri Köyü, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan ağzında, ismini gemilere yol göstermek için 1834 yılında yapılmış olan fenerden alan bir köydür. Fenerin inşa edildiği kayalık yamaçlar Karadeniz'in öfkeli dalgalarına göğüs gererken tepeli karabatak kolonilerine de yuva olmaktadır. Gri balıkçıl, gümüş martı, karabaş martı, karaboyunlu batağan, bahri gibi kuş türleri görülebilmektedir.





Karabaş Martı (*Chroicocephalus ridibundus*) sürüsü

Anadolu Feneri'nin daha kuzeye bakan tarafında Kabakoz koyu bulunmaktadır. Kışın dev dalgaların dövdüğü kumsala Kaynarca Köyü'nden akan dere birleşmektedir. Dere içindeki sazlıklarda ve deniz tarafında göç dönemlerinde veya soğuk kış aylarında alışık olunmayan kuş türleri görülebilmektedir.

Kuş gözlemcileri için kış aylarında sürprizlere açık olan Kabakoz Koyu'nda 16.12.2017 tarihinde İstanbul için oldukça nadir bir tür olan kulaklı batağan fotoğraflanarak kayıt edilmiştir.

Kulaklı Batağan (*Podiceps auritus*)



Yusufçuk (*Sympetrum fonscolombii*)





Deredeki sazlık alanlardan saz kamışçını, kındıra kamışçını, büyük kamışçın, gece balıkçılı, küçük balaban, sutavuğu, gri balıkçıl, küçük akbalıkçıl kayıtları vardır. Dere kenarındaki tarlalarda karabaşlı çinte, taşkuşu, kızılsırtlı örümcekkuşu, karaalınlı örümcekkuşu, sülün, saksağan gibi kuşlar görülmüştür. Kıyıda ise gümüş martı, küçük gümüş martı, karabaş martı, Hazar martısı, karaboyunlu batağan, bahri gibi türler sıklıkla görülebilmektedir. Bölgede kelebek, böcek ve sürüngen çeşitliliği, kirpi, yaban domuzu ve çakal gibi hayvan türleri mevcuttur.

Erik Kırlangıçkuyruğu (*Iphiclides podalirius*)



Piezodorus lituratus





Anadolu Kavağı ve Yoros Kalesi

Beykoz'un en turistik ve en temiz havaya sahip yerlerinden biri olan Anadolu Kavağı uzun sahil şeridi ile kış ve bahar aylarında Boğaz'da sayıları artan martı ve batağan türleri ile Karadeniz – Marmara arasında mekik dokuyan yelkovan kuşlarının gözlemi için harika bir yerleşim merkezidir.

Köyden yukarıya, Yoros Kalesi civarına çıkıldığında müthiş Boğaz ve Karadeniz ile orman manzarası bulunmaktadır. Bu yüksek noktadan bahar göçü sırasında göç eden leylek ve yırtıcı kuşlar gözlenebilmekte ve yine göçmen ötücü kuşlar görülebilmektedir. Alanda İstanbul'da az rastlanan çütre ve ala sığırcık kayıtları



Gelincik (*Mustela nivalis*)



Diken Kelebeği (*Vanessa cardui*)

haricinde kızılgerdan, ispinoz, saka, karabaşlı iskete, alaca baykuş gibi kuşlar, gelincik, çakal, tilki, yaban domuzu, kirpi gibi memeliler ve çeşitli sürüngenler, kelebekler ve böcekler görülebilmektedir.



Gelincik Çiçeği (*Papaver sp.*)



İri Yeşil Kertenkele (*Trilineata*)






Beykoz Korusu

Abraham Paşa Korusu olarak da anılan Beykoz Korusu'nun tarihi Osmanlı Padişahı Abdülaziz dönemine dayanmaktadır. Av merakı olan Abraham Paşa tarafından içerisine malikâneler ve saray yaptırılan koru, 1887 yılında devlet tarafından satın alınmıştır. Günümüzde halka açık olan Beykoz Korusu içerisinde bulundurduğu sosyal tesis, kır kahvesi, otopark, açık spor alanları, çocuk parkı, oturma alanları ile yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlamaktadır.

Beykoz merkez sınırları içerisinde bulunan bu alan, küçük olmasına rağmen harika bir yaban hayatını barındırmaktadır. Kestane, çınar, ıhlamur, meşe, erguvan, akasya, defne, pırnal meşesi, kokarağaç, menekşe, çuha, kokina, yabani çilek gibi bitkiler alanın bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Koruda bulunan ağaçlar arasında sekoya, kırmızı yapraklı karaağaç ve Japon soforası gibi nâdide türler de bulunur.



Sincap (*Sciurus anomalus*)



Türkiye'nin kuzeyindeki yaprak döken ormanlarda yaşayan ve genellikle gece aktif olduğu için nadir olarak gözlenen iri bir fındık faresine benzeyen yediuyur bu alanda yaşamaktadır. Alanda ayrıca beş farklı tür ağaçkakan yaşamaktadır, bunlar; yeşil ağaçkakan, küçük yeşil ağaçkakan, küçük ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı ve alaca ağaçkakan.

Ağaçkakanlar haricinde göç dönemlerinde görülebilen veya alanda yerli olarak yaşayan diğer türlerden bazıları ise; kocabaş, karabaşlı iskete, küçük iskete, saka, dağ ispinozu, florya, kızıl ardıç, çalıkuşu, sürmeli çalıkuşu, orman çıvgını, ispinoz, büyük baştankara, mavi baştankara, uzunkuyruklu baştankara, şahin, kızılgerdan, delice doğan, sıvacı,

Çuha Çiçeği (*Primula sp.*)



Yediuyur (*Glis glis*)





Cüce Yarasa (*Pipistrellus pipistrellus*)

ekin kargası, leş kargası, küçük karga, sığırcık, bülbül, çitkuşu, bahçe tırmaşık-kuşu, alaca baykuş, çıvgın, ağaç incirkuşu, öter ardıç, ökse ardıcı, karatavuktur.

Koruda bulunan yaşlı ağaçlar, özellikle de büyük çınar ağaçları ağaçkakanlar ve sincaplar ile son yıllarda ülkemizde sayıları hızla artan yeşil papağan ve İskender papağanı için yuva ortamı sunmaktadır.

Ayrıca sincap, kirpi, yarasa gibi küçük memeliler; kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler; çeşitli böcekler ve çeşitli örümcekler bu alanda yaşamaktadır.

Atmaca Güvesi (*Macroglossum stellatarum*)





Kaymakdonduran Mesire Ormanı



Altın Böceği
(*Cetonia aurata*)

Beykoz Kaymakdonduran Mesire Ormanı İstanbul'da bulunan en güzel, en sakin ve en eski mesire alanlarından birisidir. Kendine özgü harika bir tabiata sahip olan bu ormanlık alan piknik, gezi ve eğlence amacıyla birçok İstanbullu tarafından ziyaret edilmektedir. Sonbaharda bol bol kestane toplayabileceğiniz bu yerde sincaplarla karşılaşmak da sizlere hoş bir sürpriz olacaktır.

Çınar, kocayemiş, kokarağaç, gürgen, kestane, fındık, defne, dişbudak, meşe, pırnal meşesi, ıhlamur, süpürge çalısı, ateş dikeni, alıç, katırtırnağı, laden, geyikdikeni, muşmula, kuşburnu, yabani gül, kokina, tüylü keçiboğan, çiğdem, çuha, kır menekşesi, yabani çilek gibi türler bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Asırlık ağaçları ve yoğun bitki örtüsü yerli ve göç eden birçok kuşu kendisine çekmektedir. İlkbahar göçünde leylekler ve yırtıcı kuşlar bu alandaki büyük ağaçları konaklamak ve geceyi geçirmek için kullanmaktadır, ötücü küçük kuşlar ise ağaçlar arasında gizlenmekte ve böcekler ile meyvelerle beslenmektedir.



Yerli türlerin ise beslenme ve üreme alanı olarak kullandıkları bu mesire alanında onlarca türden kuş, kelebek, böcek, örümcek, sürüngen ile tilki, kirpi ve sincap gibi memelileri gözlemleme şansınız olabilir. Alandaki başlıca kuş türleri arasında; küçük ağaçkakan, alaca ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı, yeşil ağaçkakan, sıvacı, bahçe tırmaşıkkuşu, kızılgerdan, büyük baştankara, mavi baştankara, uzunkuyruklu baştankara, çıvgın, orman çıvgını, ispinoz, alakarga, leş kargası, küçük karga, kumru, karatavuk, öter ardıç, çitkuşu, kocabaş, florya, saka, karabaşlı iskete, karabaşlı ötleğen, kuzgun ve ekin kargası sayılabilir. Yırtıcı kuşlardan ise şahin, atmaca, küçük kartal, küçük orman kartalı, çakır, delice doğan gibi türler avlanırken gözlemlenebilirler.



Acı Çiğdem (*Colchicum sp.*)



Kirpi (*Erinaceus concolor*)



Karlıtepe Mesire Alanı

2019 yılında ziyarete açılan Karlıtepe Mesire Alanı, Boğaz'ı ve İstanbul'un birçok noktasını yüksekten seyretme imkanı sunmaktadır. Geniş bir çamlık alana sahip mesire alanında seyir terasları, oturma alanları, restoran, spor alanları, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu bulunmaktadır. Alandaki yapılar doğayla uyumlu bir görünüme sahip olarak ahşap malzemelerden inşa edilmiştir. Yüksek konumu ve Toygartepe'ye olan yakınlığı ile kuş göçü zamanı buradan da kuşları izleme ve gözlemleme şansı vermektedir. Toygartepe'de görülen kuş türleri bu alanda da görülebilir.



Tosbağa (*Testudo graeca*)





Beykoz Ormanları

Beykoz köylerinde yerleşim, ormanlarla iç içe olup, gerek köyler civarında gerekse ormanların derinliklerinde zengin bir canlı çeşitliliği mevcuttur. Ormanlar; yaban domuzu, çakal, tilki, karaca, porsuk gibi memeliler ile birlikte çok sayıda kuş, kelebek, sürüngen, kemirgen, böcek ve örümcek türünün yaşam alanıdır. Çok sayıda canlı bu ormanlarda üremektedir.

Köylerde yaşayan insanların geçim kaynağı olan ormancılık, arıcılık, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler yaban hayatını da şekillendirmektedir. Göllü, Paşamandıra ve Mahmut Şevket Paşa Köyü ormanlarındaki baraj göletleri sulak alan oluşturduğundan bazı su kuşları ve böcekçil beslenen kuşlar bu bölgelerde görülmektedir.

Kirpi (*Erinaceus concolor*)





Çakal (Canis aureus)

Beykoz köyleri civarındaki ormanlar doğa yürüyüşü yapmak ve bol oksijen almak için idealdir. Orman içlerinde çeşitli bitkiler, çiçekler ve mantarlar yetişmektedir. Ağaçların çoğunluğunu çam, meşe, gürgen, kestane, ıhlamur, kocayemiş oluşturmaktadır.

Mahmut Şevket Paşa Köyü Baraj Göleti





Porsuk (*Meles meles*)

Kılıçlı, Bozhane ve Göllü ormanlarının yerleşim alanlarına yakın kısımlarından alaca baykuş kayıtları yoğundur. Alaca baykuş ormanlarda eski ağaç kovuklarına yuva yaparken, yine bir baykuş türü olan kukumav köylerde evlerin ya da ahırların çatı aralarına yuva yaparak yaşamaktadır. Bu baykuşlar fare gibi küçük kemirgenler ve böceklerle beslendiğinden köylülerle iş birliği içindedir.

Kılıçlı ormanlarında 3 Mart 2019 tarihinde çok ender görülen porsuk fotoğraflanarak kayıtlara geçmiştir.

Bataklık Kurbağası / Ova Kurbağası (*Pelophylax ridibundus*)




Mayıs Böceği (*Melolontha melolontha*)




KUŞ BİLGİLERİ



Kuş Topoğrafisi




k Örtüleri
Alın
Gaga
Boğaz
Küçük Örtü Tüyleri
Göğüs
Ortanca Örtü Tüyleri
Büyük Örtü Tüyleri
Alula
Primer Örtü Tüyleri
Karın
Böğür
Tarsus
yruk Altı Örtüleri



Bıldırcın

Common Quail
Coturnix coturnix

Kanat Açıklığı
32-35 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
85-135 gr

Özellikleri

Kahverengi üzerine sarı çizgileri bulunan; küçük, tıknaz bir tavukgildir. Çok iyi gizlenir; üzerine basılacak kadar yaklaşılmadıkça havalanmaz. Uçuşu düzdür. Uçarken seçilen kanatları düz ve sivridir; çizgili sırtı göze çarpar.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, çayırlar, yaylalar ve bozkırlarda bulunur.

Beslenme

Tohumlar ve sürgünler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında, tarımsal alanlarda ve çayırlarda görülebilmektedir.



Sülün

Common Pheasant
Phasianus colchicus

Kanat Açıklığı
70-90 cm

Boy
53-89 cm

Ağırlık
800-1400 gr

Özellikleri

Genel görünümü, boyutu, uzun kuyruğu ve renklenmesi ile alanda görülen başka hiçbir tür ile karıştırılmaz. Erkeğinin başı ve boynu metalik yeşil, gözünün etrafını çevreleyen ibiği ise kırmızıdır. Sırtı ve alt tarafı kırmızımsı kahverengi olup enine siyah çizgilidir. Dişisi ile genci daha soluk renklidir ve kahverengi tonlardadır.

Yaşam Alanları

Çalılık ve fundalıkların yoğun olduğu alanlarda görülür.

Beslenme

Tohumlar ve böcekler diyetinin önemli bir bölümünü oluşturur. Ayrıca bazı bitkilerin kökleri ve yemişlerini de tüketir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'da uygun yaşam alanına sahip alanlarda görülmektedir. Tamamı üretim çiftliklerinde doğaya salınan kuşlardır; bunlardan çok az bir bölümü hayatta kalmayı başarmaktadır.



Kuğu

Mute Swan
Cygnus olor

Kanat Açıklığı
200-238 cm

Boy
127-152 cm

Ağırlık
5500-14300 gr

Özellikleri

Alanda görülen en yaygın kuğu türüdür. Hemen hemen herkes tarafından tanınır. Özellikle kur davranışı sırasında uzun boyunlarıyla oluşturdukları kalp şekli herkes tarafından bilinir. Erişkinin turuncu-kırmızı gagası ve gaga dibinde bulunan et beni ile diğer kuğu türlerinden rahatlıkla ayırt edilir. Genci erişkine göre daha koyu renklidir ve gagasında et beni bulunmaz.

Yaşam Alanları


Tatlı su gölleri, lagünler ve deniz kıyılarında bulunur.

Beslenme

Ana besin kaynağı su bitkileri ve tohumlarıdır. Böcekler, böcek larvaları, küçük balıklar ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Özellikle kış dönemlerinde görülen tür ayrıca göç dönemlerinde de görülebilmektedir. Son yıllarda Kanlıca-Çubuklu sahili, Poyrazköy Limanı, Burunbahçe, Paşabahçe ve Beykoz koylarında görülmektedir.



Suna

Common Shelduck
Tadorna tadorna

Kanat Açıklığı
110-133 cm

Boy
55-65 cm

Ağırlık
562-1400 gr

Özellikleri

Oldukça büyük ve güzel renkli bir kazsı ördektir. Başı yeşilimsi siyah, göğüs kuşağı kızıl kahverengi olup gagası kırmızıdır. Karnını siyah bir şerit ikiye böler. Erkeğin gaga üstündeki et beni göze çarpar. Dişilerde gagada et beni bulunmaz. Genci erişkinlere göre daha soluk renklidir, kızıl kahverengi göğüs kuşağı bulunmaz.

Yaşam Alanları

Lagünler, deniz kıyıları, göller ve daha nadir olarak akarsularda görülür.

Beslenme

Sucul bitkiler, kabuklular, küçük balıklar, böcekler, böcek larvaları ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde Riva'daki uygun habitata sahip sulak alanlardan kayıtları vardır.



Çıkrıkçın

Garganey
Spatula querquedula

ANSERİFORMES / KAZSILAR

Kanat Açıklığı
58-69 cm

Boy
37-41 cm

Ağırlık
250-440 gr

Özellikleri

Çamurcundan biraz daha büyük ve uzun olan küçük bir yüzey ördeğidir. Uçarken seçilen kanat aynası yeşildir. Erkeği boynunun arkasına kadar uzanan belirgin beyaz kaşı, belirgin koyu göğsü, beyaz karnı ile rahatlıkla tanınır. Uçarken mavimsi gri kanat örtüleri dikkat çeker. Dişisi çamurcuna benzer. Ondan belirgin açık renk kaşı, siyah sürmesi, göz önündeki beyaz lekesi, beyazımsı boğazı ile ayırt edilir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, koylar, taşkın sahaları ve bataklıklarda görülür.

Beslenme

Tohumlar, kökler, su bitkileri, sucul böcekler, böcek larvaları, kabuklular, yumuşakçalar, amfibiler ve küçük balıklardan oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Yaz dönemleri ve göç dönemlerinde, uygun habitata sahip alanlarda gözlemlenmektedir. Riva Deresi'nde gözlem kayıtları bulunmaktadır.



Kaşıkgaga

Northern Shoveler
Spatula clypeata

Kanat Açıklığı
69-84 cm

Boy
44-51 cm

Ağırlık
400-700 gr

Özellikleri

Orta boylu, tıknaz ve kısa boyunlu bir yüzey ördeğidir. Alanda görülen diğer bütün ördeklerden kaşık şeklindeki çok iri gagasıyla ayırt edilir.

Yaşam Alanları


Deniz kıyıları, göller, lagünler ve nehir ağızlarında görülür.

Beslenme

Tohumlar, bitki parçaları, böcekler, böcek larvaları ve küçük kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar döneminde Riva'daki sulak alanlardan kayıtları vardır. Sonbahar ve kış aylarında da görülebilir.



Boz Ördek

Gadwall
Mareca strepera

Kanat Açıklığı
78-84 cm

Boy
46-57 cm

Ağırlık
600-1200 gr

Özellikleri

Erkeği koyu gridir. Kuyruk örtüleri siyah, kanat örtüleri kestane kızılıdır. Beyaz kanat aynası dikkat çeker. Dişisi yeşilbaş dişisine benzer. Ondan kısa gagası, dik alnı, beyaz karnı ve siyah-beyaz kanat aynasıyla ayırt edilir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, bataklıklar ve koylarda görülür.

Beslenme

Sudaki bitkiler ve tohumlar türün besin listesinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve kış aylarında az sayıda olmak üzere, uygun habitata sahip alanlarda görülmektedir.



Fiyu

Eurasian Wigeon
Mareca penelope

Kanat Açıklığı
71-85 cm

Boy
45-51 cm

Ağırlık
500-950 gr

Özellikleri

Dik alınlı, sivri kuyruklu bir ördektir. Karnı tüm formlarında beyazdır. Kısa gri gagasının ucu siyahtır. Erişkin erkeği devetüyü rengindeki tepesi, kızıl kahverengi başı, geniş beyaz kanat lekesi, siyah kuyruk altı tüyleri ile böğrünün mavimsi-gri olmasıyla alandaki başka bir türle karıştırılmaz. Dişisi daha soluk renkli olup genel olarak kızıl kahverengidir.

Yaşam Alanları


Göller, lagünler, deniz kıyıları ve taşkın sahalarında görülür.

Beslenme

Yapraklar, kökler, tohumlar ve su bitkilerinin gövdesi ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında uygun tabiata sahip alanlarda görülebilmektedir.



Yeşilbaş

Mallard
Anas platyrhynchos

Kanat Açıklığı
82-95 cm

Boy
50-65 cm

Ağırlık
1000-1300 gr

Özellikleri

Hemen hemen herkes tarafından tanınan bu tür evcil ördeğin atasıdır. En büyük yüzey ördeklerinden birisidir. Erkek bireylerde türün ismini de aldığı parlak yeşil başı, sarı gagası ve beyaz boyun halkası göze çarpar. Dişisi erkeğe göre oldukça sade görünüşlüdür. Diğer yüzey ördeklerinin dişileri ile sık sık karıştırılır. Mavi kanat aynası ile onlardan kolaylıkla ayrılır.

Yaşam Alanları


Deniz kıyıları, göller, nehirler ve lagünlerde görülür. Sazlık sulak alanlarda üremektedir.

Beslenme

Tohumlar ve su bitkileri diyetinin çoğunluğunu oluşturur. Ayrıca böcek, yumuşakça ve kabuklular ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca görülse de kışın sayılarında ufak bir artış olabilmektedir. Riva Deresi'nde ve çevredeki uygun küçük sulak alanlarda dahi üremektedir. Kış aylarında denizde de görmek mümkündür.



Kılkuyruk

Northern Pintail
Anas acuta

Kanat Açıklığı
74-86 cm

Boy
51-76 cm

Ağırlık
500-1450 gr

Özellikleri

Uzun ve ince boyunlu, uzun kuyruklu zarif bir ördektir. Erkeği gri-mavi olan iki renkli gagası, oldukça uzun kuyruğu, koyu kahverengi başı ve boynundan ensesine doğru uzanan, ince bir hat şeklinde beyazlık ile diğer ördeklerden rahatlıkla ayırt edilir. Dişisi diğer yüzey ördeklerinin dişisine benzer. Onlardan uzun, sivri kuyruğu ve uzun boynu ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Göller, bataklıklar, deniz kıyıları ve lagünlerde bulunur.

Beslenme

Tohumlar, bitki kökleri, böcekler, yumuşakçalar ve küçük kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında tabiatı uygun alanlarda görülmektedir.



Çamurcun

Eurasian Teal
Anas crecca

Kanat Açıklığı
52-59 cm

Boy
31-39 cm

Ağırlık
240-370 gr

Özellikleri

Alanda görülen en küçük ördek türüdür. Hemen hemen güvercin büyüklüğündedir. Uçarken seçilen kanat aynası yeşil ve siyahtır. Beyaz kanat bandı primerlerine doğru kalınlaşır. Erkeği kızıl kahverengi başı ve kuyruk altındaki sarı leke ile kolayca tanınır. Dişisi çıkrıkçın dişisi ile karıştırılabilir. Ondan yeşil-siyah kanat aynası ve beyaz kuyruk yanı çizgisiyle ayırt edilir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Bitki örtüsünün yoğun olduğu sulak alanlarda ürer. Kış aylarında göller, lagünler ve deniz kıyılarında görülür.

Beslenme

Tohumlar, su bitkileri, küçük böcekler, kabuklular ve yumuşakçalar ile benzer.

Görüldüğü Dönem

Ağırlıklı olarak kış döneminde, ayrıca da göç dönemlerinde, tüm sulak alanlarda gözlemlenmektedir.



Elmabaş Patka

Common Pochard
Aythya ferina

Kanat Açıklığı
72-82 cm

Boy
42-58 cm

Ağırlık
700-1100 gr

Özellikleri

Orta boylu dalıcı bir ördektir. Erkeğinin başı ve boynu kırmızı, göğsü ve kuyruğu siyah, gövdesi açık gridir. Dişisi daha soluk renklidir; başı ve göğsü kahverengi, gövdesi gri-kahverengidir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Bitki örtüsünün yoğun olduğu ve organik madde bakımından zengin sularda üreyen bu tür kışı deniz kıyıları, göller ve lagünlerde geçirir.

Beslenme

Bitkilerin yeşil kısımları, kökler, tohumlar, böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, küçük kabuklular, küçük balıklar ve amfibilerden oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl uygun tabiat alanlarında görülebilmektedir. Az sayıda Riva'da kayıtları vardır.



Tepeli Patka

Tufted Duck
Aythya fuligula

Kanat Açıklığı
65-73 cm

Boy
40-47 cm

Ağırlık
550-900 gr

Özellikleri

İsmini de aldığı tepesi erkeğinde uzun dişide daha kısadır. Erkeğinin gagası mavimsi gri olup gaga ucu siyahtır. Koyu mor başı dikkat çeker. Sırtı, boynu ve göğsü siyah olup karnı beyazdır. Dişisi erkeğine göre daha soluk renkli olup kahverengi renklerdedir. Bazı dişi bireylerde karabaş patka dişilerinde olduğu gibi, gaga dibinde ve kuyruk altında geniş beyazlıklar görülebilir.

Yaşam Alanları

Kış aylarında deniz kıyıları, göller ve lagünlerde görülür.

Beslenme

Yumuşakçalar ve kabuklular ana besin kaynağıdır. Ayrıca bitkisel gıdalar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış aylarında Karadeniz kıyılarında, nadiren Boğaz'da ve dere ağızlarında görülebilir.



Çobanaldatan

European Nightjar
Caprimulgus europaeus

Kanat Açıklığı
54-63 cm

Boy
25-28 cm

Ağırlık
67-100 gr

Özellikleri

Kendine has özellikleri ve morfolojisi ile başka hiçbir türle karıştırılmaz. Desenli ve koyu giysisi ile çok iyi kamufle olur. Baykuş gibi sessizce uçar. Uçarken uzun kanatları ve kuyruğu ile bir doğanı andırır. Geceleri aktif olan bu türün gündüz görülmesi zordur.

Yaşam Alanları

Ağaçlık açık alanlar, orman sınırları, bozkırlar ve tarım alanlarında görülür.

Beslenme

Geniş ağzı ile uçarken yakaladığı sinekler, güveler ve diğer böceklerle beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yaz döneminde çayırlık ve ormanlık alanlarda gece avlanırken görülebilirler.



Ebabil

Common Swift
Apus apus

Kanat Açıklığı
38-48 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
35-56 gr

Özellikleri

Kuyruk çatalı derin, kanatları sivridir. Tüyleri yıpranmamışken simsiyah görünür, yıprandıkça kahverengileşir. Beyaz boğaz lekesi genç bireylerde daha geniştir.

Yaşam Alanları

Kayalık yamaçlar, yarlar ve binalardaki girintilere yuva yapar. Kırsal alanlarda, şehir merkezlerinde ve sulak alanların çevresinde sürüler halinde beslenirken görülür.

Beslenme

Uçarken yakaladığı sinekler ve diğer böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yaz aylarında ve göç dönemlerinde, Beykoz'da özellikle akşamüzeri, havada gruplar halinde uçarken görebilirsiniz.



Boz Ebabil

Pallid Swift
Apus pallidus

Kanat Açıklığı
39-46 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
36-50 gr

Özellikleri

Ebabile oldukça benzer, çoğu zaman bu iki türü birbirinden ayırmak güçtür. Ebabilden biraz daha hacimli görünür. Kuyruk çatalı daha az derin ve kanatları daha küttür. Koyu renkli gözleri alnı ve göz pınarı ile kontrast oluşturur. Boğazındaki beyazlık ebabile göre daha geniştir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde, yerleşim merkezlerinde ve kayalık yamaçlarda görülür.

Beslenme

Uçuşu sırasında yakaladığı sinekler ve diğer böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Bahar ve yaz dönemlerinde gökyüzünde görülmesi mümkündür.



Akkarınlı Ebabil

Alpine Swift
Tachymarptis melba

Kanat Açıklığı
54-60 cm

Boy
20-23 cm

Ağırlık
80-120 gr

Özellikleri

Yaz döneminde İstanbul ve Beykoz'da yaygın olarak görebileceğiniz, en büyük ebabil türüdür. Baharın habercisi olan türlerden biridir. Şehir yaşamına adapte olmuştur, kalabalık bölgelerde dahi yüksek yapıların çatı ve saçak aralarına yuva yapmaktadır. Beyaz karnı ve boğazı ile alandaki diğer ebabillerden rahatlıkla ayırt edilir. Uçarken oldukça hızlı, seri ve ani ataklar yapan bir kuştur. Bacak boyları kısa olduğu için ve diğer pek çok kuşun aksine 4 parmağı da önde olduğu için yere konmaz, dallara tüneyemez ve yerden havalanamaz. Gürültücü bir kuştur. Özellikle akşamüzeri uçuşlarında çığlık benzeri ses çıkartırlar. Genellikle grup halinde uçarken görülürler.

Yaşam Alanları

Kayalık bölgeler ve yüksek binaların olduğu yerleşim bölgelerinde görülmektedir.

Beslenme

Uçuşu esnasında yakaladığı böcek ve sinekler ile beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Göç ettikleri sırada ve yaz döneminde Beykoz'un birçok bölgesinde gökyüzünde grup halinde uçarken görebilirsiniz.



Guguk

Common Cuckoo
Cuculus canorus

Kanat Açıklığı
54-65 cm

Boy
32-36 cm

Ağırlık
105-130 gr

Özellikleri

Morfolojisi ve renklenmesi ile ilk başta bir atmacayı andırabilir. Daha sık rastlanan gri donunda erkeğinin başı, sırtı, boğazı ve göğsü gri; dişisinin boğazı ve göğsü kızılımsı veya devetüyü rengindedir. Kızıl donunun üst ve alt tarafında yoğun bir şekilde enine, siyah çizgiler bulunur.

Yaşam Alanları

Ormanlar, ağaçlık alanlar, park ve korular, bahçeler, bozkırlar, bataklıklar, fundalıklar ve tarım arazilerinin çevresinde görülür. Gugukkuşu kuluçka parazitidir. Yani yavrusunu kendisi yetiştirmez. Yumurtasını diğer kuşların (özellikle küçük ötücü kuşlar) yuvasına bırakır.

Beslenme

Böcekler, özellikle tüylü tırtıllar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Nisan ayından itibaren yaz dönemi boyunca Beykoz'un açık ormanları, fundalıkları ve diğer açıklık alanlarında gözlenmektedir.



Kaya Güvercini

Rock Dove
Columba livia

Kanat Açıklığı
50-67 cm

Boy
30-36 cm

Ağırlık
265-380 gr

Özellikleri

Evcil güvercinin atasıdır. Orta boylu ve tıknaz bir güvercin türüdür. Sırtı ve kanatları açık gri, başı ve boynu mavidir. Kanadında iki kalın siyah bant vardır. Kuyruk sokumu ve kanat altı beyazdır. Kuyruk ucunda siyah bir şerit bulunur.

Yaşam Alanları

Kayalık alanlar, deniz kıyıları, tarım alanları ve kırsal yerleşim yerlerinde görülür.

Beslenme

Tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca Beykoz'daki pek çok alanda görülmektedir.



Tahtalı

Common Wood Pigeon
Wood Pigeon

Kanat Açıklığı
70-80 cm

Boy
40-45 cm

Ağırlık
450-520 gr

Özellikleri

Bölgede görülen en büyük güvercin türüdür. Beyaz boyun lekesi ve uçarken çok uzaklardan dahi seçilebilen beyaz kanat paneli ile benzer türlerden rahatlıkla ayırt edilir. Erişkinin mavimsi başında sarı gagası ve açık sarı gözü dikkat çeker. Genci daha soluktur; boynunda beyaz leke yoktur, gagası ve gözleri koyudur.

Yaşam Alanları

Yaz aylarında ormanlık alanlarda üreyen bu tür kışın tarım alanları gibi daha açık arazilerde görülür.

Beslenme

Tohumlar ve küçük meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde büyük sürüler halinde uçarken görmek mümkündür. Ayrıca kış aylarında da uygun habitatlarda gözlemlenebilmektedir.



Gökçe Güvercin

Stock Dove
Columba oenas

Kanat Açıklığı
60-69 cm

Boy
28-34 cm

Ağırlık
250-340 gr

Özellikleri

Genel olarak kaya güvercinine benzer ve sıklıkla kaya güvercini ile karıştırılır. Ondan daha zarif bir görünümü vardır. Kuyruk sokumu ve kanat altı gri, gözü koyu renklidir. Kuyruk ucundaki siyah bant kaya güvercininden daha kalındır. Erişkinin gagası sarı, gencinin siyahtır.

Yaşam Alanları

Kırsal yerleşimlerin çevresinde, tarım alanlarında, açık arazilerde ve yaşlı ormanlarda görülür.

Beslenme

Temel besin kaynağı tohumlardır.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında Toygartepe'de ve Riva'da az sayıda görülebilirler.



Üveyik

European Turtle Dove
Streptopelia turtur

Kanat Açıklığı
45-53 cm

Boy
25-29 cm

Ağırlık
150-225 gr

Özellikleri

Kumrudan biraz daha küçük ve koyu renklidir. Uçuşu oldukça hızlıdır. Erişkinin kanat üstündeki siyah-kızıl tüyleri ile boyun yanlarındaki siyah lekeler dikkat çeker. Göğsü pembemsi olup karnı beyazdır. Genci daha soluk renklidir. Boyun yanlarındaki siyah leke siliktir veya yoktur.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, kırsal yerleşimler, açık araziler ve ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Ana besin kaynağını tohumlar ve yabani meyveler oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve yaz aylarında görülebilmektedir. Beykoz'da yaz döneminde açık ormanlık alanlarda üremektedir.



Kumru

Eurasian Collared Dove
Streptopelia decaocto

Kanat Açıklığı
35-50 cm

Boy
29-30 cm

Ağırlık
140-200 gr

Özellikleri

Alandaki en büyük kumrudur. Oldukça sade bir görünümü vardır. Siyah, kesik boyun halkası dikkat çeker. Genç bireylerinde boyun halkası bulunmaz. El telekleri koyu, kanat altı beyazdır.

Yaşam Alanları

Kırsal yerleşimler ve açık ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Tohum ve meyveler ile beslenir. Yavrularını kursak sütü ile besler.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu kırsal yerleşimlerde görülebilen yerli bir türdür.



Küçük Kumru

Laughing Dove
Spilopelia senegalensis

Kanat Açıklığı
40-45 cm

Boy
25-27 cm

Ağırlık
80-135 gr

Özellikleri

Küçük ve koyu renkli bir kumru türüdür. Sade bir görünümü vardır. Sırtı, alt tarafı ve kanatları kızıl kahverengi olup kanadında mavimsi-gri bir panel bulunur. Göğsünün üst kısmında küçük siyah benekler vardır. Erkeklerde bu benekler daha geniştir.

Yaşam Alanları

Şehir hayatına çok iyi uyum sağlamıştır. Kırsal alanlar, parklar ve bahçelerde de görülür.

Beslenme

Küçük tohumlar ve küçük meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen yerli bir türdür.



Sukılavuzu

Water Rail
Rallus aquaticus

Kanat Açıklığı
38-45 cm

Boy
22-28 cm

Ağırlık
85-135 gr

Özellikleri

Su tavuğundan küçük, alanda görülebilen diğer yelvelerden büyüktür. Saklı kalmayı sever, çoğu zaman sadece sesi duyulur. Alandaki diğer yelvelerden uzun ve hafifçe aşağıya kıvrımlı kırmızı gagasıyla rahatlıkla ayırt edilir. Alt tarafı, boğazı ve yanakları gri, üst tarafı kahverengi üzerine siyah beneklidir. Böğrü siyah-beyaz çizgilidir.

Yaşam Alanları

Bitki örtüsünün yoğun olduğu sulak alanlarda görülür.

Beslenme

Diyeti oldukça geniştir; böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar, balıklar, küçük sürüngenler ile küçük memeliler ve hatta kuşlarla beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca uygun habitata sahip alanlarda görülebilmektedir. Kış aylarında sayıları artmaktadır. Saklanmayı tercih ettiği için pek rastlanmasa da çevresi yoğun sazlıklara sahip Riva Deresi ve Riva'daki diğer göletlerde bulunur.



Bataklık Suyelvesi

Little Crake
Porzana parva

Kanat Açıklığı
34-39 cm

Boy
18-20 cm

Ağırlık
40-65 gr

Özellikleri

Tüm formlarında yeşil gagası, kırmızı gaga kökü, uzun primer projeksiyonu ve belirgin çizgili kuyruk altı örtüleri ile alandaki diğer yelvelerden ayırt edilir. Erişkin erkeğinin başının yanı ve alt tarafı düz gri, üst tarafı koyu kahverengidir. Erişkin dişisi erkeğe göre daha açık renklidir. Yanakları ve kaşı gri, boğazı beyazımsı, alt tarafı sarımsıdır. Genci dişisini andırır ancak böğründe siyah-beyaz şeritler bulunur.

Yaşam Alanları

Sazlık ve kamışlık alanlar, bataklık alanlar türün yaşam alanlarıdır.

Beslenme

Böcekler, sucul canlılar, bitkiler diyetinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve Sonbahar göç dönemlerinde Riva'daki sazlık ve bataklık alanlarda gözlemlenmektedir.



Benekli Suyelvesi

Spotted Crake
Porzana porzana

Kanat Açıklığı
35-42 cm

Boy
19-24 cm

Ağırlık
60-115 gr

Özellikleri

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm vücudu küçük beyaz beneklerle kaplıdır. Bu özelliği ile alanda görülen diğer yelvelerden rahatlıkla ayırt edilir. Kısa gagası sarı, gaga kökü kırmızı, kuyruk altı örtüleri krem rengidir. Erişkinin başı ve boynu gridir. Genç bireylerde bu grilik bulunmaz.

Yaşam Alanları

Bitki örtüsünün yoğun olduğu sulak alanlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, örümcekler, yumuşakçalar ile beslenir. Nadiren su bitkileri ve tohumları ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, Riva'daki küçük göletlerde görülebilmektedir.



Sutavuğu

Common Moorhen
Gallinula chloropus

Kanat Açıklığı
50-55 cm

Boy
32-38 cm

Ağırlık
200-373 gr

Özellikleri

Yüzerken ve yürürken devamlı hareket ettirdiği kuyruğunda, beyaz kuyruk altı örtüleri dikkat çeker. Yüzerken kafası daima ileri geri hareket eder. Erişkini sarı kırmızı gagası, kırmızı alın plakası ve koyu gövdesinin yanında bulunan beyaz şerit ile başka hiçbir türle karıştırılmaz. Uzun bacakları parlak yeşildir. Genci grimsi kahverengidir. Gagası koyudur, alın plakası bulunmaz.

Yaşam Alanları

Su bitkilerinin yoğun olduğu tatlı sularda bulunur. Etrafında sazlıkların olduğu çok küçük su birikintilerinde dahi üremektedir.

Beslenme

Su bitkileri, tohumlar, meyveler, yumuşakçalar ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da yıl boyunca uygun sulak alanlarda görülmektedir. Özellikle Riva Deresi ve Riva'daki diğer küçük göletler türün düzenli olarak görüldüğü ve ürediği alanlardır.



Sakarmeke

Eurasian Coot
Fulica atra

Kanat Açıklığı
70-80 cm

Boy
36-42 cm

Ağırlık
575-800 gr

Özellikleri

Ülkemizde en sık ve en yüksek sayılarda rastlanan su kuşudur. Genellikle ördek zannedilen bu tür aslında bir sutavuğudur. Erişkini simsiyah gövdesi ve alnındaki beyaz plaka ile başka hiçbir türle karıştırılmaz. Siyah başında bembeyaz gagası ve kırmızı gözleri dikkat çeker. Uzun bacakları yeşilimsidir. Birinci kışındaki bireylerin gövdesi daha açık renkli olup alnındaki plaka daha küçüktür.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, deniz kıyıları ve barajlarda görülür.

Beslenme

Bitkisel gıdalar, sucul böcekler, böcek larvaları, kabuklular ve yumuşakçalar diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu uygun habitata sahip alanlarda görülse de özellikle Beykoz sahil şeridinde kış döneminde sayıları oldukça artmaktadır. Riva Deresi'ndeki sazlıklarda kuluçkaya yatmaktadır.



Turna

Common Crane
Grus grus

Kanat Açıklığı
180-223 cm

Boy
110-120 cm

Ağırlık
4000-7000 gr

Özellikleri

Oldukça büyük olmasına rağmen çok zarif bir kuştur. Uzun bacakları ile yerde yavaş yavaş yürür. Şarkılara ve türkülere konu olan bu kuş hemen hemen herkes tarafından bilinir. Başı, boynu ve kanatları siyah olup gövdesi gridir. Yanaklarından boynuna inen beyaz leke ve kırmızı tepesi göze çarpar. Geceleri göç ederken sesleri ile kendilerini belli ederler.

Yaşam Alanları


Bataklıklar, ıslak çayırlar ve tarlalarda görülür. Sulak alanlar çevresindeki sazlıklar ve bataklıklarda ürer.

Beslenme

Böcekler, yumuşakçalar, kurbağalar, küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük balıklar ile meyve ve tohumlardan oluşan çok çeşitli bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde, Riva gibi sazlık ve bataklık alanlarda görülebilir. Ayrıca Toygartepe'de göç eden bireyleri zaman zaman görmek mümkündür.



Küçük Batağan

Little Grebe
Tachybaptus ruficollis

Kanat Açıklığı
40-45 cm

Boy
25-29 cm

Ağırlık
110-230 gr

Özellikleri

Alandaki en küçük batağandır. Üreme döneminde tepesi siyah, yanakları, boynu ve boğazı kestane rengidir. Sarı gaga dibi ile rahatlıkla tanınır. Kışın yanakları, boğazı ve boynu beyaz, alt tarafı bej, üst tarafı kahverengidir.

Yaşam Alanları


Göller, lagünler, nehir boyları, deniz kıyılarında bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, amfibiler ve küçük balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da her mevsim görülebilse de kış döneminde sayıları artmaktadır. Beykoz sahil şeridinde ve yoğun olarak Riva Deresi'nden kayıtları vardır.



Bahri

Great Crested Grebe
Podiceps cristatus

Kanat Açıklığı
60-85 cm

Boy
46-61 cm

Ağırlık
750-1200 gr

Özellikleri

Alanda görülen en büyük batağan türüdür. Boynu ve gövdesi uzun, gagası sivridir. Üreme döneminde kızıl boyunluğu ve kabarık baş tüylenmesi ile başka hiçbir türle karıştırılmaz. Üreme dışı döneminde daha sade bir görünümü vardır. Süs tüyleri ve boyunluğu kaybolur. Siyah göz pınarı ve beyaz yanakları dikkat çeker. Genci kış formuna benzer.

Yaşam Alanları

Tatlı su göllerinde üreyen bu tür, kışın deniz kıyılarında, göllerde ve lagünlerde irili ufaklı sürüler halinde görülür.

Beslenme

Ana besin kaynağı balıktır. Midye, solucan, kurtçuk gibi canlılar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu görülebilen bir tür olmasına rağmen, kışın sayıları oldukça artar ve Beykoz sahil şeridinde ve Karadeniz kıyılarında yüksek sayıda gözlemlenebilirler.



Karaboyunlu Batağan

Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis

Kanat Açıklığı
52-60 cm

Boy
28-35 cm

Ağırlık
220-450 gr

Özellikleri

Hafiften yukarı kalkık gagası, dik alnı ve üçgen tepesi ile alandaki diğer batağanlardan ayırt edilir. Üreme döneminde, koyu gövdesindeki altın rengi kulak örtüleri göze çarpar. Kışın genel olarak siyah-beyazdır. Bu dönemde kulaklı batağan ile karıştırılır. Yukarıda ilk cümlede belirtilen morfolojik özelliklerin dışında yanağındaki siyahlığın daha geniş olmasıyla ondan ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, deniz kıyıları ve akarsu ağızlarında görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, küçük balıklar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış mevsiminde, Beykoz sahil şeridi boyunca görülebilmektedir.



Uzunbacak

Black-winged Stilt
Himantopus himantopus

Kanat Açıklığı
67-85 cm

Boy
33-40 cm

Ağırlık
160-200 gr

Özellikleri

Oldukça zarif bir görünümü vardır. Olağanüstü uzunluktaki kırmızı bacakları, siyah beyaz renklenmesi, tığ gibi ince gagası ile rahatlıkla tanınır. Kanatları simsiyah olup alt tarafı beyazdır. Tepe ve ense renklenmesi siyah, gri ve beyaz olabilir. Gencinin üst tarafı ve başı kahverengidir.

Yaşam Alanları

Sığ suların ve bataklıkların çevresindeki kumullar ve çakıllı kıyılarda yuva yapar.

Beslenme

Böcekler, kabuklular, yumuşakçalar, küçük balıklar ve kurbağa larvaları ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde az sayıda görülmektedir. Riva Deresi'nde ve Riva'daki küçük sulak alanlarda kayıtları vardır.



Kızkuşu

Northern Lapwing
Vanellus vanellus

Kanat Açıklığı
70-85 cm

Boy
28-31 cm

Ağırlık
150-300 gr

Özellikleri

Zarif bir kıyı kuşudur. Kalkık siyah tepesi, turuncu kuyruk altı örtüleri ve parlak yeşil sırtı ile hiçbir türle karıştırılmaz. Geniş ve yuvarlak kanatlıdır. Beyaz kuyruğu üzerinde genişçe bir siyah leke bulunur. Gencinin pullu bir görünümü vardır.

Yaşam Alanları

Çevresinde sulak alan bulunan tarlalar, ıslak çayırlar, göl ve deniz kıyılarında görülür.

Beslenme

Solucanlar, kurtçuklar, böcekler ve örümcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile kış aylarında Riva çayırlarında ve çamurluk alanlarda görülebilmektedir.



Altın Yağmurcun

European Golden Plover
Pluvialis apricaria

Kanat Açıklığı
67-76 cm

Boy
26-29 cm

Ağırlık
140-210 gr

Özellikleri

Orta boylu, ince gagalı zarif bir yağmurcundur. Üreme döneminde simsiyah alt tarafı ve altın sarısı üst tarafı ile rahatlıkla tanınır. Genci ve kış formunda alt tarafındaki siyahlıklar kaybolur. Bölgede görülme olasılığı olan küçük altın yağmurcuna oldukça benzer. Altın yağmurcunun kanat altı beyaz, küçük altın yağmurcunun gridir. Ayrıca küçük altın yağmurcunun bacakları daha uzundur.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, çayırlık alanlar, lagün ve kıyı bataklık alanlarında gözlemlenmektedir.

Beslenme

Böcekler ve solucanlar diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Göç döneminde ve kış aylarında alanda görülebilir. Genellikle kışın Riva'daki çayırlıklarda görülmüştür.



Gümüş Yağmurcun

Grey Plover
Pluvialis squatarola

Kanat Açıklığı
56-77 cm

Boy
26-29 cm

Ağırlık
160-277 gr

Özellikleri

Altın yağmurcundan daha büyük, gagası daha uzun ve kalındır. Siyah-beyaz üreme giysisi dikkat çekicidir. Genci ve kış formu daha sadedir. Tüm formlarında özellikle uçarken seçilen siyah koltuk altı ve beyaz kuyruk sokumu gümüş yağmurcunu tanımlamayı kolaylaştırır.

Yaşam Alanları

Deniz ve göl kıyıları ile akarsu ağızlarında görülür.

Beslenme

Böcekler, solucanlar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde uygun alanlarda gözlemlenmektedir. Kayıtları genellikle Riva'dandır.



Halkalı Cılıbıt

Common Ringed Plover
Charadrius hiaticula

Kanat Açıklığı
48-57 cm

Boy
18-20 cm

Ağırlık
45-80 gr

Özellikleri

Orta boylu, tıknaz bir cılıbıttır. Turuncu bacakları, beyaz boyun halkası ve siyah göğüs kuşağı dikkat çeker. Üreme döneminde gagası iki renktir; gaga dibi turuncu, gaga ucu siyahtır. Üreme dönemi dışında ve gencinde gagası siyahtır.

Yaşam Alanları

Deniz ve göl kıyıları, ıslak çayırlar ile akarsu boylarında görülür.

Beslenme

Solucanlar, böcekler ve küçük kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde uygun alanlarda gözlemlenmektedir. Kayıtları genellikle Riva'daki küçük göletlerden ve Riva Deresi'nin denize döküldüğü bölgelerdendir.



Halkalı Küçük Cılıbıt

Little Ringed Plover
Charadrius dubius

Kanat Açıklığı
42-48 cm

Boy
14-17 cm

Ağırlık
30-50 gr

Özellikleri

Küçük, zarif bir cılıbıttır. Bütün formlarında bulunan, belirgin sarı göz halkası dikkat çeker. Boynu ve boğazı beyazdır. Siyah göğüs kuşağı bulunur. Bacakları soluk sarı veya pembemsidir. Alanda bulunan halkalı cılıbıt ile sık sık karıştırılır. Ondan daha küçük boyutu, koyu bacakları, sarı göz halkası ve daha ince göğüs kuşağıyla rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Göl, deniz ve akarsu kıyılarında görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, örümcekler ve solucanlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve yaz döneminde uygun alanlarda gözlemlenmektedir.



Dağ Cılıbıtı

Eurasian Dotterel
Charadrius Morinellus

Kanat Açıklığı
55-65 cm

Boy
20-22 cm

Ağırlık
85-140 gr

Özellikleri

Ensesine kadar uzanan uzun ve belirgin kaşı, göğsündeki ince beyaz şerit ve kendine has morfolojisi ile alandaki hiçbir tür ile karıştırılmaz. Erişkin dişisinin boğazı ve göğsünün üstü gri, karnı kızıldır. Erkeği daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Tundrada üreyen bu tür, göç dönemlerinde açık arazilerde görülür.

Beslenme

Böcekler, solucanlar, bitkilerin yeşil kısımları, küçük meyveler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde görülen bir geçit kuşudur. Son yıllarda ilkbaharda daha düzenli olmak üzere her iki göç dönemlerinde de Riva çayırlarında düzenli olarak görülmektedir.



Kervançulluğu

Eurasian Curlew
Numenius arquata

Kanat Açıklığı
80-100 cm

Boy
50-60 cm

Ağırlık
475-1360 gr

Özellikleri

Alanda görülebilecek en büyük kıyı kuşudur. Genel olarak kahverengidir. Oldukça çizgili bir görünümü vardır. Çok uzun ve aşağı kıvrık gagası dikkat çeker. Gaga boyutu; yaşa, cinsiyete ve alttüre göre değişiklik gösterir.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, bataklıklar, göl kıyıları, taşkın sahaları ve ıslak çayırlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, kabuklular ve yumuşakçalar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve kış aylarında Riva çayırlarında az sayıda görülmektedir.



Çamurçulluğu

Black-tailed Godwit
Limosa limosa

Kanat Açıklığı
63-82 cm

Boy
37-44 cm

Ağırlık
250-500 gr

Özellikleri

Büyük, zarif ve uzun gagalı bir kıyı kuşudur. Uzun, düz gagasının dibi turuncudur. Uçarken beyaz kanat çizgisi ve kuyruk ucundaki geniş siyah bant dikkat çeker. Uzun bacakları uçarken kuyruk ucunu belirgin şekilde aşar. Üreme döneminde başı, boynu ve göğsü turuncu, karnı ve böğrü siyah çizgilidir. Kışın daha sade bir görünümü vardır.

Yaşam Alanları

Çamur düzlükleri, sulak alanların kıyıları ve taşkın sahalarında bulunur.

Beslenme

Küçük balıklar, böcekler, böcek larvaları ve solucanlar ile beslenir. Göç ederken ve kışın bitkisel gıdaları da tüketir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile kış dönemlerinde seyrek olarak, Riva'daki küçük göletlerde görülmektedir.



Döğüşkenkuş

Ruff
Calidris pugnax

Kanat Açıklığı
46-58 cm

Boy
20-32 cm

Ağırlık
70-150 gr

Özellikleri

Uzun boyunlu, küçük başlı, kısa ve aşağı kıvrık gagalı bir kıyı kuşudur. Erkeğinin üreme dönemi giysisi oldukça gösterişlidir ve başka bir türle karıştırılmaz. Üreme dışı formunda genel olarak gri-kahve renklerindedir. Gencinin üst tarafındaki koyu kahverengi tüylerin kenarları krem rengi veya beyazdır. Başı, boynu ve göğsü krem rengidir.

Yaşam Alanları

Göl ve lagün kıyılarında, bataklıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, örümcekler, küçük kabuklular, küçük balıklar ve solucanlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Özellikle ilkbahar göçünde yüksek sayılarda görülebilir. Sonbahar ve kış kayıtları da vardır.



Karakarınlı Kumkuşu

Dunlin
Calidris alpina

Kanat Açıklığı
36-38 cm

Boy
16-22 cm

Ağırlık
48-64 gr

Özellikleri

Alandaki en yaygın kumkuşudur. Uzun gagası hafifçe aşağı kıvrıktır. Gagası ve bacakları siyahtır. Üreme döneminde çizgili başı, göğsü ve siyah karın lekesi ile diğer kumkuşlarından rahatlıkla ayırt edilir. Üst tarafı kızıl kahverengidir. Kışın tekdüze bir görünümü vardır. Üst tarafı ve başı gri, alt tarafı beyazdır. Göğsü ince çizgilidir.

Yaşam Alanları

Deniz, göl ve lagün kıyıları ile nehir ağızlarında görülür.

Beslenme

Böcekler, örümcekler ve solucanlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yaygın kış göçmeni olup, kış döneminde ve bahar dönemlerinde göç ederken görülmektedir.



Küçük Kumkuşu

Little Stint
Calidris minuta

Kanat Açıklığı
27-31 cm

Boy
12-15 cm

Ağırlık
20-40 gr

Özellikleri

Alanda görülebilecek en küçük kumkuşudur. Kısa, düz gagası ile kısa bacakları siyahtır. Üreme döneminde başı, boynu ve göğsü pas rengindedir. Kışın alt tarafı beyaz, üst tarafı açık gridir.

Yaşam Alanları

Deniz, göl ve lagün kıyıları, çamur düzlükleri ve ıslak çayırlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında Riva'daki sulak alanlarda görülebilmektedir.



Çulluk

Eurasian Woodcock
Scolopax rusticola

Kanat Açıklığı
56-60 cm

Boy
33-38 cm

Ağırlık
250-420 gr

Özellikleri

Desenli giysisi ile çok iyi kamufle olur. Suçulluğundan daha büyüktür. Göğsü ve karnı enine çizgilidir. Kuyruk sokumu kızıldır. Tepesinde enine açık şeritler vardır.

Yaşam Alanları

Meşelik alanlarda yaşar. Hava karardığında beslenmek için orman kenarındaki sulak alanlara veya orman açıklıklarına iner.

Beslenme

Böcekler ve solucanların diyetinin önemli bir kısmını oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde Beykoz'daki tüm yaprak döken ormanlar ve sulak alanların çevresinde görülebilmektedir.



Suçulluğu

Common Snipe
Gallinago gallinago

Kanat Açıklığı
39-47 cm

Boy
25-27 cm

Ağırlık
80-120 gr

Özellikleri

Uzun gagalı, çok iyi kamufle olabilen bir kıyıkuşudur. Sırtı koyu kahverengi olup üzerinde belirgin iki sarı şerit vardır. Göğsü çizgili kahverengi, karnı ise beyazdır. Koyu tepesini açık bir şerit ikiye ayırır. Zikzak çizerek uçar.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, ıslak çayırlar, sazlıklar, göl kıyıları ve taşkın sahalarında görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını bataklık alanlardaki solucanlar ve böcekler oluşturur, nadir olarak tohumları da tüketir.

Görüldüğü Dönem

Kış dönemleri ve göç dönemlerinde uygun sulak alanlarda görülebilmektedir.



Dere Düdükçünü

Common Sandpiper
Actitis hypoleucos

Kanat Açıklığı
32-41 cm

Boy
18-21 cm

Ağırlık
40-60 gr

Özellikleri

Yatay duruşlu, kısa bacaklı, küçük bir düdükçündür. Üst tarafı kahverengi, alt tarafı temiz beyazdır. Kanadın önü ile göğsü arasındaki beyaz girinti dikkat çeker. Kaşı, gözünün önünde belirgindir. Kanat ucu, kuyruk ucunu aşmaz.

Yaşam Alanları

Göller, akarsu kıyıları ve deniz kıyılarında görülür.

Beslenme

Böcekler, yumuşakçalar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl görülse de kış aylarında ve göç dönemlerinde daha sık görülmektedir.



Yeşil Düdükçün

Green Sandpiper
Tringa ochropus

Kanat Açıklığı
41-57 cm

Boy
21-24 cm

Ağırlık
70-90 gr

Özellikleri

Genel olarak koyu renkli bir düdükçündür. Uçarken görüldüğünde; kuyruk üstündeki enine koyu çizgiler ve oldukça koyu olan kanat altı göze çarpar. Orman düdükçünü ile sık sık karıştırılır. Sadece gözünün önünde belirgin olan kaşı, daha koyu renklenmesi ve üst tarafındaki beneklerin daha az ve daha ufak olmasıyla ondan rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Su birikintileri, tatlı su gölleri, nehir kenarları, taşkın sahaları ve nehir ağızlarında görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, kabuklular ve küçük balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da bulunan uygun sulak alanlarda yıl boyu görmek mümkündür. Özellikle Riva Deresi'nde ve Riva çayırlarında bulunan küçük göletlerde sık sık gözlenir.



Orman Düdükçünü

Wood Sandpiper
Tringa glareola

Kanat Açıklığı
34-37 cm

Boy
19-23 cm

Ağırlık
50-90 gr

Özellikleri

Beyaz-kahverengi renklerde küçük bir düdükçündür. Gaga dibinden gözünün gerisine kadar uzanan kaşı dikkat çeker. Kahverengi üst tarafında belirgin beyaz benekler bulunur. Beyaz kuyruk üstü enine koyu çizgilidir.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, taşkın sahaları, tatlı su gölleri ve akarsu kenarlarında görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları, yumuşakçalar, kabuklular, küçük balıklar ve nadiren tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde sulak alanlarda görülmektedir. Az sayıda yaz kayıtları da vardır.



CHARADRIIFORMES / YAĞMURKUŞLARI

Kızılbacak

Common Redshank
Tringa totanus

Kanat Açıklığı
45-66 cm

Boy
27-29 cm

Ağırlık
110-155 gr

Özellikleri

Gri-kahverengi renklerde, kırmızı bacaklı, orta boylu ve ürkek bir kıyı kuşudur. Gaga dibi kırmızı, gaga ucu koyu renklidir. Özellikle uçarken seçilen beyaz firar hattı oldukça geniştir. Kuyruk üstünden sırtına doğru kama şeklinde bir beyaz hat sokulur. Gencinin gagası koyudur.

Yaşam Alanları

Islak çayırlar, bataklıklar, meralar, tuzcul bataklıklar, kumlu sahiller, çamur düzlükleri ve göllerin kıyılarında görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, solucanlar ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve kış aylarında Riva'nın sulak alanlarında görülebilmektedir.



Bataklık Düdükçünü

Marsh Sandpiper
Tringa Stagnatilis

Kanat Açıklığı
55-60 cm

Boy
22-24 cm

Ağırlık
45-120 gr

Özellikleri

İnce boyunlu ve uzun bacaklı bir düdükçündür. Zarif bir görünümü vardır. Tığ gibi ince uzun gagası göze çarpar. Bacakları uçarken kuyruk ucunu belirgin olarak aşar. Beyaz kuyruk sokumu sırtına kama şeklinde sokulur.

Yaşam Alanları

Göl ve lagün kıyıları ile bataklıklarda görülür.

Beslenme

Sucul böcekler, kurtçuklar ve kabuklu canlılar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde Riva'daki çevresi sazlık sulak alanlar ve bataklık alanlarda gözlemlenmektedir.



Yeşilbacak

Common Greenshank
Tringa nebularia

Kanat Açıklığı
60-70 cm

Boy
30-35 cm

Ağırlık
140- 190 gr

Özellikleri

Bölgede görülen en büyük düdükçündür. Genel olarak gri ve beyaz renklerdedir. Uçarken görüldüğünde sırtındaki kama şeklindeki beyazlık göze çarpar. Yukarı hafifçe kıvrık gagası ve boyutu ile alanda görülen diğer düdükçünlerden rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Haliçler, göller, lagünler ve tatlı su kenarlarında görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları, küçük balıklar, yumuşakçalar diyetinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında uygun habitata sahip sulak alanlarda görülebilir; göç dönemlerinde sayıları biraz artış göstermektedir.



Bataklıkkırlangıcı

Collared Pratincole
Glareola pratincola

Kanat Açıklığı
60-70 cm

Boy
23-27 cm

Ağırlık
70-90 gr

Özellikleri

Kısa bacaklı, küçük gagalı, uzun ve sivri kanatlı, derin çatallı kuyruğu bulunan bir kıyı kuşudur. Genel görünümü ile alandaki başka hiçbir tür ile karıştırılmaz. Üst tarafı kum rengi, göz pınarı siyah, gaga dibi kırmızı, boğazı sarıdır. Boğazındaki sarılığı ince siyah bir hat sınırlar. Uçarken beyaz firar hattı ve kızıl kanat altı dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Çayırlık alanlar ve sulak alanların kıyılarında görülür.

Beslenme

Böcekler, örümcekler ve yumuşakçalar diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Riva çayırlarında göç dönemlerinde görülmektedir.



İncegagalı Martı

Slender-billed Gull
Chroicocephalus genei

Kanat Açıklığı
90-110 cm

Boy
37-44 cm

Ağırlık
250-350 gr

Özellikleri

İsmini de aldığı gagası, ince ve uzundur. Orta boylu, zarif bir martıdır. Uçarken seçilen dış el telekleri dikkat çeker. Yaz aylarında erişkinin göğsünün altı ve karnı pembe, gagası kıpkırmızıdır. Genç bireylerin gagası sarı, gaga ucu koyudur.

Yaşam Alanları

Akarsu ağızları, deniz kıyıları, lagünler ve göllerde görülür.

Beslenme

Küçük balıklar, böcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da az sayıda kış mevsiminde sahil kesimlerde görülebilmektedir.



Karabaş Martı

Black-headed Gull
Chroicocephalus ridibundus

Kanat Açıklığı
90-110 cm

Boy
34-37 cm

Ağırlık
190-400 gr

Özellikleri

İnce gagalı, orta boylu bir martıdır. İsmi karabaş martı olsa da üreme dönemindeki erişkinin başı koyu kahverengidir. Gagası ve bacakları kırmızıdır. Kış aylarında siyah başlığı beyaza döner. Gencinin üst tarafı kahverengi beneklidir. Sırtı ilk kışında griye döner.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, göller, lagünler, ıslak çayırlar, kentsel alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, amfibiler, sürüngenler, balıklar ve küçük memelilerden oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl görülse de kış döneminde Beykoz'da sayıları oldukça artmaktadır. Yazın üremek için insanlardan uzak sazlık alanlara gittikleri için görülmesi zordur.



Küçük Martı

Little Gull
Hydrocoloeus minutus

Kanat Açıklığı
61-75 cm

Boy
28-30 cm

Ağırlık
90-150 gr

Özellikleri

Bölgede görülebilecek en küçük martı türüdür. İsmini de buradan almıştır. Genel görünümü ve davranışlarıyla martıdan ziyade bir sumruyu andırır. Erişkinin siyah kanat altı ve beyaz firar hattı göze çarpar. Üreme döneminde başı boynuna kadar siyahtır. Kışın başı beyazlaşır. İlk kışındaki bireylerin kanat altı siyah değildir. Kanat üstünde çapraz siyah bir bant bulunur.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, nehir boyları, akarsu ağızları, lagünler ve göllerde görülür.

Beslenme

Küçük balıklar, böcekler, yumuşakçalar ve küçük kabuklular diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl görülebilen kış mevsiminde sayıları yükselen küçük martı, Riva koylarında ve Beykoz sahil şeridinde görülebilmektedir.



Akdeniz Martısı

Mediterranean Gull
Ichthyaetus melanocephalus

Kanat Açıklığı
98-105 cm

Boy
36-38 cm

Ağırlık
215-350 gr

Özellikleri

Boyutu karabaş martı ile küçük gümüş martı arasındadır. Genel görünümü ile karabaş martı ile sıklıkla karıştırılır. Yaştan bağımsız olarak kalın gagası ve kalın gövdesi ile ondan ayırt edilir. Üreme döneminde lekesiz bembeyaz kanatları, ensesine kadar inen simsiyah başı, kıpkırmızı gagası ve bacakları ile ayırt edilir. Kışın başındaki siyahlık gözünün gerisindeki küçük bir lekeye indirgenir. İlk kışındaki bireylerin bacakları ve gagası siyahtır. Koyu el teleklerinin üzerinde beyaz benekler bulunur.

Yaşam Alanları

Göller, deniz kıyıları ve lagünler görüldüğü alanlardan bazılarıdır.

Beslenme

Balıklar başta olmak üzere sucul omurgasızlar ve yumuşakçalar ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz kıyılarında görülmektedir.



Küçük Gümüş Martı

Mew Gull
Larus canus

Kanat Açıklığı
107-114 cm

Boy
40-46 cm

Ağırlık
360-600 gr

Özellikleri

Boyu karabaş martı ile gümüş martı arasındadır. Görünüşü ile gümüş martıyı andırabilir. Kısa gagalı ve koyu gözlüdür. Erişkinin bacakları ve gagası yeşil-sarıdır. Kışın başında kırçıllar bulunur. İkinci kışındaki bireylerin sadece başı değil ensesi, boynu ve göğsü de kırçıllıdır. Gagasındaki siyah halka daha kalındır.

Yaşam Alanları

Kışın deniz kıyılarında, tarlalarda ve ıslak çayırlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar ve küçük balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göçmen bir kış türüdür. Nisan ayına kadar kış döneminde, Beykoz sahil şeridinde görmek mümkündür.



Hazar Martısı

Caspian Gull
Larus cachinnans

Kanat Açıklığı
140-155 cm

Boy
55-68 cm

Ağırlık
800-1500 gr

Özellikleri

Gümüş martıya oldukça benzer ve sık sık gümüş martı ile karıştırılır. Basık alnı, uzun gagası ve bacakları, alt gagasındaki çıkıntının daha basık oluşu ve küçük koyu gözleri ile ondan ayırt edilir. Bacak rengi genellikle pembe olsa da varyasyon gösterir. Kışın ensesinde kırçıllar bulunur.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, göller, lagünler ve akarsularda görülür.

Beslenme

Balıklar, böcekler, kabuklular ve yumuşakçalar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış mevsiminde Beykoz sahil şeridinde gümüş martılar arasında görülmektedir. Nadiren Riva Deresi çevresindeki çayırlarda da görülür.



Gümüş Martı

Yellow-legged Gull
Larus michahellis

Kanat Açıklığı
130-158 cm

Boy
55-68 cm

Ağırlık
750-1250 gr

Özellikleri

İstanbul'un en çok tanınan kuşlarından biri-sidir. Alanda görülen büyük martılar arasında en yaygın olanıdır. Erişkinin sırtı açık gri, bacakları ve gagası sarıdır. Kışın başında kırçıllar görülür. Genci oldukça koyudur.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, göller, lagünler, kentsel alanlar, akarsular ve çöplüklerde görülür.

Beslenme

Küçük balıklar, yumuşakçalar, böcekler, böcek larvaları, kabuklular, sürüngenler, küçük kuşlar ve memeliler, kuş yumurtaları, kuş yavrularından oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Beykoz için yerli bir kuştur. Her mevsim yaygın bir şekilde görülebilmektedir.



Karasırtlı Martı

Lesser Black-backed Gull
Larus fuscus

Kanat Açıklığı
135-150 cm

Boy
52-64 cm

Ağırlık
545-1000 gr

Özellikleri

Hemen hemen gümüş martı boylarındadır. Erişkinin kanat ve sırtı açık griden koyu siyaha kadar farklı renklerde olabilir. Gagası ve bacakları sarıdır. Genci gümüş martı gencine benzer. Sırtı ve kanatları daha az desenli ve daha koyudur.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, lagünler, bataklıklar ve çöplüklerde görülür.

Beslenme

Balıklar, yumuşakçalar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde ve göç dönemlerinde Beykoz'un tüm sahil şeridinde görülebilir.



Karagagalı Sumru

Sandwich Tern
Thalasseus sandvicensis

Kanat Açıklığı
84-95 cm

Boy
34-45 cm

Ağırlık
180-300 gr

Özellikleri

Uzun ve dar kanatlı, orta boylu, uzun gagalı bir sumru türüdür. Siyah gagasının ucunda bulunan sarılık türün tanımlanmasını kolaylaştırır. Gaga ucundaki sarılık çok uzaklardan bile fark edilir. Bacakları siyahtır. Siyah tepesi kabarıktır. Gencinin gagası daha kısadır, üst tarafının pullu bir görünümü vardır.

Yaşam Alanları

Deniz ve göl kıyıları ile lagünlerde görülür.

Beslenme

Diyetinin çoğunluğunu balıklar oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında tüm sahil şeridinde görülebilmektedir.



Sumru

Common Tern
Sterna hirundo

Kanat Açıklığı
75-80 cm

Boy
31-38 cm

Ağırlık
93-200 gr

Özellikleri

Uzun ve ince kanatlı, ince yapılı küçük bir martıyı andırır. Alanda en yaygın ve en bol görülen sumru türüdür. Kuyruğu derin çatallıdır. Üreme döneminde gagası koyu kırmızı, tepesi ve gaga ucu siyah, yanakları ve boğazları beyaz olup, alt tarafı açık gridir. Kış aylarında gagası siyah olup, alnı beyazdır. Gencinin gaga dibi turuncudur. Kanat üstünde ve sırtında kahverengilikler bulunur.

Yaşam Alanları

Deniz kıyılarında, lagünlerde ve göllerde bulunan ufak adalarda koloniler halinde yuva yapar. Göç dönemlerinde deniz kıyılarında daha sık rastlanır.

Beslenme

Diyetinin büyük çoğunluğunu küçük balıklar oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar, sonbahar ve yaz dönemlerinde deniz kıyılarında, koylarında ve Riva Deresi'nde görülebilir.



Bıyıklı Sumru

Whiskered Tern
Chlidonias hybrida

Kanat Açıklığı
64-78 cm

Boy
23-29 cm

Ağırlık
70-95 gr

Özellikleri

Üreme giysisinde tepesi siyah, yanakları beyaz, sırtı, kuyruğu ve alt tarafı koyu gridir. Kanat üstü açık gümüş renktedir. Kalınca olan gagası koyu kırmızıdır. Üreme dışı giysisinde alt tarafı ve alnı beyazdır. Gencinin sırtı kahverengidir.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, akarsu boyları ve deniz kıyılarında görülür.

Beslenme

Böcekler, örümcekler, kabuklular, küçük balıklar ve kurbağalar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Genellikle ilkbahar ve sonbaharda geçit kuşudur, az sayıda kış ve yaz aylarında da Riva Deresi'nde, deniz kıyılarında ve Riva'daki sulak alanlarda görülebilir.



Akkanatlı Sumru

White-winged Tern
Chlidonias leucopterus

Kanat Açıklığı
58-67 cm

Boy
23-27 cm

Ağırlık
40-75 gr

Özellikleri

Üreme döneminde siyah-beyaz renkleriyle alacalı bir görünüme sahiptir. Gövdesi, başı ve kanat altı örtüleri simsiyah olup kanatları, kuyruğu ve kuyruk sokumu bembeyazdır. Üreme dışı formunda alt tarafı beyaz, sırtı açık gridir. Gencinin sırtı düz kahverengidir. Genel olarak kara sumruya benzer. Ondan tüm formlarında daha kısa, kalın gagası ile daha uzun bacaklarıyla, üreme döneminde simsiyah kanat altı örtüleriyle, üreme dışı formunda ve gencinde ise siyah omuz lekesinin olmaması ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Bataklık alanlar, barajlar ve bitki örtüsü zengin olan tatlı su gölleri ve sazlıklar görüldüğü alanlardan bazılarıdır.

Beslenme

Balıklar, amfibiler ve karasal böcekler besin listesinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde Riva Deresi'nde, Riva'daki küçük göletlerde ve daha nadir olarak deniz kıyısında görülebilmektedir.



Kara Sumru

Black Tern
Chlidonias niger

Kanat Açıklığı
56-67 cm

Boy
52-64 cm

Ağırlık
50-74 gr

Özellikleri

Üreme döneminde simsiyah gövdesi, gri kanatları ve kuyruk üstü ile rahatlıkla tanınır. Siyah olan gagası ince ve uzundur. Üreme dışı dönemi ve genci bıyıklı sumru ve akkanatlı sumrunun aynı dönemdeki bireyleri ile karıştırılabilir. Onlardan ince uzun gagası ve omzundan göğsüne doğru inen siyah şerit ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Lagünler, koylar, deniz kıyıları, göller ve bataklıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve küçük balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde Riva Deresi'nde, Boğaz ve Karadeniz kıyılarında az sayıda görmek mümkündür.



Karagerdanlı Dalgıç

Black-throated Loon
Gavia arctica

Kanat Açıklığı
100-130 cm

Boy
62-75 cm

Ağırlık
1300-3400 gr

Özellikleri

Büyük, kalın gagalı, siyah-beyaz renkli bir dalgıçtır. Kış aylarında kızılgerdanlı dalgıç ile karıştırılabilir. Ondan daha büyük ve daha kalın gagalı olup sırtı lekesizdir. Böğründe beyaz bir leke bulunur. Ayrıca boynundaki siyahlık daha geniştir.

Yaşam Alanları

Açık denizde, limanlarda ve koylarda görülür.

Beslenme

Balıklar ve suda yaşayan omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde ve ilkbaharda Beykoz'un Karadeniz kıyılarında, Poyrazköy Limanı gibi koylarda görülebilir.



Yelkovan

Yelkouan Shearwater
Puffinus yelkouan

Kanat Açıklığı
76-82 cm

Boy
30-35 cm

Ağırlık
330-480 gr

Özellikleri

Üst tarafı kahverengi siyah renklerde, alt tarafı ve kanat altı bembeyazdır. Akdeniz'deki en yaygın, Karadeniz'deki tek yelkovan türüdür. İçtikleri deniz suyunu, burunlarındaki tuz bezleri yardımıyla filtre ederek dışarı atarlar. İrili ufaklı sürüler halinde suyun hemen üzerinden, suya değecek gibi yakından uçarken görülür.

Yaşam Alanları

Açık denizdeki adalar, kayalık kıyılar ve yarlar üreme alanlarıdır. Boğaz'da gruplar halinde beslenirken ve uçarken görmek mümkündür.

Beslenme

Küçük balıklar ana besin kaynağıdır. Ayrıca yüzeye yakın buldukları küçük omurgasızları da diyetine dahil eder.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'de görülebilen bu türün, bilinen üreme kayıtları yoktur.



Leylek

White Stork
Ciconia ciconia

Kanat Açıklığı
155-165 cm

Boy
100-115 cm

Ağırlık
2200-4400 gr

Özellikleri

Masallara ve hikayelere sıkça konu olması ve nispeten insan yerleşimlerine yakın yerlerde yuvalanabilmesi nedeniyle hemen hemen herkes tarafından bilinen bir kuş türüdür. Uzun, kırmızı bacakları; büyük, kırmızı gagası; siyah kanat telekleri ve beyaz gövdesi ile rahatlıkla tanınır. Gencinin gagası daha kısadır.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki kırsal yerleşimler, sığ göletler ve ıslak çayırlarda görülür. Ağaçlara, çatılara ve elektrik direklerine yuva yapar.

Beslenme

Yılanlar, kertenkeleler, amfibiler, solucanlar, böcekler ve küçük memeliler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göçünde gökyüzünde kalabalık sürüler halinde ya da çayırlık alanlarda beslenirken görülebilirler. Ayrıca Beykoz'un köylerinde az sayıda üreme kaydı vardır.

Sonbahar göçünde İstanbul Boğazı'nın güneyinden gitmeyi tercih ettikleri için Beykoz'dan az sayıda görülebilirler.



Kara Leylek

Black Stork
Ciconia nigra

Kanat Açıklığı
145-155 cm

Boy
95-100 cm

Ağırlık
2800-3000 gr

Özellikleri

Başı, boynu, göğsü, kanatları ve sırtı uzaktan siyah gibi gözükse de yakından bakıldığında parlak yeşil veya mor olduğu görülür. Kırmızı gagası, göz çevresi ve bacakları dikkat çeker. Karnı ve kuyruk altı beyazdır.

Yaşam Alanları


Kayalıklar, akarsu kenarları, göl kıyıları ve orman açıklıklarında görülür.

Beslenme

Amfibiler, balıklar, böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde normal leyleğe göre az sayıda görülebilmektedir. Yaz döneminde ise Beykoz'da üreyen bireyler ormanlık alanlarda görülebilmektedir.



Küçük Karabatak

Pygmy Cormorant
Microcarbo pygmeus

Kanat Açıklığı
80-90 cm

Boy
40-55 cm

Ağırlık
570-870 gr

Özellikleri

Karabataktan oldukça küçüktür. Yuvarlak başı, kalın boynu ve kısa gagası dikkat çeker. Gözü siyahtır. Kuyruğu boyuna göre oldukça uzundur. Üreme döneminde başı ve boynu kızıl kahverengidir. Kışın boğazı beyazlaşır. Genci erişkine göre daha soluk renkli olup genel olarak kahverengidir.

Yaşam Alanları

Göller, göletler, sazlıklar ve akarsu ağızlarında görülür.

Beslenme

Suya dalarak yakaladığı balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülse de kışın Beykoz'daki sayıları artmaktadır. Riva Deresi ve Beykoz sahil şeridinde görülmektedir.



Tepeli Karabatak

European Shag
Phalacrocorax aristotelis

Kanat Açıklığı
90-105 cm

Boy
65-80 cm

Ağırlık
1750 - 2250 gr

Özellikleri

Boyutu ve genel özellikleri ile sıklıkla karabatak ile karıştırılır. Ondan daha ince gagası, kalkık tepesi (özellikle üreme döneminde) ve dik alnı ile ayırt edilebilir. Ayrıca dikkatli bakıldığında ondan biraz daha küçüktür. Üreme döneminde gövdesi simsiyah, gaga dibi sarıdır. Genci erişkine göre daha soluk renklidir; alt tarafı beyaz, üst tarafı koyu kahverengidir. Uçarken gencinin kanat üstündeki açık alanlar dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, özellikle kayalık kıyılarda yaşar; kayaların oyuklarına yuva yapar.

Beslenme

Balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un kıyı şeridinde görülmektedir.



Karabatak

Great Cormorant
Phalacrocorax carbo

Kanat Açıklığı
130-160 cm

Boy
80-100 cm

Ağırlık
2000 - 2500 gr

Özellikleri

Kalın gagalı, koyu bir su kuşudur. Yanakları ve boğazı beyaz, gaga dibindeki kesesi sarı veya turuncudur. Üreme döneminde böğründe görülen beyaz leke dikkat çeker. Genci daha soluk renklidir; alt tarafı kirli beyaz veya kahverengidir.

Yaşam Alanları

Deniz kıyısı, göletler ve dereler türün görüldüğü alanlardır.

Beslenme

Çok iyi bir yüzücüdür. Suya dalarak yakaladığı balıklar, sucul omurgasızlar ve kabuklular ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yılın her döneminde görülse de Beykoz'da kış döneminde sayıları artmaktadır.



Çeltikçi

Glossy Ibis
Plegadis falcinellus

Kanat Açıklığı
80-95 cm

Boy
55-65 cm

Ağırlık
500-800 gr

Özellikleri

Koyu renkli, uzun ve kıvrık gagalı bir kuştur. Uzaktan siyah görünür. Yakından bakınca mor-kızıl yanardönerli, kahverengi giysisi ve kanadındaki metalik yeşil dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde görülür. Ağaçların veya çalıların üzerine yuvalanır.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, küçük balıklar ve amfibiler ile beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde uygun alanlarda gözlemlenmektedir. İlkbahar göç döneminde Riva çayırlarındaki göletlere bakmakta fayda vardır.



Kaşıkçı

Eurasian Spoonbill
Platalea leucorodia

Kanat Açıklığı
115-130 cm

Boy
80-90 cm

Ağırlık
1200-1700 gr

Özellikleri

İsmini de aldığı kaşık şeklinde olan kendine has gagasıyla alandaki diğer bütün türlerden rahatlıkla ayırt edilir. Erişkinin gagası siyah renkte olup, ucu açık renklidir. Sarı boyun bandı dikkat çeker. Gencinin gagası pembemsidir. Boyun bandı bulunmaz.

Yaşam Alanları


Sığ sulak alanlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, solucanlar, iribaşlar ve küçük balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda, kış döneminde uygun tabiat alanlarında ve göç dönemlerinde geçiş yaparken gözlemlenebilir.



Balaban

Eurasian Bittern
Botaurus stellaris

Kanat Açıklığı
125-135 cm

Boy
70-80 cm

Ağırlık
900-1000 gr

Özellikleri

İri yapılı, kalın boyunlu bir sazlık kuşudur. Üst tarafı siyah desenlidir. Gövdesine açık kahverengi ve koyu krem renkler hakimdir. Sazlık alanlarda saklanır ve görülmesi zordur. Genelde flüt benzeri, pes uğultulu sesi ile tanınır.

Yaşam Alanları

Su kanalları, yoğun sazlık alanlar, bataklık ve göllerde görülür.

Beslenme

Balıklar, amfibiler, solucanlar, kertenkeleler, küçük yılanlar, küçük memeliler ve küçük kuşlardan oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Kışın düzenli ancak az sayıda görülen bir türdür.



Küçük Balaban

Little Bittern
Ixobrychus minutus

Kanat Açıklığı
40-58 cm

Boy
27-36 cm

Ağırlık
90-150 gr

Özellikleri

Alandaki en küçük balıkçıl türüdür. Saklı kalmayı sever. Erişkin erkeğin tepesi, kanat telekleri ve sırtı siyah, özellikle uçarken seçilen oval kanat lekesi devetüyü rengindedir. Erişkin dişisi erkeğe göre daha koyudur. Genci yoğun çizgilidir.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, göller ve akarsulardaki sazlık alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını balıklar oluşturur. Böcekler, yumuşakçalar, amfibiler ve kabuklular ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve yaz aylarında Beykoz'daki sulak alanlarda bulunan sazlıklarda gözlemlenmektedir. Kabakoz ve Riva'dan kayıtları vardır.



Gece Balıkçılı

Black-crowned
Night Heron
Nycticorax nycticorax

Kanat Açıklığı
105-112 cm

Boy
58-65 cm

Ağırlık
595-850 gr

Özellikleri

Kısa ve kalın gagalı, tıknaz vücutlu, küçük, beyaz ve gri renklerdeki bir balıkçıldır. Erişkinin tepesi ve sırtı siyah, alnı, yanakları ve boğazı beyaz, gözleri kırmızı, kısa ve kalın gagası simsiyahtır. Genci kahverengidir ve kanatlarında beyaz benekler bulunur.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, akarsular, ıslak çayırlar ve sulak alanların çevresindeki ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Küçük balıklar, amfibiler, yılanlar, kertenkeleler, küçük memeliler, küçük kuşlar, kabuklu canlılar, böcekler, yumuşakçalardan oluşan oldukça geniş bir diyete sahiptir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve yaz aylarında az sayıda, uygun yaşam alanına sahip alanlarda görülebilmektedir.



Alaca Balıkçıl

Squacco Heron
Ardeola ralloides

Kanat Açıklığı
80-92 cm

Boy
44-47 cm

Ağırlık
230-370 gr

Özellikleri

Küçük ve tıknaz bir görünümü vardır. Yerdeyken koyu gözükse de uçarken şaşırtıcı derecede beyazdır. Erişkinin üreme giysisinde karnı ve kanatları beyaz, gövdesi sarımsıdır. Çizgili tepesinden çıkan süs tüyleri oldukça uzundur. Gözünün önündeki deri yeşil, gaga dibi mavi, gaga ucu siyahtır. Kış formunda ve gencinde gaga dibi sarımsı, başı ve göğsü çizgilidir.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, çamurlu alanlar, sulak alanlar, göller ve göletlerin etrafında görülür.

Beslenme

Amfibiler, küçük balıklar ve böcekler besin listesinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde Riva Deresi ve ıslak çayırlarda görülebilmektedir.



Sığır Balıkçılı

Western Cattle Egret
Bubulcus ibis

Kanat Açıklığı
82-96 cm

Boy
45-53 cm

Ağırlık
200-600 gr

Özellikleri

Kısa bacaklı ve nispeten kısa gagalı, tıknaz, küçük, beyaz bir balıkçıldır. Kısa ve kalın bir boynu vardır. Üreme döneminde tepesi, sırtı ve göğsü turuncu tonlardadır. Kur döneminde gaga dibi pembe, gaga ucu turuncudur. Üreme dışı döneminde gövdesi bembeyaz, gagası sarıdır.

Yaşam Alanları

Tarım alanlarının çevresinde ve ıslak çayırlarda görülür.

Beslenme

Genellikle otlayan hayvanların etrafında beslenir. Böcekler, yumuşakçalar, kabuklular, kertenkeleler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde seyrek olarak görülmektedir. Riva çayırlıklarında kayıtları vardır.



Gri Balıkçıl

Grey Heron
Ardea cinerea

Kanat Açıklığı
175-195 cm

Boy
90-98 cm

Ağırlık
1000-2000 gr

Özellikleri

Gri ve beyaz renklerde, uzun boyunlu ve büyük bir balıkçıldır. Uzun gagası oldukça kalındır. Üst tarafı gri, boynu, tepesi ve yanakları beyazdır. Boynunda siyah benekler görülür. Sarımsı veya gri olan gagası kur döneminde turuncu olur. Genci erişkinden daha koyudur.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde ve deniz kıyılarında bulunur.

Beslenme

Balıklar, amfibiler, kertenkeleler, yılanlar, kabuklular, yumuşakçalar ve böceklerden oluşan oldukça geniş bir diyeti vardır.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu hem deniz kıyılarında hem de iç sularda görülse de kışın sayıları artmaktadır.



Erguvani Balıkçıl

Purple Heron
Ardea purpurea

Kanat Açıklığı
120-150 cm

Boy
78-90 cm

Ağırlık
525-1345 gr

Özellikleri

İnce ve zarif görünümlü bir balıkçıldır. Gagası gri balıkçıldan daha uzun ve incedir. Uzun, kıvrımlı boynu bir yılanı andırır. Erişkinin üstü koyu gri, gagası sarı, yüzü ve boynu kestane renkli olup karnı daha koyudur. Boynunda siyah kalın çizgiler bulunur. Genci daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde görülen bu tür, yuvasını sazların arasına yapar.

Beslenme

Diyeti oldukça geniştir; balıklar, yılanlar, amfibiler, kertenkeleler, küçük kuşlar, küçük memeliler, böcekler ve yumuşakçalar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç döneminde sazlık ve sulak alanlarda ya da göç ederken gözlemlenmektedir. Riva'da az sayıda yaz döneminde de görülmektedir.



Büyük Ak Balıkçıl

Great Egret
Ardea alba

Kanat Açıklığı
140-170 cm

Boy
85-105 cm

Ağırlık
1000-1500 gr

Özellikleri

Oldukça uzun ve kıvrık boyunlu, bembeyaz, büyük bir balıkçıldır. Ayakları her zaman siyahtır. Üreme döneminde sırtında iki süs tüyü bulunur. Üreme döneminde gagası siyah (gaga dibi sarı), üreme dışı döneminde ve gencinde sarıdır.

Yaşam Alanları

Bataklıklar ve sulak alanların kıyılarında görülür. Yuvasını sazların veya ağaçların içine yapar.

Beslenme

Diyeti oldukça geniştir; balıklar, böcekler, yumuşakçalar, küçük kuşlar, kuş yavruları, küçük kemirgenler, yılanlar ve kertenkeleler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu az sayıda görülebilir. Kışın ise sayıları artmaktadır.



Küçük Ak Balıkçıl

Little Egret
Egretta garzetta

Kanat Açıklığı
88-95 cm

Boy
55-65 cm

Ağırlık
350-550 gr

Özellikleri

Zarif ve bembeyaz bir balıkçıldır. Bu nedenle büyük ak balıkçıl ile sıklıkla karıştırılır. Ondan oldukça küçük boyutu ve her zaman sarı renkte olan ayakları ile rahatlıkla ayırt edilir. Gagası ve bacakları genellikle siyahtır. Üreme döneminde, başında bir çift süs tüyü bulunur.

Yaşam Alanları

Taşkın sahalarında, göl ve lagünlerin kıyılarında, tarım alanlarında görülür.

Beslenme

Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kabuklular ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yazın ve göç dönemlerinde Riva ve Kabakoz gibi dere ve bataklık alanların olduğu alanlarda görülebilen bir türdür. Kışın da görülme ihtimali vardır.



Ak Pelikan

Great White Pelican
Pelecanus onocrotalus

Kanat Açıklığı
234-309 cm

Boy
140-175 cm

Ağırlık
7000-9300 gr

Özellikleri

Oldukça büyük ve iri bir kuştur. Tüm formlarında göz maskesinin bulunması ve kanat teleklerinin hem altının hem de üstünün siyah olması ile tepeli pelikandan rahatlıkla ayırt edilir. Bacakları pembe, kesesi sarı veya turuncudur. Erişkinin üreme döneminde gövdesi sarımsı pembedir. Tepesi kabarıktır. Genci daha kahverengidir.

Yaşam Alanları

Tatlı ve acı sığ göller, bataklık alanlar, deniz kıyıları türün gözlemlendiği alanlardandır.

Beslenme

Ana besin kaynağı balıklardır. Genellikle sürü halinde balıkları sürerek beslenirler.

Görüldüğü Dönem

Kış aylarında daha az olmakla birlikte, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde küçük gruplar halinde görülebilmektedir.



Balık Kartalı

Western Osprey
Pandion haliaetus

Kanat Açıklığı
127-174 cm

Boy
50-65 cm

Ağırlık
1200-2050 gr

Özellikleri

Suya tamamen dalabilen tek yırtıcı kuştur. Uzun ve ince kanatları vardır; uçarken bir martıyı andırır. Alttan bakıldığında gövdesi ve kanat örtüleri beyaz, el bileği lekesi ve kanat uçları koyudur. Tepesi, ensesi, sırtı ve kanatlarının üst tarafı koyudur. Siyah sürmesi dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Göller, lagünler, eski ormanlık alan yakınlarındaki nehir ve denizler türün gözlemlendiği alanlardandır.

Beslenme

Temel besini balıktır. Yılan ve kurbağa avladığı da gözlemlenmiştir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde az sayıda görülmektedir. Toygartepe ve Riva Deresi'nde kayıtları vardır.



Kızıl Akbaba

Griffon Vulture
Gyps fulvus

Kanat Açıklığı
240-280 cm

Boy
95-110 cm

Ağırlık
8000-11000 gr

Özellikleri

Uzun boyunlu, uzun ve geniş kanatlı, büyük boylu bir akbabadır. Başı ve boynu beyaz hav tüylerle kaplıdır. Gövdesi ve kanat örtü tüyleri kızıl, kanat ve kuyruk telekleri siyahtır. Erişkinin gagası sarı olup gencininki gridir.

Yaşam Alanları

Kayalık ve dağlık araziler ile ağaçsız açık arazilerde yaşar.

Beslenme

Leşçil bir türdür.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde az sayıda Toygartepe'de görmek mümkündür.



Küçük Akbaba

Egyptian Vulture
Neophron percnopterus

Kanat Açıklığı
146-175 cm

Boy
55-70 cm

Ağırlık
1600-2200 gr

Özellikleri

Ülkemizde görülen en küçük akbabadır. Erişkinlerin gövde ve kanat örtüleri beyaz, kanat telekleri ise siyahtır. Kuyruğu uzun ve beyazdır. Sarı yüz derisi ve gagası dikkat çeker. Sarı gagasının ince ucu siyahtır. Boynu ve başındaki beyaz tüyler kabarık durur. Erişkin halini alması beş yıl sürer. Gençleri oldukça koyudur, renkleri gitgide açılır.

Yaşam Alanları

Açık arazilerde yaşayan bu tür kayalık yamaçlara yuva yapar. Sık sık çöplüklerde beslenirken de görülür.

Beslenme

Leşler, mezbaha atıkları ve kuş yumurtaları ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç döneminde Toygartepe gibi göç gözlemine uygun noktalardan az sayıda görülmektedir.



Yılan Kartalı

Short-toed Snake Eagle
Circaetus gallicus

Kanat Açıklığı
165-188 cm

Boy
64-73 cm

Ağırlık
1200-2300 gr

Özellikleri

Genel olarak açık renkli bir kartal türüdür. Kanat altında değişken oranlarda enine, koyu renkli çizgiler bulunur. İri ve yuvarlak başında sarı gözleri dikkat çeker; konmuş haldeyken bir baykuşu andırır. Avlanırken bir kerkenez gibi havada asılı kalır.

Yaşam Alanları

Seyrek ağaçlık alanlar, tarlalar ve ağaçsız açık alanlarda görülen bu tür; yuvasını ağaçlara yapar.

Beslenme

Adından da anlaşılacağı gibi ana besini yılanlardır. Ancak tek besin kaynağı yılanlar değildir; kertenkeleler, küçük kemirgenler, kuşlar ve kurbağalar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz ve çevresinde göç dönemlerinde ve yaz aylarında görmek mümkündür. Özellikle göç dönemlerinde daha kalabalık gruplar halinde gözlenir. Yaz aylarında yuva yapabileceği ve besleneceği, uygun habitatlarda üremesi muhtemeldir.



Küçük Kartal

Booted Eagle
Hieraaetus pennatus

Kanat Açıklığı
110-132 cm

Boy
45-55 cm

Ağırlık
700-1150 gr

Özellikleri

Şahin büyüklüğünde bir kartaldır. Özellikle uçarken seçilen omuz farları dikkat çeker. 3 farklı formu vardır; açık, kızıl ve koyu. Açık donunun kafası ve sırtı kahverengidir, alt tarafı ve kanat altı örtü tüyleri beyazdır. Kızıl ve koyu donları birbirine benzer. Kanat altında koyu renkli bir bant vardır.

Yaşam Alanları

Açık ağaçlık alanlar, kayalıklar ve tarım alanlarının çevresinde görülür.

Beslenme

Memeliler, kuşlar ve sürüngenler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde gözlem noktalarında ve nadiren yaz aylarında da ormanlık alanlarda görülmektedir.



Küçük Orman Kartalı

Lesser Spotted Eagle
Clanga pomarina

Kanat Açıklığı
135-170 cm

Boy
55-65 cm

Ağırlık
1000-1400 gr

Özellikleri

Orta boylu, koyu renkli, geniş kanatlı bir kartaldır. Büyük orman kartalına benzer. Ondan biraz daha küçüktür; ince kanatlı ve daha uzun kuyrukludur. Ayrıca 7.el teleği büyük orman kartalına kıyasla daha kısadır ve el bileği çevresinde iki açık leke göze çarpar. Gençlerinde kanat üstünde ve kanat altında beyaz benekler ve çizgilenmeler bulunur.

Yaşam Alanları

Açık çayır ve sulak alanlara yakın ormanlık alanlarda ürer. Ağaçlara yuva yapar. Göç dönemlerinde yerleşimlerden uzak ormanlar, çayırlar ve fundalıklarda beslenmek için bulunur.

Beslenme

Memeliler, sürüngenler, amfibiler ve kuşlar türün besin menüsünde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç döneminde boğazlardan yüksek sayılarda göç ederler. Toygartepe, Anadolu Kavağı ve Riva gibi gözlem noktalarından izlenebilmektedir.



Büyük Orman Kartalı

Greater Spotted Eagle
Clanga clanga

Kanat Açıklığı
153-180 cm

Boy
59-71 cm

Ağırlık
1500-2500 gr

Özellikleri

Geniş kanatlı, kısa kuyruklu, oldukça koyu renkli (*Clanga clanga fulvescens* alt türü hariç), büyük bir kartaldır. Uçarken 7. parmağı belirgin şekilde seçilir. El bileğinde açık renkli bir leke vardır.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki ormanlarda ürer. Göç döneminde farklı habitatlarda görülebilir.

Beslenme

Küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, amfibiler ve leşler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçünde ayrıca az sayıda kış aylarında gözlemlenmektedir.



Şah Kartal

Eastern Imperial Eagle
Aquila heliaca

Kanat Açıklığı
180-215 cm

Boy
75-84 cm

Ağırlık
2400-4530 gr

Özellikleri

Uzun kanatlı, uzun kuyruklu, iri bir kartaldır. Erişkini sık sık kaya kartalı ile karıştırılır. Ondan daha koyu renklidir. Omzunda dikkat çekici beyaz lekeler bulunur. Başı ve ensesi daha açık tonlarda olup parlak sarı-kahverengidir. Genç bireylerini tanımak oldukça kolaydır; kanat örtüleri, boynu, sırtı, göğsü ve karnı kum rengi üzerine koyu çizgilidir. El bileklerinde açık renk bir panel göze çarpar. Kanat ve kuyruk telekleri koyudur.

Yaşam Alanları

Tarım alanlarının çevresindeki veya içindeki ağaçlık alanlarda, etrafında açık alan bulunan ibreli ormanlarda bulunur. Kışın büyük sulak alanların çevresinde görülebilir. Yuvasını ağaçlara veya yüksek direklere yapar.

Beslenme

Küçük ve orta boy memeliler, kuşlar ve sürüngenler ile beslenir. Leş ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde gözlem noktalarından görülebilmektedir.



Bozkır Kartalı

Steppe Eagle
Aquila nipalensis

Kanat Açıklığı
160-200 cm

Boy
62-81 cm

Ağırlık
2400-3800 gr

Özellikleri

Kahverengi renkli, büyük, iri yapılı ve uzun kanatlı bir kartaldır. Kanatları diğer orman kartallarına göre daha kavislidir. Beyaz kanat bandı ile genç bireyleri rahatlıkla tanınır. Erişkini gencine göre daha koyudur. Siyah firar hattı, koyu karpal lekesi, uzun ve kavisli kanatları ile bölgedeki diğer kartallardan ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Bozkırlar, stepler, yarı çöller gibi ağaçsız geniş açık arazilerde yaşar.

Beslenme

Memeliler, büyük kuşlar ve leşler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda göç dönemlerinde görülmektedir.



Şahin

Common Buzzard
Buteo buteo

Kanat Açıklığı
110-132 cm

Boy
46-58 cm

Ağırlık
625-1364 gr

Özellikleri

Geniş kanatlı, tıknaz, orta boylu ve birçok farklı rengi olan bir yırtıcıdır. Başı genelde koyu renktedir. Kuyruğu ince çizgilidir. Çoğunlukla göğsünde açık renkte bir kolye bulunur. Kanatlarına alttan bakıldığında açık renkli el telekleri, koyu renkteki el bileği lekesi ve koyu renkli kanat uçlarıyla kontrast oluşturur.

Yaşam Alanları

Ormanlar, açık ağaçlık alanlar ile etrafı ağaçlık sulak alanlarda görülür.

Beslenme

Küçük veya orta boyuttaki memeliler, kuşlar, sürüngenler ve kurbağalar ile beslenir. Leş ile beslendiği de görülür.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen şahinler, göç dönemlerinde büyük sürüler halinde Beykoz üzerinden göç ederlerken gözlem noktalarından izlenebilirler. Kış aylarında da sayıları ormanlık ve açıklık alanlarda avlanan bireyler ile artış gösterir.



Kızıl Şahin

Long-legged Buzzard
Buteo rufinus

Kanat Açıklığı
126-155 cm

Boy
50-65 cm

Ağırlık
900-1800 gr

Özellikleri

Şahinden biraz daha büyüktür, kanatları, kuyruğu ve tarsusu daha uzundur. Yerdeyken uzun sarı bacakları, şahinden daha büyük, ucu sarı gagası, başı ve göğsüne göre daha koyu olan karnı ile fark edilir. Renklenmesi şahinde olduğu gibi farklılık gösterir.

Yaşam Alanları

Hafif kurak bozkırlar ve kayalık alanlar, tarlaların çevresinde ve çeşitli açık arazilerde bulunur.

Beslenme

Memeliler, kuşlar, sürüngenler ve nadiren de leş ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Genellikle yerli bir tür olan kızıl şahin, daha çok göç dönemlerinde geçiş yaparken gözlemlenmektedir. Seyrek olarak da Riva çayırlarında yıl boyunca görülebilmektedir.



Paçalı Şahin

Rough-legged Buzzard
Buteo lagopus

Kanat Açıklığı
120-150 cm

Boy
50-60 cm

Ağırlık
700-1650 gr

Özellikleri

Şahine oldukça benzer. Özellikle açık don şahinler ile sık sık karıştırılır. Ondan; ismini de aldığı paçalarının bacaklarını tamamen kaplaması, siyah kalın kuyruk bandı (kalınlığı ve sayısı yaşa ve cinsiyete göre değişir), başı ve göğsüyle kontrast oluşturan oldukça koyu karnı ve geniş olan el bileği lekesi ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Açık arazilerde ve sulak alanların çevresinde görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir bölümünü küçük memeliler oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve kış aylarında az sayıda gözlemlenebilmektedir.



Arı Şahini

European Honey Buzzard
Pernis apivorus

Kanat Açıklığı
118-150 cm

Boy
52-60 cm

Ağırlık
360-1050 gr

Özellikleri

Şahine göre biraz daha iridir, dar ve uzun kanatlara sahiptir. Sakin bir uçuşu vardır. Küçük kafası ve uzunca boynu güvercini andırır. Rengi çok değişkendir. Kanat altı ve alt tarafı şahine göre daha çizgilidir. Erişkinin parlak sarı gözleri dikkat çeker. Gencinin gözü koyudur.

Yaşam Alanları

Ağaçlık alanlar, orman açıklıkları, ibreli ormanlar görüldüğü alanlardandır.

Beslenme

Temel besini arı ve arı larvaları olsa da çekirgeler, küçük sürüngenler ve solucanlar ile beslendiği gözlemlenmiştir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve yaz döneminde uygun habitatlarda görülmektedirler. İlkbaharda geç gelip sonbaharda erken dönerler.



Saz Delicesi

Western Marsh Harrier
Circus aeruginosus

Kanat Açıklığı
110-135 cm

Boy
48-56 cm

Ağırlık
400-800 gr

Özellikleri

Uzun ve ince kanatlı, uzun kuyruklu, orta boylu yırtıcılar olan delicelerin en büyüğüdür. Diğer delicelere göre daha geniş ve yuvarlak kanatlıdır. Süzülürken kanat uçlarını yukarı kaldırır ve beş parmağı belirgin bir şekilde görülür. Yerdeyken açık renkli başı ve uzun sarı bacakları dikkat çeker. Cinsiyete ve yaşa göre renklenmesi değişir.

Yaşam Alanları

Çevresinde sazlar bulunan sulak alanlarda görülür.

Beslenme

Küçük kuşlar, küçük memeliler, kurbağalar ve balıklar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Riva Deresi sazlıkları civarında yıl boyunca görülebilen yerli bir türdür. Göç dönemlerinde Toygartepe gibi gözlem noktalarında da gözlemlenebilir.



Gökçe Delice

Hen Harrier
Circus cyaneus

Kanat Açıklığı
100-120 cm

Boy
44-52 cm

Ağırlık
350-650 gr

Özellikleri

Beş parmaklı bir delicedir. Erkeğinin başı, kuyruk üstü, kanat üstü örtüleri, sırtı ve göğsü gridir. Karnı, kuyruk sokumu ve kanat altı örtüleri beyaz, el telekleri siyahtır. Uçarken seçilen kalın, siyah firar hattı dikkat çeker. Dişisi ve genci birbirine benzer; kuyruk üstü enine, alt tarafı boyuna kalın çizgilidir.

Yaşam Alanları

Tarım arazileri, fundalıklar ve çayırlıklarda görülür.

Beslenme

Küçük memeliler ve küçük kuşlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve kış aylarında uygun tabiat alanlarında gözlenebilmektedir.



Çayır Delicesi

Montagu's Harrier
Circus pygargus

Kanat Açıklığı
97-120 cm

Boy
43-50 cm

Ağırlık
225-450 gr

Özellikleri

İnce, uzun ve sivri kanatlı, dar ve uzun kuyruklu, dört parmaklı bir delicedir. Erişkin erkeğinin siyah primer uçları dışında kanat üstü, sırtı, başı ve göğsü gri; kanat altı örtüleri daha açık renktedir. Siyah kanat bandı karakteristiktir. Dişisi gökçe delicenin dişisine benzer; boyun halkasının olmaması, dört parmaklı olması, beyaz kuyruk sokumunun daha dar olması ile ayırt edilebilir. Genci daha kızıl kahve renklidir, bozkır delicesinin gencine benzer; koyu ve kontrast oluşturan kanat uçları, boyun halkasının bulunmaması ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, çorak araziler ve çayırlıklarda görülür.

Beslenme

Küçük kuşlar, küçük memeliler, böcekler ve kertenkeleler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde az sayıda Riva çayırlarında ve Toygartepe'de rastlanmaktadır.



Bozkır Delicesi

Pallid Harrier
Circus macrourus

Kanat Açıklığı
95-120 cm

Boy
46-51 cm

Ağırlık
200-550 gr

Özellikleri

Bütün formlarında çayır delicesine oldukça benzer. Ondan daha kısa kanatlıdır. Kanatlarında çayır delicesinde olduğu gibi siyah bir şerit bulunmaz. Erişkin erkeğinin alt tarafı beyaz üst tarafı açık gridir. Kanat uçlarındaki siyahlık çayır delicesine kıyasla daha küçüktür. Dişisinin ve gencinin boynunda belirgin bir beyaz kolye vardır.

Yaşam Alanları

Bozkırlar, çayırlar, fundalıklar ve açık arazilerde görülür.

Beslenme

Küçük memeliler, kuşlar ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde az sayıda, sonbahar göç döneminde ise daha seyrek olarak Riva ve Toygartepe'den kayıtları vardır.



Kara Çaylak

Black Kite
Milvus migrans

Kanat Açıklığı
135-155 cm

Boy
55-60 cm

Ağırlık
600-950 gr

Özellikleri

Uzun kanatları ve çatallı kuyruğu ile diğer yırtıcılardan rahatlıkla ayırt edilir. Gövdesi, koyu kahverengidir. Büyük kanat örtüleri kanat üstünde açık bir hat oluşturur. Tarsusları ve gaga dibi sarıdır.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde, çöplüklerde ve küçük yerleşim yerlerinin yakınlarında görülür.

Beslenme

Kuşlar, küçük memeliler, sürüngenler ve leşler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kara çaylak çoğunlukla göç dönemlerinde olmak üzere, yıl boyunca Beykoz'da görülebilmektedir.



Yaz Atmacası

Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes

Kanat Açıklığı
64-80 cm

Boy
33-38 cm

Ağırlık
135-275 gr

Özellikleri

Boyutu ve genel görünümü ile atmacaya oldukça benzer. Ondan daha ince ve sivri kanatlı, daha kısa kuyrukludur. Ayrıca gözleri her yaşta ve cinsiyette koyudur. Erkeği genel olarak mavimsi-gridir. Koyu kanat uçları, açık renk kanatlarıyla kontrast oluşturur. Dişisinin üst tarafı kurşunu gri renkte olup, koyu boğaz çizgisi bulunur. Gencinin üst tarafı kahverengi olup, alt tarafı beyaz üzerine koyu beneklidir.

Yaşam Alanları

Nispeten seyrek ormanlar, dere kenarlarındaki ağaçlık alanlar, kavaklıklar ve tarım arazileri çevresinde üremektedir.

Beslenme

Besinlerinin önemli bir bölümünü kertenkele ve küçük kuşlar oluştursa da, küçük kemirgenleri ve böcekleri de diyetine dahil eder.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçünde Toygartepe ve Riva gibi alanlarda görülebilmektedir. Özellikle sonbahar göçünde daha büyük sürüler halinde görmek mümkündür.



Atmaca

Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus

Kanat Açıklığı
60-75 cm

Boy
28-42 cm

Ağırlık
185-350 gr

Özellikleri

Kısa ve yuvarlak kanatlı, uzun ince kuyruklu, küçük bir yırtıcıdır. Gözleri ve uzun bacakları sarıdır. Erkeğin üst tarafı mavimsi-gri, dişilerin ise kurşuni gri tonlardadır. Dişisi erkeğinden oldukça büyüktür. Alt taraflarında enine çizgiler vardır. Erkeğin çizgileri kızıla çalmaktadır. Gençlerin üst tarafı kahverengi, alt tarafı daha belirgin çizgilidir.

Yaşam Alanları

Karışık ormanlar, korular, köyler, park ve bahçeler, şehir içleri, tarım alanları türün gözlemlendiği alanlardandır.

Beslenme

Uzman bir kuş avcısıdır. Küçük ötücü kuşlardan saksağanlara kadar olan birçok kuş türü ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup tüm yıl boyunca Beykoz'da görülmektedir. Göç dönemlerinde sayıları artmaktadır.



Çakırkuşu

Northern Goshawk
Accipiter gentilis

Kanat Açıklığı
93-127 cm

Boy
49-64 cm

Ağırlık
500-1450 gr

Özellikleri

Büyük bir atmacaya benzer. Erkeklerin üst tarafı mavimsi gri, alt tarafı beyaz üzerine koyu çizgilidir. Koyu tepesi ve kulak örtüleri, uzun beyaz kaşıyla ve sarı gözüyle kontrast oluşturur. Dişisi erkeğinden bariz olarak büyüktür; hemen hemen bir şahin büyüklüğündedir. Üstü kurşunu gridir. Alt tarafı erkeğe göre daha belirgin ve yoğun çizgilidir. Genci kahverengidir; alt tarafındaki kalp veya damla şeklindeki benekler ile rahatlıkla tanınır.

Yaşam Alanları

Yaşlı ibreli ormanlarda ürer. Kışın daha açık ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Küçük ve orta boylu kuşlar ile tavşan ve sincap gibi memelilerle beslenir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca ormanlık alanlarda az sayıda görülebilen yerli bir türdür. Toygartepe'de göç döneminde görmek mümkündür.



Kulaklı Orman Baykuşu

Long-eared Owl
Asio otus

Kanat Açıklığı
90-100 cm

Boy
35-40 cm

Ağırlık
220-435 gr

Özellikleri

İsmini uzun kulak tüylerinden alır. Koyu, kızıl yüzünde sarı gözleri dikkat çeker. İki gözünün arasında beyaz bir hat bulunur. Alt tarafı yoğun, koyu çizgilidir.

Yaşam Alanları

Seyrek ibreli ormanlar, mezarlıklar, tarım alanlarının ve kırsal yerleşimlerin çevresi, orman sınırlarında görülür.

Beslenme

Türün ana besin kaynağı tarla faresidir. Bunun dışında diğer küçük memeliler, sincaplar, yarasalar ve küçük kuşlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca görülme ihtimali vardır, ancak bugüne kadar kayıtları yaz döneminden Riva'dadır.



İshakkuşu

Eurasian Scops Owl
Otus scops

Kanat Açıklığı
53-64 cm

Boy
16-20 cm

Ağırlık
60-95 gr

Özellikleri

Bölgedeki en küçük, kulaklı baykuştur. Çizgili koyu giysisi ile çok iyi kamufle olur. Gece aktif olan bu türü gündüz konakladığı ağaçlarda görmek oldukça zordur. Gece çoğu zaman sadece sesi duyulur. Sesi insan ıslığına benzer.

Yaşam Alanları

Seyrek ağaçlık alanlar, parklar ve korularda görülür.

Beslenme

Böcekler, küçük memeliler, küçük kuşlar ve kertenkeleler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ile sonbahar göçünde ve yaz döneminde görülürler. Beykoz'da açık alan kenarındaki ağaçlık alanlarda üremektedir.



Alaca Baykuş

Tawny Owl
Strix aluco

Kanat Açıklığı
94-104 cm

Boy
37-39 cm

Ağırlık
420-590 gr

Özellikleri

Akşam karanlığında veya geceleri aktif olan yırtıcı bir kuştur. Gündüzleri ağaç dallarında veya ağaç kovuklarında dinlenir. Orta boylu bir baykuştur. Rengi büyük varyasyon gösterir. Genel olarak gri veya kızıl kahverengidir. Başı büyük ve yuvarlak, kanatları uzun, siyah gözleri iridir. Yuvadan yeni ayrılmış genci oldukça çizgili bir görünüme sahiptir. "Huuu, hu-huhu, huuu" şeklindeki sesi çoğu kişi tarafından bilinen tipik baykuş ötüşüdür.

Yaşam Alanları

Yaprak döken ve karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, koruluk alanlar ve köyleri tercih etmektedir. Yuvasını ağaçlar üzerindeki yüksek kovuklara yapar.

Beslenme

Küçük memeliler, kurbağalar, böcekler, bazı küçük kuşlar diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Yerleşik bir kuş türü olup yıl boyu Beykoz'daki uygun habitata sahip tüm alanlarda görülebilmektedir.



Kukumav

Little Owl
Athene noctua

Kanat Açıklığı
54-58 cm

Boy
23-27 cm

Ağırlık
140-200 gr

Özellikleri

Alanda görülen baykuş türleri arasında en yaygınıdır. Genel olarak gri-kahverengi renklerde, yuvarlak suratlı ve küçük bir baykuştur. Üst tarafındaki beyaz benekler ve sarı gözleri dikkat çeker. Renklenmesi yaşadığı coğrafyaya göre varyasyon gösterebilir. Diğer pek çok baykuşun aksine gündüzleri çok aktiftirler.

Yaşam Alanları

Ağaçlık açık alanlar, kırsal yerleşimler ve tarım alanlarının çevresinde bulunur.

Beslenme

Böcekler, solucanlar, yılanlar, kertenkeleler, küçük memeliler ve küçük kuşlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kukumav yerleşik yaşayan bir türdür, Beykoz'da yılın her döneminde görülebilir.



İbibik

Eurasian Hoopoe
Upupa epops

Kanat Açıklığı
42-46 cm

Boy
25-32 cm

Ağırlık
55-80 gr

Özellikleri

Oldukça kısa bacakları, krem-pembe gövdesi ve ismini de aldığı ibiğiyle hiçbir türle karıştırılmaz. Uzun, siyah gagası aşağı kıvrıktır. Geniş ve yuvarlak kanatları siyah-beyaz desenlidir.

Yaşam Alanları

Seyrek ağaçlık alanlar, meyve bahçeleri, parklar, korular ve tarım alanlarının çevresinde bulunur.

Beslenme

Böcekler, solucanlar, örümcekler ve salyangozlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göçünde daha çok olmak üzere yaz ve sonbahar dönemlerinde Beykoz'un koruları, çayırları ve ağaçlık alanlarında görülmektedir.



Gökkuzgun

European Roller
Coracias garrulus

Kanat Açıklığı
52-60 cm

Boy
29-32 cm

Ağırlık
110-155 gr

Özellikleri

Turkuaz-mavi gövdesi ve parlak kızıl sırtı ile alanda görülen hiçbir tür ile karıştırılmaz. Yaklaşık küçük karga boyutlarındadır. Gagası siyahtır. Genci daha soluk renkli olup, boğazında çizgilenme görülür.

Yaşam Alanları

Kum ocakları, seyrek ağaçlı alanlar, çalılıklar ve açık arazilerde görülür.

Beslenme

Böcekler, örümcekler, kertenkeleler ve amfibiler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz döneminde açık ağaçlı alanlar ve fundalıklarda görülmektedir.



Yalıçapkını

Common Kingfisher
Alcedo atthis

Kanat Açıklığı
24-26 cm

Boy
17-19 cm

Ağırlık
30-45 gr

Özellikleri

Uzun gagalı, kısa bacaklı, kısa kuyruklu, oldukça renkli olan küçük bir kuştur. Başka hiçbir tür ile karıştırılmaz. Üst tarafı mavi ve yeşil olup alt tarafı canlı turuncudur. Alt gagasındaki kırmızılık dişilerde daha geniştir. Genellikle suya üzerindeki bir sazda oturarak veya havada asılı kalarak gözetlediği su canlılarını, hızlı bir dalış ile avlar.

Yaşam Alanları

Deniz kıyıları, dereler, göl ve göletler ile çevresinde sazlıkların bulunduğu sulak alanlarda yaşamaktadır.

Beslenme

Ana besin kaynağı küçük balıklardır. Küçük sucul böcekler ve kurbağa yavruları (iribaşlar) ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen yerli bir tür olan yalıçapkını, kenarında kumul duvarların olduğu akarsu kenarlarında üremesi muhtemeldir. Kış döneminde Boğaz'da ve deniz kıyılarında da görüldüğünden sayıları yükselir.



Arıkuşu

European Bee-eater
Merops apiaster

Kanat Açıklığı
44-49 cm

Boy
25-29 cm

Ağırlık
44-78 gr

Özellikleri

Alandaki en renkli kuşlardan biridir. Uzun koyu gagası hafifçe aşağı kıvrıktır. Kızıl kahverengi tepesi, siyah sürmesi, açık sarı boğazı ve mavimsi alt tarafı ile rahatlıkla tanınır. Erişkinin sırtı ve kanat üstü kızıl kahverengi, sırtının kenarı parlak sarıdır. Gençleri daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Kırsal yerleşim yerleri, açık ağaçlık alanlar, fundalıklarda görülür. Kumlu ve killi topraklarda tüneller açarak yuva yapar.

Beslenme

Adından da anlaşılacağı üzere uzman bir arı avcısıdır. Ancak her türlü uçan böcek ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde geçiş yaparken ve yaz aylarında Riva çayırlarında görülebilmektedir.



Boyunçeviren

Eurasian Wryneck
Jynx torquilla

Kanat Açıklığı
25-27 cm

Boy
16-17 cm

Ağırlık
30-45 gr

Özellikleri

Genellikle ötücü sanılan bu tür, ağaçkakan ailesi içerisinde yer alır. Kısa sivri gagası, kahverengi sürmesi ve kanatları, sarımsı boğazı, beyaz alt tarafı, gri başı ve sırtı ile başka hiçbir türle karıştırılmaz.

Yaşam Alanları


Ormanlar ve orman açıklıklarında üremektedir. Göç sırasında ormanlar, çalılıklar, makilikler, dağların yüksek kesimleri, yarı kurak araziler, korular ve parklarda görülebilir.

Beslenme

Genellikle zeminde beslenir. Sık sık yerde karıncalar ile beslenirken görülür. Karıncalar diyetinin önemli bir kısmını oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde göç ettiği sırada, ormanlar, tüm korular, büyük parklar ve bahçelerde görülebilir.



Alaca Ağaçkakan

Syrian Woodpecker
Dendrocopos syriacus

Kanat Açıklığı
34-40 cm

Boy
22-25 cm

Ağırlık
55-82 gr

Özellikleri

Siyah-beyaz renklerde olan orta boylu bir ağaçkakandır. Orman alaca ağaçkakanı ile sıklıkla karıştırılır. Boyun kenarından ve gaga dibinden gelen çapraz siyah hat ensesi ile birleşmez. Bu özelliği ile ondan rahatlıkla ayırt edilir. Siyah olan üst tarafında geniş beyaz omuz lekesi dikkat çeker. Kuyruk altı örtüleri ve kıçı açık kırmızıdır. Alt tarafı beyazımsıdır. Kuyruğu siyah olup dış kuyruk teleklerinde bir iki tane küçük beyaz leke olabilir.

Yaşam Alanları

Korular, parklar, bahçeler, köyler ve yoğun olmayan ağaçlık alanları tercih etmektedir.

Beslenme

Böcekler, diğer küçük omurgasızlar, kabuklu yemişler, tohumlar ve yabani meyveler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'daki koruluk alanlar, köyler ve parklarda görülebilmektedir.



Orman Alaca Ağaçkakanı

Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos major

Kanat Açıklığı
34-44 cm

Boy
23-26 cm

Ağırlık
70-98 gr

Özellikleri

Genel özellikleri ile alaca ağaçkakana oldukça benzer. Kuyruk altı ve kıçı alaca ağaçkakandan daha koyu olup kıpkırmızıdır. Ayrıca boyun kenarından ve gaga dibinden gelen çapraz siyah hat ensesi ile birleşir. Erişkinin tepesi siyah, gencinin kırmızıdır. Erkeğin ensesi kırmızı, dişinin siyahtır. Coğrafik varyasyonlar nedeniyle boyutu, gaga uzunluğu, kuyruk kenarı çizgilenmesi, kuyruk altı koyuluğu ve alt taraf renklenmesi değişiklik gösterebilir.

Yaşam Alanları

Seyrek yaprak döken ormanlar, korular ve parklar, orman sınırları ile meyve bahçelerinde bulunur. Ağaçlardaki oyuklara yuva yapar.

Beslenme

Diyeti oldukça geniştir. Başlıca ağaç kabuğunun altındaki böcekler ile beslenen bu tür kozalaklı ağaçların tohumları, kurtlar, kuş yumurtaları ve yavruları, küçük kemirgenler, kertenkeleler ve küçük etli meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir ağaçkakan türü olup yıl boyu ağaçlık alanlarda, özellikle daha kapalı ormanlarda görülebilmektedir.



Küçük Ağaçkakan

Lesser Spotted Woodpecker
Drybates minör

Kanat Açıklığı
24-27 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
18-22 gr

Özellikleri

Siyah beyaz renklerde, hemen hemen bir serçe boyutunda olan, ülkemizdeki en küçük ağaçkakandır. Kanadında beyaz oval bir leke bulunmaz; enine beyaz çizgilidir. Kısa gagası incedir. Erkeğinin tepesi kırmızı, dişinin ise siyahtır.

Yaşam Alanları


Yaprak döken veya karışık ormanlar, korular ve parklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir. Özellikle kışın bitkisel gıdaları da tüketir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un koruluk ve ormanlık alanlarında görülebilmektedir.



Ortanca Ağaçkakan

Middle Spotted Woodpecker
Dendrocoptes medius

Kanat Açıklığı
33-34 cm

Boy
20-22 cm

Ağırlık
50-80 gr

Özellikleri

Siyah beyaz renklerde orta boylu bir ağaçkakandır. Boyutu küçük ağaçkakan ile alaca ağaçkakan arasındadır. Türkçe ismini de buradan alır. Beyaz kanat lekesi bölgedeki diğer alaca renkli ağaçkakanlardan nispeten biraz daha büyüktür. Gagası çok küçük değildir. Kırmızı tepesi dikkat çeker. Siyah bıyık çizgisi gagasına ulaşmaz ve ense ile birleşmez. Karın kenarındaki siyah çizgilenme dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Yaprak döken veya karışık ormanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları en önemli besin kaynağını oluşturur. Ayrıca sert kabuklu yemişler, küçük ve yumuşak meyveleri de diyetine dahil eder.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir ağaçkakan türü olup, yıl boyu özellikle yaşlı ağaçların bulunduğu ağaçlık alanlarda görülebilmektedir.



Küçük Yeşil Ağaçkakan

Grey-headed Woodpecker
Picus canus

Kanat Açıklığı
38-40 cm

Boy
25-33 cm

Ağırlık
125-165 gr

Özellikleri

Gri ve yeşil renklerde, irice bir ağaçkakandır. Boyutu, genel şekli ve renklenmesi ile yeşil ağaçkakana çok benzer ve sık sık bu tür ile karıştırılır. Başı ve alt tarafı gridir; ince siyah bıyık çizgisi bulunur. Erkeğin alnı kırmızı dişinin siyahtır. Yeşil ağaçkakandan siyah yüz maskesinin olmaması ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Nemli yaprak döken ormanlar, nehir kenarındaki ağaçlar, korular ve parklarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları besinlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Ayrıca meyveleri de diyetine dahil eder.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup yıl boyu Beykoz Korusu'nda görülebilmektedir. Polonezköy ve Riva'da da kayıtları vardır.



Yeşil Ağaçkakan

European Green Woodpecker
Picus viridis

Kanat Açıklığı
40-42 cm

Boy
31-33 cm

Ağırlık
180-220 gr

Özellikleri

Sırtı yemyeşil olan büyükçe bir ağaçkakandır. Yüzündeki kalın siyah maskesi göze çarpar. Alt tarafı sarımsı yeşil, tepesi kırmızıdır. Erkeğinin siyah bıyığının iç kısmı kırmızı olup dişisinde kırmızılık bulunmamaktadır. Uçarken koyu el teleklerinin üzerindeki beyaz benekler ve parlak yeşil-sarı kuyruk sokumu dikkat çeker. Uzak mesafeden çığlığı ve kahkahayı andıran sesi ile yerini belli eder.

Yaşam Alanları

Korular, parklar, bahçeler, kavaklıklar ve seyrek ormanlık alanlarda görülür.

Beslenme

Ağaç kabuğunun altındaki böcekler ve kurtlar ile beslenir. Ayrıca kiraz, üzüm, elma gibi meyveleri de diyetine dahil eder. Yerde diğer ağaçkakanlara göre daha fazla vakit geçirir. Yere dökülen yaprakları gagasıyla eşeleyerek, altındaki karıncalar ve diğer böcekleri çıkararak beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen yerli türlerdendir. Beykoz Korusu, Kaymakdonduran Mesire Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkı, Poyrazköy ve Riva gibi pek çok alanda görülebilir.



Küçük Kerkenez

Lesser Kestrel
Falco naumanni

Kanat Açıklığı
58-73 cm

Boy
25-32 cm

Ağırlık
90-195 gr

Özellikleri

Renklenmesi ve görünümü ile kerkeneze oldukça benzer. Ondan biraz daha küçük, kısa kuyruklu ve kısa kanatlıdır. Erişkin erkeğinin sırtı ile küçük ve ortanca örtü tüyleri kızıl, başı ve büyük örtü tüyleri mavimsi-gridir. Krem rengi alt tarafı ve beyaz kanat altındaki benekler kerkeneze kıyasla daha azdır. Ayrıca küçük kerkenezin tırnakları açık renkte olup, kerkenezin tırnakları koyu renktedir.

Yaşam Alanları

Deniz kıyılarındaki kayalıklara veya kırsal alanlardaki evlerin çatısına yuva yapar. Açık arazilerde görülür.

Beslenme

Böcekler, küçük kuşlar, kertenkeleler ve küçük kemirgenler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde Riva'da seyrek olarak görülebilmektedir.



Kerkenez

Common Kestrel
Falco tinnunculus

Kanat Açıklığı
62-80 cm

Boy
33-39 cm

Ağırlık
130-260 gr

Özellikleri

Uzun sivri kanatlı, uzun ve yuvarlak kuyruklu, küçük bir yırtıcıdır. Erkeğinin başı mavi, bıyık çizgisi siyah, kuyruk üstü mavimsidir. Dişinin kuyruk üstü enine çizgili, başı kahverengidir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, kırsal yerleşimler, ağaçlı açık arazilerde görülür.

Beslenme

Küçük memeliler, küçük kuşlar ve kertenkeleler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da uygun habitata sahip alanlarda, yıl boyu yaygın bir şekilde görülmektedir.



Aladoğan

Red-footed Falcon
Falco vespertinus

Kanat Açıklığı
65-77 cm

Boy
25-32 cm

Ağırlık
28-34 gr

Özellikleri

Delice doğana göre daha kısa kanatlı ve ince görünümlüdür. Erkeklerin kuyruk altı örtüleri ve paçaları kırmızı geri kalan kısmı kurşuni gridir. Gaga, göz derisi ve bacaklar erkeklerde kırmızı, dişilerde ise turuncu renklidir. Dişilerin başı ve alt tarafları turuncu tonludur. Gençlerde ise baş ve alt tüyler kahverengidir. Genç bireyler sıklıkla delice doğan ile karıştırılır. Ondan koyu yüz maskesi, siyah firar hattı ve çizgili kuyruğu ile ayırt edilir. Küçük gruplar halinde göç ederler. Grup halinde ağaçlık ve koruluk alanlara yuva yapmaktadırlar.

Yaşam Alanları

Bozkır alanlar, açık orman alanları, tarım alanları türün gözlemlendiği alanlardandır.

Beslenme

Böcekler, kuşlar ve küçük memeliler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde görülür.



Ada Doğanı

Eleonora's Falcon
Falco eleonorae

Kanat Açıklığı
84-105 cm

Boy
36-42 cm

Ağırlık
340-460 gr

Özellikleri

Büyük, uzun kanatlı ve uzun kuyruklu bir doğandır. Kızıl donun alt tarafı kızıl üzerine koyu çizgili, el telekleri ve başı siyahtır. Koyu donu simsiyahtır. Her iki donun gençleri birbirine benzer; firar hattı siyah, alt tarafı kahverengi üzerine koyu çizgilidir. Gençleri delice doğanın gençlerini andırabilir. Ondan daha büyük boyutu ve daha uzun kanatlarıyla rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki dik kayalık adalar ve yamaçlarda ürer. Göç dönemlerinde pek çok habitatta görmek mümkündür; ormanlar, çayır ve meralar, bataklık alanlar türün gözlemlendiği alanlardandır.

Beslenme

Özellikle küçük ötücü kuşlar en önemli besinlerini oluşturur. Ayrıca yusufçuklar, çekirgeler, kertenkele ve küçük memeliler de beslendiği canlılar arasında yer alır.

Görüldüğü Dönem

Geçit kuşudur, göç dönemlerinde Riva çayırlarında ve Toygartepe'de görülebilir.



Bozdoğan

Merlin
Falco columbarius

Kanat Açıklığı
50-67 cm

Boy
25-33 cm

Ağırlık
150-300 gr

Özellikleri

Alanda görülen en küçük doğan türüdür. Erkeği yaklaşık ökse ardıcı boyutundadır. Dişisi erkeğinden daha büyüktür. Erkeğinin başı, üst tarafı ve kuyruğu mavimsi gri, kanat telekleri siyahtır. Kuyruk ucunda siyah bir bant bulunur. Dişisi ve gencinin üst tarafı kahverengi olup kuyruk üstü enine koyu çizgilidir. Her iki cinsiyetinde alt tarafı krem rengi üzerine koyu çizgilidir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde, tarım alanlarında ve çeşitli açık arazilerde görülür.

Beslenme

Diyetinin çoğunluğunu ötücü küçük kuşlar oluşturur. Daha az olmakla birlikte böcekler ve küçük omurgalılar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Bahar ve kış aylarında uygun alanlarda gözlenebilmektedir. Riva çayırlarından ve Toygartepe'den kayıtları vardır.



Delice Doğan

Eurasian Hobby
Falco subbuteo

Kanat Açıklığı
68-84 cm

Boy
29-36 cm

Ağırlık
140-240 gr

Özellikleri

Genel morfolojisi ile bir ebabili andırır. Erişkini koyu çizgili alt tarafı, kırmızı paçaları ve kuyruk altı, lacivert gri üst tarafı, kalın siyah bıyığı ve siyah başı ile kontrast oluşturan beyaz yanaklarıyla rahatça tanınır. Genci daha kahverengi olup, üst tarafındaki tüylerin kenarları kahverengidir. Kuyruk üstü çizgisizdir.

Yaşam Alanları

Çevresinde ağaçlık alan bulunan açık arazilerde görülür.

Beslenme

Böcekler ve küçük kuşlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçü ile yaz dönemlerinde yaygın olarak görülebilmektedir. Beykoz bölgesinde ormanlık ve koruluk alanlarda üremektedir.



Gökdoğan

Peregrine Falcon
Falco peregrinus

Kanat Açıklığı
90-110 cm

Boy
36-51 cm

Ağırlık
530-1300 gr

Özellikleri

İri, büyük, kısa kuyruklu, sivri ve geniş kanatlı bir doğandır. Erişkinin siyah bıyığı, beyaz yanakları ve boğazı dikkat çeker. Üst tarafı gridir; alt tarafı beyaz üzerine koyu çizgilidir. Genci daha koyudur; üst tarafı kahverengi, alt tarafı krem rengi üzerine koyu çizgilidir.

Yaşam Alanları

Eski taş ocakları, sulak alanların çevresi, deniz kıyıları, yarlar ve kentsel alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin çoğunluğunu orta ve küçük boyuttaki kuşlar oluşturur. Usta bir kuş avcısıdır.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda tüm yıl içerisinde uygun alanlarda görülmektedir. Kış aylarında kuzeyden gelen bireyler ile sayıları artar.



Yeşil Papağan

Rose-ringed Parakeet
Psittacula krameri

Kanat Açıklığı
42-48 cm

Boy
38-43 cm

Ağırlık
95-140 gr

Özellikleri

Anavatanı Güneydoğu Asya ve Afrika'dır. Türkiye'ye nasıl geldiğine dair birkaç rivayet vardır; bazı kaynaklar kafes kaçkını olduğunu söylese de bazı kaynaklar bir gemi veya tren kazası sonrası yayıldığını söylemektedir. Yeşil renkli vücudunda kırmızı gagası dikkat çeker. Kuyruğu oldukça uzundur. Erkek bireylerde siyah boyun halkası bulunur. Genci dişiye benzer; kuyruğu daha kısadır.

Yaşam Alanları

Korular, bahçeler ve parklar ile çevresinde ağaçlık alanlar bulunan yerleşim yerlerinde yaşarlar.

Beslenme

Yumuşak ve sert kabuklu meyveler ve meyve çekirdekleri ana besin kaynaklarıdır.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca, şehir merkezlerine yakın yeşil alanlarda görülmesi mümkün olan bir türdür. Özellikle meyveli ağaçların bulunduğu tüm korularda üremektedir.



İskender Papağanı

Alexandrine Parakeet
Psittacula eupatria

Kanat Açıklığı
45-52 cm

Boy
53-62 cm

Ağırlık
190-250 gr

Özellikleri

Türkiye'de bulunan iki papağan türünden biridir. Yeşil papağandan daha büyük ve iridir. Ondan daha iri gagası ve kırmızı omuz örtüleri ile rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Parklar, korular ve şehir içi ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu Beykoz Korusu, Beykoz Çayırı, Kaymakdonduran Mesire Alanı ve Hıdiv Kasrı gibi çınar ağaçları olan alanlarda görebilirsiniz.



Kızılsırtlı Örümcekkuşu

Red-backed Shrike
Lanius collurio

Kanat Açıklığı
24-27 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
23-40 gr

Özellikleri

Alanda en sık ve bol görülen örümcekkuşudur. Erişkin erkeğinin tepesi ve ensesi açık gri, sürmesi siyah, silik ve ince olan kaşı beyaz ve ismini de aldığı sırtı kızıldır. Yanakları ve boğazı beyaz, alt tarafı uçuk pembedir. Dişisinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı kirli beyaz üzerine koyu pulludur. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Çalılık açık araziler, makiler ve tarlaların çevresinde bulunur.

Beslenme

Böcekler, kertenkeleler, küçük memeliler ve küçük kuşlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Riva çayırlarında Nisan-Ekim arasında gözlemlenmektedir. Beykoz'da uygun yaşam alanına sahip diğer bölgelerde de görmek mümkündür.



Kızılbaşlı Örümcekkuşu

Woodchat Shrike
Lanius senator

Kanat Açıklığı
26-28 cm

Boy
17-19 cm

Ağırlık
33-45 gr

Özellikleri

Alnı ve kulak örtüleri siyah, ensesi ve tepesi kızıl kahverengi, alt tarafı beyaz, sırtı siyah veya siyahımsıdır. Beyaz primer kökü ve geniş, beyaz omuz lekesi dikkat çeker. Kuyruk sokumu beyazdır. Erkeği ve dişisi birbirine benzemekle birlikte dişisi daha soluk renklidir; göğüs ve böğür kenarında enine çizgiler görülür. Genci ve ilk kışında, kızılsırtlı örümcekkuşuna benzer. Ondan daha kalın gagası, açık primer kökü ve omuz örtüler ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Tarım alanlarının çevresinde, makiliklerde, seyrek ağaçlık alanlarda, meyve bahçelerinde görülür.

Beslenme

Böcekler, kertenkeleler, küçük kuşlar ve küçük memeliler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Nisan ve Mayıs aylarındaki göçleri sırasında Riva çayırlarında kayıtları mevcuttur.



Maskeli Örümcekkuşu

Masked Shrike
Lanius nubicus

Kanat Açıklığı
23- 27 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
23-28 gr

Özellikleri

Uzun, ince kuyruklu bir örümcekkuşudur. Erişkin erkeğinin tepesi, sürmesi, sırtı, kuyruk sokumu ve kanatlarının bir bölümü siyah, böğrü ile göğüs ve karın yanları turuncu, alnı, boynu, primer kökü, omuz tüyleri ile dış kuyruk telekleri beyazdır. Dişisi erkeğe benzer; ondan daha soluk ve kahverengi renklidir. Genci daha ince gagası, beyaz, geniş primer kökü ve yaz olmayan kuyruk sokumu ile kızılbaşlı örümcekkuşu gencinden ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Çalılık ve makilikler, meyve bahçeleri ile orman açıklıklarında görülür.

Beslenme

Temel besin kaynağı böceklerdir. Nadiren küçük kuşlar ve kertenkeleler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İstanbul'da en nadir görülen örümcekkuşlarından birisidir. İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde uygun yaşam alanına sahip ağaçlık alanlarda az sayıda görülebilmektedir.



Karaalınlı Örümcekkuşu

Lesser Grey Shrike
Lanius minor

Kanat Açıklığı
30-34 cm

Boy
19-23 cm

Ağırlık
22-47 gr

Özellikleri

Uzun kanatlı, kalın gagalı bir örümcekkuşudur. Beyaz kanat lekesi büyük örümcek kuşundan daha büyüktür. Erişkinin alnından gözünün arkasına kadar uzanan geniş ve siyah bir sürmesi vardır. Alt tarafı uçuk pembedir. Gencinin alnı gri, sürmesi siyah, alt tarafı beyazımsıdır. Pullu bir görünümü vardır; üst tarafındaki tüylerin ucu beyazdır.

Yaşam Alanları

Ağaçlıklar, çalılıklar, tarım arazilerinde, makiliklerde ve meyve bahçelerinde görülür.

Beslenme

Böcekler, kertenkeleler, küçük kemirgenler ve küçük kuşlarla beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında az sayıda Beykoz'daki uygun habitata sahip alanlarda görülmektedir.



Büyük Örümcekkuşu

Great Grey Shrike
Lanius excubitor

Kanat Açıklığı
30-34 cm

Boy
22-26 cm

Ağırlık
54-60 gr

Özellikleri

Alandaki en büyük örümcekkuşudur. Genel görünüşü karaalınlı örümcekkuşuna benzer. Ondan alnında siyahlığın olmaması, gagasının daha ince ve ucunun daha aşağı kıvrık olması, oldukça kısa primer projeksiyonu ve kanadındaki beyaz panelin karaalınlı örümcekkuşuna göre oldukça sınırlı olmasıyla ayrılır.

Yaşam Alanları

Kırsal alanlar ve seyrek ağaçlı açık arazilerde bulunur.

Beslenme

Küçük memeliler, küçük kuşlar, kertenkeleler ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda sonbahar sonlarında ve kış aylarında gözlemlenebilmektedir. Riva çayırlarından kayıtları vardır.



Sarıasma

Eurasian Golden Oriole
Oriolus oriolus

Kanat Açıklığı
44-47 cm

Boy
24-25 cm

Ağırlık
65-90 gr

Özellikleri

Genel olarak sarı-siyah renklerde, orta boylu bir ötücü kuştur. Kalın gagasının rengi yaşa ve cinsiyete göre değişir. Erişkin erkeğinin gövde rengi sapsarıdır. Siyah göz pınarı dikkat çeker. Dişi ve gencinin gövdesi sarı-yeşil olup alt tarafı boyuna koyu çizgilidir.

Yaşam Alanları

Yaprak döken ormanlar, meyve bahçeleri, kavaklıklar ile çeşitli ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve meyveler ile beslenir. Kiraz, dut, üzüm ve incir temel besin kaynağıdır.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde ve yaz aylarında uygun tabiat alanlarında görülebilmektedir.



Alakarga

Eurasian Jay
Garrulus glandarius

Kanat Açıklığı
54-58 cm

Boy
32-36 cm

Ağırlık
140-190 gr

Özellikleri

Beykoz'un yaygın, yerli ve en renkli kargasıdır. Ensesi, bıyıkları ve kuyruğu siyah, yanakları, alnı ve boğazı bej renginde, kuyruk sokumu beyazdır. Sırtı ve alt tarafı gri veya bej rengindedir. Beyaz kanat paneli ve mavi kanat lekeleri dikkat çeker. Alakargalar, meşe palamutlarını ağaçlardan toplayarak daha sonra yemek üzere toprağa gömerler. Zamanla unuttukları bazı palamutlar filizlenerek ağaca dönüşür ve böylece ormanların yetişmesinde katkı sunarlar.

Yaşam Alanları

Ormanlık alanlar, bahçeler, parklar, koruluk alanlar.

Beslenme

Omurgasızlar, böcekler ve böcek larvaları, kestane, meşe palamudu, bazı kuşların yumurtaları ve yavruları, kertenkeleler, küçük memeliler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca koruluk, bahçe, park ve ormanlık alanlarda görülebilir.



Saksağan

Eurasian Magpie
Pica pica

Kanat Açıklığı
52-61 cm

Boy
40-51 cm

Ağırlık
145-240 gr

Özellikleri

Alandaki en yaygın kuşlardan biridir. Özgün bir kuştur, başka bir tür ile karıştırılmaz. Şehir hayatına iyi uyum sağlamış olan bu kuş çoğu kişi tarafından tanınır. Genel olarak siyah beyaz renklerde, orta boylu ve uzun kuyruklu bir karga türüdür. Kanatları mor veya yeşil parlaklıklarla bezenmiş koyu siyah olup kanadının iç kısmı beyazdır.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, seyrek ağaçlı alanlar, çalılıklar, bozkırlar, parklar, bahçeler ve korularda görülür. Çöplüklerde de bolca rastlanır.

Beslenme

Diyeti oldukça geniştir; böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, küçük memeliler ve sürüngenler, küçük kuşlar, kuş yumurtaları, kuş yavruları, tohumlar, meyveler, leşler ve evsel atık yiyecekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Daha çok kırsal alanlarda tüm yıl boyunca görülebilen yerli bir kuştur.



Küçük Karga

Western Jackdaw
Coloeus monedula

Kanat Açıklığı
64-73 cm

Boy
35-40 cm

Ağırlık
220-270 gr

Özellikleri

Alandaki en küçük karga türüdür. Gövdesi siyah veya siyaha yakın gri renktedir. Ensesi ve kulak örtüleri gri, gözleri beyazdır.

Yaşam Alanları

Şehir içlerinde, kırsal alanlarda, park ve bahçelerde görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve diğer küçük omurgasızlar, kuş yavruları ve yumurtaları, tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un hemen hemen her yerinde görülebilen yerli bir türdür. Sonbaharda ve kış aylarında kalabalık sürüler oluşturur.



Ekin Kargası

Rook
Corvus frugilegus

Kanat Açıklığı
80-94 cm

Boy
44-46 cm

Ağırlık
380-520 gr

Özellikleri

Leş kargası boyutlarında, simsiyah bir karga türüdür. Gagası uzun ve kalındır. Erişkinlerde gaga dibi tüysüz, gençlerde tüylüdür. Gençleri küçük bir kuzgunu ya da Avrupa leş kargasını andırır.

Yaşam Alanları

Tarım alanları, meralar, ovalar gibi açık arazilerde görülür.

Beslenme

Kışın daha çok tohumlar ve bitkisel gıdalar ile yazın ve ilkbaharda ise böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslenir.

Görüldüğü Dönem

Sonbahar sonu ve kış döneminde Beykoz'un çayırlık ve koruluk alanlarında görülmektedir.



Leş Kargası

Hooded Crow
Corvus cornix

Kanat Açıklığı
80-100 cm

Boy
48-54 cm

Ağırlık
450-600 gr

Özellikleri

Alandaki en yaygın türlerden biridir. Şehir hayatına iyi uyum sağlamış bir tür olması nedeniyle çoğu kişi tarafından tanınır. Karga denildiğinde çoğu kişinin aklına gelen ilk kuş türüdür. Göğsünün üst kısmı, başı ile kanatları siyah; ensesi, sırtı ve alt tarafı gri renktedir. Oldukça iri bir gagası vardır.

Yaşam Alanları

Şehirler, ağaçlık açık araziler, tarım alanları, çeşitli bahçeler, korular ve parklar, orman kenarları, deniz kıyıları ve çöplüklerde görülür.

Beslenme

Hemen hemen bulabildiği her türlü besin ile beslenmektedir; solucandan sıçanlara, böceklerden meyvelere ve evsel atıklara kadar. Sık sık leş ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Tüm yıl boyunca Beykoz'daki her alanda görülebilmektedir.



Kuzgun

Northern Raven
Corvus corax

Kanat Açıklığı
110 -130 cm

Boy
55-70 cm

Ağırlık
680-1600 gr

Özellikleri

Alanda görülen karga türleri içerisinde en irisidir; şahin büyüklüğündedir. Bütün vücudu simsiyahtır. Oldukça kalın ve güçlü bir gagası vardır. Uçarken görüldüğünde kama şeklindeki uzun kuyruğuyla rahatlıkla tanınır.

Yaşam Alanları

Kayalık sahiller, yaylalar, ormanlar, fundalıklar ve her türlü açık arazide görülür.

Beslenme

Genel olarak leşler ile beslenir ancak oldukça fırsatçı bir türdür; diğer canlıların yavrularını veya hasta/halsiz hayvanları avlayabilirler. Ayrıca kuş yumurtaları da diyetine dahildir.

Görüldüğü Dönem

Yerli olanları yıl boyunca Beykoz'un kırsal, kayalık ve ormanlık alanlarında görülebilirken, göç dönemlerinde göç eden kuzgunlar da görülmektedir.



Mavi Baştankara

Eurasian Blue Tit
Cyanistes caeruleus

Kanat Açıklığı
12-18 cm

Boy
11-12 cm

Ağırlık
9-12 gr

Özellikleri

Alandaki mavi ve sarı renkli tek baştankaradır. Kuyruğu, tepesi ve kanatları parlak mavi, alnı ve yanakları beyaz, sırtı yeşil ve alt tarafı sapsarıdır. Bu özellikleri ile alanda görülen başka hiçbir tür ile karıştırılmaz.

Yaşam Alanları

Yaprak döken ormanlar, sazlık alanlar, ibreli ormanlar, korular, parklar, meyve bahçeleri gibi çeşitli ağaçlık alanlarda bulunur. Şehir içindeki ağaçlar ve yapılarda dahi üremektedir.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları, örümcekler, meyveler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da yıl boyunca koruluk, ormanlık ve bahçelik her alanda görülebilen en yaygın yerli ötücü kuşlardan birisidir.



Büyük Baştankara

Great Tit
Parus major

Kanat Açıklığı
23-26 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
14-21 gr

Özellikleri

En yaygın ve insan yerleşimine en yakın olan ötücü kuşlardan birisidir. Baştankaraların en irisidir. Siyah tepesi ve boğazı, bembeyaz yanakları ile kontrast oluşturur. Sırtı yeşil, kuyruğu mavi, alt tarafı parlak sarıdır. Boğazından karnına doğru siyah bir hat uzanır. Erkeği ve dişisi genel olarak birbirine benzer. Erkeğin karnındaki siyahlık daha belirgin ve geniştir.

Yaşam Alanları

Hemen hemen her türlü ağaçlık alanda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, küçük omurgasızlar, tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da yerleşim yerlerinden orman derinliklerine kadar her yerde yıl boyunca görülebilmektedir.



Çam Baştankarası

Coal Tit
Periparus ater

Kanat Açıklığı
16-20 cm

Boy
11-12 cm

Ağırlık
8-10 gr

Özellikleri

Küçük, tıknaz, hareketli bir kuştur. Beyaz ensesi, özgün beyaz yanakları ve çift kanat çizgisi ile rahatlıkla tanımlanır. Sırtı gri, alt tarafı beyazımsıdır.

Yaşam Alanları

İbreli ormanlar, korular ve parklarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup yıl boyunca Beykoz'un çamlık alanlarında görülebilir.



Kayın Baştankarası

Marsh Tit
Poecile palustris

Kanat Açıklığı
17-19 cm

Boy
11-13 cm

Ağırlık
9-12 gr

Özellikleri

Sade görünümlü, küçük bir baştankaradır. Tepesi ve gıdısı siyah, yanakları beyaz, sırtı ve kuyruğu kahverengi, alt tarafı beyazımsıdır.

Yaşam Alanları

Nemli, yaprak döken ormanlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, meyveler ve tohum ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da az sayıda kaydı olan bu tür, yıl boyunca görülebilen yerli türlerden birisidir.



Uzunkuyruklu Baştankara

Long-tailed Tit
Aegithalos caudatus

Kanat Açıklığı
17-19 cm

Boy
13-16 cm

Ağırlık
7-9 gr

Özellikleri

Ufak gövdeli, minik gagalı ve oldukça uzun kuyruklu, genel olarak siyah beyaz renklerde olan bir kuştur. Alnının ortasından ensesine kadar uzanan beyazımsı bir şerit bulunur. Başının iki yanı ise siyahtır. Kırmızı göz halkası dikkat çeker. Genellikle küçük gruplar halinde görülür.

Yaşam Alanları

Yaprak döken ve karışık ormanlar, çalılıklar, parklar ve büyük bahçelerde görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları ile örümcekler ana besin kaynağını oluşturur. Ayrıca bitki tohumları ve küçük meyveler ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen yerli bir türdür.



Orman Toygarı

Woodlark
Lullula arborea

Kanat Açıklığı
27-30 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
26-35 gr

Özellikleri

Küçük boylu ve genellikle yerde dolaşan bir ötücüdür; hareket etmediği zaman fark edilmesi zordur. Diğer toygarlardan açık krem renkteki kaşının ensesinde birleşmesi, kızıl kulak örtü tüyleri, kısa kuyruğu, ince gagası ve açık-koyu-açık desenli alulası ile rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Seyrek ağaçlı açık araziler, fundalıklar, meşelikler, orman kenarları ile kırsal yerleşimlerin çevresinde bulunur.

Beslenme

Tohumlar ve böcekler diyetinin önemli bir kısmını oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda tüm yıl boyunca görülebilen yerli bir türdür. Kayıtları genellikle Riva'dadır ve sayıları göç dönemlerinde artmaktadır.



Tarlakuşu

Eurasian Skylark
Alauda arvensis

Kanat Açıklığı
30-36 cm

Boy
18-19 cm

Ağırlık
35-50 gr

Özellikleri

Tepeli toygar ile beraber bölgede görülen en yaygın toygar türüdür. Başının üstü, boynu, ensesi ve sırtı açık kahverengidir. Göğsü açık kahverengi üzerine koyu çizgili, karnı beyazdır. Özellikle ibiğini kaldırdığı zaman tepeli toygar ile karıştırılır. Ondan ibiğinin daha kısa olması, gagasının daha kısa ve düz olmasıyla ayırt edilebilir.

Yaşam Alanları

Ağaçsız açık alanlarda, kırsal yerleşimlerin çevresinde, tarlalarda, çayırlarda ve kıyı kumullarında yaşar. Yuvalarını bulmak zordur; yuvasını yerdeki otların arasına yapar.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını yerde dolaşırken bulduğu tohumlar oluşturur. Ancak özellikle üreme döneminde diyetine böcekleri ve diğer küçük omurgasızları da dahil eder.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca görülebilen bir tür olup sayıları göç dönemlerinde ve kış aylarında artmaktadır. Kayıtları Riva civarında yoğunlaşmıştır.



Tepeli Toygar

Crested Lark
Galerida cristata

Kanat Açıklığı
29-34 cm

Boy
17-19 cm

Ağırlık
35-46 gr

Özellikleri

İri bir toygardır. Çoğu zaman kalkık ve sivri olan ibiği ile rahatlıkla tanınır. Genel renklenmesi ve görünümü ile tarlakuşuna benzer. Uzun gagası hafiften aşağı kıvrıktır.

Yaşam Alanları

Her türlü açık arazide görülebilir. Özellikle kış aylarında sık sık yol kenarlarında rastlanır.

Beslenme

Böcekler ve bitki tohumları ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup, yıl boyunca görülebilir. Kayıtları Riva çayırlarında yoğunlaşmıştır.



Bozkır Toygarı

Greater Short-toed Lark
Calandrella brachydactyla

Kanat Açıklığı
27-32 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
18-25 gr

Özellikleri

Küçük, sade görünümlü bir toygardır. Tepesi ve sırtı kızıl veya gri renkte olabilir. Göğsünün iki yanında siyah leke bulunur. Kalın gagası sivri uçludur. Tersiyerlerini tamamen örten uzun primerleri ve alt tarafının çizgisiz olmasıyla alandaki diğer toygarlardan ayrılır.

Yaşam Alanları

Yarı çöller, bozkırlar, çayırlar ve tarım arazileri gibi açık arazilerde görülür.

Beslenme

Tohum ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yoğun olarak ilkbaharda ve seyrek olarak yaz döneminde açık araziler ve tarım arazilerinde görülebilir.



Boğmaklı Toygar

Calandra Lark
Melanocorypha calandra

Kanat Açıklığı
38-40 cm

Boy
18-20 cm

Ağırlık
44-73 gr

Özellikleri

İri başlı, büyük bir toygardır. Buğday rengindeki iri kalın gagası ve siyah göğüs kuşağı dikkat çeker. Uçarken seçilen beyaz firar hattı göze çarpar. Boğazı beyaz, sırtı ve kuyruğu kahverengidir.

Yaşam Alanları

Tarlalar, otlaklar ve bozkırlar gibi açık arazilerde yaşar.

Beslenme

Diyetinin çoğunluğunu tohumlar oluşturur. Özellikle üreme döneminde böcekler ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde Beykoz'un açık arazileri ve tarım arazilerinde kayıtları vardır.



Kum Kırlangıcı

Sand Martin
Riparia riparia

Kanat Açıklığı
26-30 cm

Boy
12-13 cm

Ağırlık
12-18 gr

Özellikleri

Alanda görülen kırlangıç türleri arasındaki en küçüğüdür. Üst tarafı ve göğüs bandı toprak rengi, alt tarafı beyazdır. Göğüs bandından karnına doğru ince bir hat uzanır. Kısa kuyruğu hafif çatallıdır.

Yaşam Alanları

Sulak alanlar çevresindeki açık arazilerde bulunur.

Beslenme

Uçarken yakaladığı sinekler ve diğer küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında Beykoz'da, özellikle de Riva bölgesinde görülebilmektedir.



Kır Kırlangıcı

Barn Swallow
Hirundo rustica

Kanat Açıklığı
29-34 cm

Boy
15-19 cm

Ağırlık
17-25 gr

Özellikleri

Alandaki en yüksek sayıda ve en sık görülen kırlangıç türüdür. Koyu mavi üst tarafı, kızıl kahverengi boğazı ve alnı, krem rengi alt tarafı ve kuyruk altı örtüleriyle kolaylıkla tanınır. Boğazını koyu lacivert bir kuşak çevreler.

Yaşam Alanları

Kırsal bölgelerde, şehir içlerinde ve sulak alanların çevresinde görülür. Evlere ve diğer insan yapılarına yuva yaparlar.

Beslenme

Uçarken yakaladığı sinekler ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da göç dönemlerinde ve yaz aylarında görülmektedir.



Ev Kırlangıcı

Common House Martin
Delichon urbicum

Kanat Açıklığı
25-29 cm

Boy
12-15 cm

Ağırlık
15-21 gr

Özellikleri

En sık rastlanan iki kırlangıçtan birisidir. Diğer sık rastlanan tür olan kır kırlangıcından daha küçüktür. Kuyruk çatalı derin değildir. Sırtı ve tepesi mavimsi siyah, kanatları siyahtır. Kuyruk sokumundaki geniş beyazlık ve alt tarafının bembeyaz olması ile bölgedeki diğer kırlangıçlardan rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

İnsan yerleşimlerine, taş ocaklarına ve kayalara yuva yapar.

Beslenme

Sinekler ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz genelinde ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde görülür. Kırsal yerleşimlerde ve şehir içindeki yapılara yuvalar yapar.



Kızıl Kırlangıç

Red-rumped Swallow
Cecropis daurica

Kanat Açıklığı
30-35 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
18-21 gr

Özellikleri

Kır kırlangıcına oldukça benzer. Kızıl ensesi, açık kızıl kuyruk sokumu ve siyah kuyruk altı ile ondan ayırt edilir. Üst tarafı mavimsi siyah, alt tarafı krem renginde olup ince çizgilidir. Uçuşu oldukça zariftir. Kır kırlangıcına göre daha uzun süre havada süzülür.

Yaşam Alanları

Kaya oyuklarına, mağaralara, köprü altlarına ve binalara yuva yapar. Uzun girişi ile yuvası diğer kırlangıç yuvalarından rahatlıkla ayırt edilir.

Beslenme

Uçarken yakaladığı sinekler ve diğer küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve yaz aylarında görülmektedir. Beykoz'da Riva ve Kabakoz'dan üreme kayıtları vardır.



Kamışbülbülü

Cetti's Warbler
Cettia cetti

Kanat Açıklığı
13-15 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
11-14 gr

Özellikleri

Alandaki en yaygın türlerden biri olsa da gizli kalmayı sevdiği için nispeten az görülür. Tıknaz, yuvarlak, kalkık kuyruklu bir türdür. Üst tarafı ve kanatları kızıl-kahverengi, alt tarafı daha açık renklidir. İnce kaşı göze çarpar. Diğer pek çok ötücü kuşun aksine 12 yerine 10 kuyruk teleğine sahiptir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki yoğun çalılık ve sazlık alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir türdür. Yıl boyunca tüm sazlık alanlarda görülebilir.



Çıvgın

Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita

Kanat Açıklığı
16-18 cm

Boy
11-12 cm

Ağırlık
6-9 gr

Özellikleri

Bölgede görülen en küçük kuşlardan birisidir. Küçük, sade renkli, hareketli bir kuştur. Başı küçük ve yuvarlaktır. İnce bacakları siyahımsıdır. Üst tarafının ve alt tarafının renklenmesi alt türe ve popülasyonlara göre değişir. Genel olarak üst tarafı zeytin yeşili, alt tarafı sarımsıdır. Söğütbülbülü ile sık sık karıştırılır. Ondan daha kısa primer projeksiyonu ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Ormanlarda, park ve korularda, çalılıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve küçük tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu Beykoz'un koruluk, ormanlık ve çalılık alanlarında görülebilmektedir.



Söğütbülbülü

Willow Warbler
Phylloscopus trochilus

Kanat Açıklığı
16-22 cm

Boy
10-13 cm

Ağırlık
6-10 gr

Özellikleri

Oldukça küçük boylu, sarı ve yeşil renklerde olan bir kuştur. Genel görünümü ile çıvgına oldukça benzer. Çoğu zaman arazi koşullarında bu iki türü birbirinden ayırmak güçtür. Açık kaş ve bacak rengi çoğu kaynakta söğütbülbülünü çıvgından ayıran özellikler olarak verilse de bu tanımın birçok istisnası bulunmaktadır. En doğru ve kesin ayrım yöntemi primer projeksiyonuna göre tanımlamaktır. Söğütbülbülünün primer projeksiyonu çıvgına göre oldukça uzundur. Bu türlerin seslerini bilmek de oldukça önemlidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, çeşitli ağaçlık alanlar, bahçeler, fundalıklar, sazlıklar ve çalılıklarda görülür.

Beslenme

Özellikle yaprakbiti gibi küçük böcekler, böcek larvaları ve örümcekler diyetinin önemli bir kısmını oluşturur. Göç ederken böğürtlen gibi yüksek kalorili meyveleri de tüketebilir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçünde Beykoz'un tüm ağaçlık, çalılık ve sazlık alanlarında sıklıkla görülmektedir.



Orman Çıvgını

Wood Warbler
Phylloscopus sibilatrix

Kanat Açıklığı
19-24 cm

Boy
11-12 cm

Ağırlık
7-12 gr

Özellikleri

Yeşil, beyaz ve sarı renklerde olan, küçük bir ötücüdür. Alanda görülen en büyük çıvgındır. Göğsü ve uzun kaşı parlak sarı olup, karnı bembeyazdır. Söğütbülbülü ile sık sık karıştırılır; ondan daha uzun primer projeksiyonu ve nispeten kısa kuyruğu ile rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Çeşitli ormanlık alanlar ile korular, parklar ve bahçelerde görülür.

Beslenme

Böcekler ve örümcekler diyetinin önemli bir kısmını oluşturur. Ancak özellikle sonbahar göçünde yumuşak meyveleri ve tohumları da tercih eder.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde görülen bu tür, Beykoz'daki tüm ağaçlık alanlarda, korularda ve ormanlarda az sayıda bulunur.



Büyük Kamışçın

Great Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus

Kanat Açıklığı
28-30 cm

Boy
19-20 cm

Ağırlık
25-45 gr

Özellikleri

Alandaki en büyük kamışçındır. Renklenmesi saz kamışçını ve çalı kamışçınına benzer. Boyutu ve oldukça iri olan gagasıyla, alandaki diğer kamışçınlardan rahatlıkla ayırt edilir. Primerleri belirgin şekilde uzundur. Krem rengi kaşı ve siyah gözpınarı dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki sazlıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir. Özellikle sonbahar göçünde tohumlar ve yumuşak meyveleri de tüketir.

Görüldüğü Dönem

Bahar ve yaz dönemlerinde sulak alanlardaki kamışlık ve sazlıklarda görülmektedir.



Çalı Kamışçını

Marsh Warbler
Acrocephalus palustris

Kanat Açıklığı
18-20 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
11-16 gr

Özellikleri

Saz kamışçınına oldukça benzer. Gagası biraz daha kısa ve küt, bacakları genellikle daha açık renklidir. Ancak bu özellikleri arazide seçmek pek mümkün değildir. Halkalamada dahil bu iki türü ayırt etmek zordur. Bu nedenle bu iki türün sesini bilmek çok önemlidir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki çalılıklar ve sazlıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve nadiren küçük meyveler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde, sazlık ve çalılık alanlarda görülür.



Saz Kamışçını

Eurasian Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus

Kanat Açıklığı
17-21 cm

Boy
12-13 cm

Ağırlık
7-13 gr

Özellikleri

Küçük boylu, çizgisiz ve kahverengi tonlarda bir kamışçındır. Üst tarafı kahverengi, alt tarafı krem renkte olup, boğazı beyazdır. Alanda görülebilen çalı kamışçınına oldukça benzemektedir ve bu iki türü arazi şartlarında ayırmak güçtür. Bu nedenle bu iki türü birbirinden ayırt etmek için seslerinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, akarsu boyları ve göllerin çevresindeki sazlık alanlarda yaşar.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, örümcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında Riva'da ve Kabakoz'da sazlıklarda görülebilir.



Kındıra Kamışçını

Sedge Warbler
Acrocephalus schoenobaenus

Kanat Açıklığı
17-21 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
9-13 gr

Özellikleri

Bıyıklı kamışçına oldukça benzer. Ondan açık renk tepe çizgisi, krem rengi kaşı ve uzun primerleri ile rahatlıkla ayırt edilir. Ayrıca sırtı daha açık renklidir ve sırtındaki boyuna çizgiler daha siliktir.

Yaşam Alanları

Bitki örtüsünün yoğun olduğu sulak alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin çoğunu böcekler oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar, sonbahar ve az sayıda da yaz dönemlerinde Beykoz'daki sazlık alanlarda görülebilir.



Bataklık Kamışçını

Savi's Warbler
Locustella luscinioides

Kanat Açıklığı
20-22 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
14-18 gr

Özellikleri

Saz kamışçını ile ağaç kamışçının karışımı gibidir. Bu iki türden biraz daha iridir. Kuyruk altı örtülerinin uzun ve kabarık olması ve silik göğüs çizgileri ile saz kamışçınından ayırt edilir. Ağaç kamışçınından ise daha kahverengidir ve göğsündeki ile kuyruk altındaki çizgilenmeler ağaç kamışçınında olduğu kadar belirgin değildir.

Yaşam Alanları

Geniş sazlıkların olduğu sulak alanlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar ve sucul omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde Riva'daki sazlık ve bataklık alanlarda gözlemlenmektedir.



Ak Mukallit

Eastern Olivaceous Warbler
Iduna pallida

Kanat Açıklığı
18-21 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
10-12 gr

Özellikleri

Oldukça sade görünümlü bir ötleğendir. Morfolojisi ile kamışçınlara benzer. Özellikle saz kamışçını ile sıklıkla karıştırılır. Basık bir alna, dik bir başa, nispeten uzun, sivri bir gagaya ve gri bacaklara sahiptir. Üst tarafı gri, alt tarafı beyazımsıdır. Kuyruğu dikdörtgen şeklindedir. Kuyruk kenarları grimsi beyazdır. Dallarda sürekli hareket halindedir ve bu hareketleri yaparken kuyruğunu aşağıya doğru sallamaktadır. Alt kısmı beyaz tonlarda, kuyruk sokumu ise gri tonlardadır.

Yaşam Alanları

Ormanlık alanlar, bahçeler, korular, ağaçlık ve çalılık alanlar, göl kenarlarında görülebilmektedir.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını küçük omurgasızlar oluşturur. Ancak özellikle göç döneminde küçük meyveler ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Yaz dönemi boyunca Beykoz'daki tüm korular, parklar, çalılık alanlar ve bahçelerde görülmesi mümkündür.



Sarı Mukallit

Icterine Warbler
Hippolais icterina

Kanat Açıklığı
20-23 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
12-15 gr

Özellikleri

Sırtı yeşil, alt tarafı açık sarı, kanatları ve kuyruğu uzun, primer projeksiyonu ak mukallitten daha uzundur. Gencinde sarı tonlar daha azdır. Melodik ve tekrarlı ötüşü tanımlanmasını kolaylaştırır.

Yaşam Alanları

Çalılıklar, seyrek ağaçlık alanlar, parklar ve korularda görülür.

Beslenme

Böcekler ve küçük, yumuşak meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde uygun yaşam alanına sahip ağaçlık alanlarda az sayıda görülebilmektedir.



Karabaşlı Ötleğen

Eurasian Blackcap
Sylvia atricapilla

Kanat Açıklığı
21-23 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
14-20 gr

Özellikleri

Alandaki en yaygın ötleğendir. Gövdesi kirli gridir. Erkeğin tepesi siyah, dişinin açık kahverengidir. Başka bir tür ile karıştırılmaz.

Yaşam Alanları

Ormanlar, bahçeler, parklar, korular ve çalılıklarda yaşar.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, küçük omurgasızlar, tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Dört mevsim görülme şansı olan bir tür olup yoğun olarak ilkbahar ve sonbahar göç döneminde ve az sayıda Beykoz ormanlarında üreyen bireyleri görmek mümkündür. Kış kayıtları ise daha seyrektir.



Boz Ötleğen

Garden Warbler
Sylvia borin

Kanat Açıklığı
20-23 cm

Boy
14 cm

Ağırlık
16-23 gr

Özellikleri

Gizli kalmayı sever, çoğu zaman sadece sesi duyulur. Alanda bulunan diğer ötleğenlere kıyasla oldukça sade bir görünümü vardır. Boz renkli, kalın yapılı bir ötleğendir. Kısa gagası nispeten kalındır. Boynunun her iki yanında bulunan grilik tanımlanmasını kolaylaştırır.

Yaşam Alanları

Ormanlar, orman kenarları ve çalılıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde meyveli ağaçlık ve çalılıklarda görülebilir.



Küçük Akgerdanlı Ötleğen

Lesser Whitethroat
Sylvia curruca

Kanat Açıklığı
18-20 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
10-16 gr

Özellikleri

Koyu kulak örtüleri, açık boğazı, belirsiz göz halkası, siyah bacakları, gri gagası ve tepesi, gri-kahverengi kanatları ve kahverengi üst tarafı ile oldukça sade görünümlü bir ötleğendir.

Yaşam Alanları

İbreli veya karışık ormanlar, orman açıklıkları, bahçeler, parklar ve korular, çalılıklar ve makiliklerde görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, tohumlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında uygun habitata sahip alanlarda görülmektedir.



Akgerdanlı Ötleğen

Common Whitethroat
Sylvia communis

Kanat Açıklığı
19-23 cm

Boy
14-15 cm

Ağırlık
12-18 gr

Özellikleri

Genel olarak kızıl-kahverengi bir ötleğendir. Kızıl-kahverengi kanatları, sarımsı bacakları ve beyaz göz halkası göze çarpar. Erişkin erkeğinin başı gri, kanatları kızıl-kahverengi, boğazı beyaz, göğsü pembemsidir. Dişinin başı açık kahverengi olup göğsü devetüyü rengindedir. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Fundalıklar, makiler, orman açıklıkları, bahçeler, sulak alanlar etrafındaki çalılık ve ağaçlık yerler görüldüğü alanlardandır.

Beslenme

Böcekler, küçük omurgasızlar ve böğürtlen benzeri yumuşak meyveler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yazın Beykoz'un uygun habitatlarında görülebilir.



Maskeli Ötleğen

Sardinian Warbler
Sylvia melanocephala

Kanat Açıklığı
15-18 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
10-16 gr

Özellikleri

Koyu renklerde, kısa kanatlı, uzun kuyruklu küçük bir ötücüdür. Tipik bir maki kuşudur; Akdeniz bitki örtüsünde en yaygın görülen ötleğen türüdür. Erişkin erkeğinin başı simsiyah, boğazı beyaz, gövdesi ve kanatları gri renklidir. Kırmızı gözü ve göz halkası dikkat çeker. Dişisi daha kahverengidir, genci dişisine benzer daha kirli renklerdedir.

Yaşam Alanları

Makilikler, fundalıklar ve diğer çalılık alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler diyetinin önemli bir kısmını oluşturur. Sonbahar ve kış aylarında meyve ve tohumlar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup yıl boyu Beykoz'da uygun yaşam alanına sahip birçok noktada görülebilmektedir.



Çizgili Ötleğen

Barred Warbler
Sylvia nisoria

Kanat Açıklığı
23-27 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
21-35 gr

Özellikleri

Büyük, iri ve uzun kuyruklu bir ötleğendir. Erişkin erkeğinin alt tarafı yoğun çizgilidir. Koyu başında parlak sarı gözleri dikkat çeker. Kuyruk ucu beyazdır. Erişkin dişisi erkeğe benzer; ondan daha soluk renkli ve daha az çizgilidir. Genci kahverengidir. Bu dönemde boz ötleğene oldukça benzer. Ondan boyutu, çizgili kuyruk üstü ve kuyruk altı ile rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Sık çalılık ve makilik alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, örümcekler, diğer küçük omurgasızlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yaz göçmeni bir tür olup, Riva'daki makilik alanlarda ürediği bilinmektedir.



Çalıkuşu

Goldcrest
Regulus regulus

Kanat Açıklığı
13-15 cm

Boy
8-9 cm

Ağırlık
5-7 gr

Özellikleri

Alanda görülen en küçük kuşlardan biridir. Gagası incedir. Erkeğinin tepesi turuncu, dişinin sarıdır. Çift kanat çizgisi bulunur.

Yaşam Alanları

İbreli ormanlar, parklar, bahçeler ve korularda görülür.

Beslenme

Küçük böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde Beykoz'daki türe uygun tabiat alanlarında görülmektedir.



Sürmeli Çalıkuşu

Common Firecrest
Regulus ignicapilla

Kanat Açıklığı
13-16 cm

Boy
9-10 cm

Ağırlık
4-7 gr

Özellikleri

Türkiye'deki en küçük ve en hafif kuşlardan olup, alanda görülebilecek en küçük kuşlardan biridir. Üst tarafı yeşil tonlarda, alt tarafı açık gri tonlarda olan bir kuştur. Boyutu, renklenmesi ve davranışları ile çalıkuşuna oldukça benzer. Ondan beyaz kaşı ve ismini de aldığı koyu sürmesi ile rahatlıkla ayırt edilebilir. Erkeğinin tepe çizgisi turuncu, dişinin sarıdır.

Yaşam Alanları

İbreli ve yaprak döken ormanlar, çalılıklar, parklar ve korularda görülür.

Beslenme

Örümcekler, yaprak bitleri ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar ile kış döneminde uygun tabiat alanlarında görülebilmektedir.



Çitkuşu

Eurasian Wren
Troglodytes troglodytes

Kanat Açıklığı
13-17 cm

Boy
9-10 cm

Ağırlık
8-13 gr

Özellikleri

Alanda görülen en küçük kuşlardan birisidir. İnce beyazımsı kaşı, enine çizgili gövdesi ve kalkık küçük kuyruğuyla başka hiçbir türle karıştırılmaz. Gagası ve ayakları kahverengidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, çalılıklar, fundalıklar, parklar, korular ve bahçelerde görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, örümcekler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu Beykoz'daki tüm yeşil alanlarda görülen, yerli bir türdür.



Sıvacı

Eurasian Nuthatch
Sitta europaea

Kanat Açıklığı
16-18 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
19-24 gr

Özellikleri

Serçe boyutlarında, kısa kuyruklu bir kuştur. Ağaç gövdelerinde baş aşağıya durmaları bu cinsin en dikkat çekici özelliğidir. Tepesi, ensesi, kanatları ve sırtı mavimsi gri, sürmesi siyah, boğazı ve yanakları beyazdır. Alt tarafı kirli turuncudur. Gagası uzun ve kalındır.

Yaşam Alanları

Ormanlar, korular ve büyük parklarda görülür.

Beslenme

Diyetini; böcekler, tohumlar, kabuklu meyveler ve çiçek tomurcukları oluşturmaktadır. Besinlerini ağaç kabuklarının arasına sakladığı da görülür.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'un uygun tabiat alanlarında yıl boyu görülen yerli bir türdür. Beykoz'un korularından ve tabiat parklarından kayıtları vardır.



Bahçe Tırmaşıkkuşu

Short-toed Treecreeper
Certhia brachydactyla

Kanat Açıklığı
17-21 cm

Boy
12-13,5 cm

Ağırlık
8-12 gr

Özellikleri

Tepe ve sırt tüyleri kahverengi, alt tarafı beyazımsıdır. Orman tırmaşıkkuşu ile sıklıkla karıştırılır. Ondan arka tırnağı daha kısa, gagası daha uzundur. Böğrü daha kirlidir. Ayrıca primer uçlarındaki nokta şeklindeki açık lekeler daha belirgindir.

Yaşam Alanları

Korular, ormanlar ve büyük bahçeler görüldüğü alanlardandır.

Beslenme

Diyetini böcekler ve böcek larvaları, örümcekler ve tohumlar oluşmaktadır.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'un koruluk ve ormanlık alanlarında yıl boyu görülür.



Sığırcık

Common Starling
Sturnus vulgaris

Kanat Açıklığı
31-40 cm

Boy
20-23 cm

Ağırlık
60-96 gr

Özellikleri

İstanbul'da görülen en yaygın ötücü kuşlardan biridir. Özellikle kış aylarında büyük sürüler halinde görülür. Sivri kanatlı ve sivri gagalı, koyu renklerde, orta boyutlu bir ötücü kuştur. Erkek ve dişisi genel olarak birbirine benzer; üreme döneminde erkeğin gaga dibi mavimsi yeşil iken, dişininki açık pembedir. Erişkini yaz giysisinde parlak yeşil ve mordur. Kış aylarında "V" şekilli soluk telek uçları ile oldukça benekli bir görünümü vardır.

Yaşam Alanları

Şehir merkezleri, kırsal bölgeler, bahçeler, açık araziler, tarım arazileri ve parklar.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, yumuşakçalar, tahıl ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da yıl boyu görülebilen bir türdür; kış aylarında çok büyük sürüler halinde gözlenir.



Alasığırcık

Rosy Starling
Pastor roseus

Kanat Açıklığı
33-36 cm

Boy
19-22 cm

Ağırlık
75-88 gr

Özellikleri

Erişkinlerin gövde rengi pembe, başı, boğazı ve göğsü ile kanatları siyah renklidir. Erişkinlerin üreme döneminde belirginleşen tepe tüyleri vardır. Küt ve sarımsı gagaya sahiptir. Gençler sığırcık gencine benzese de onlar gibi koyu kahve renkli değil, oldukça açık kahverengi tonlardadır. Ayrıca bacakları pembedir. Gür bir ses tonu vardır. Grup halinde dolaşırlar.

Yaşam Alanları

Koruluk alanlar, ağaçlık alanlar, tarlalar ve açık alanlarda görülebilmektedir.

Beslenme

Çekirgeler başta olmak üzere pek çok böcek, tohum ve meyveler diyetinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

Sadece ilkbahar sonu – yaz başında (mayısın ikinci yarısı ile haziran başında) çok kısa bir zaman için, meyve ağaçlarında beslenirken görülür.



Karatavuk

Common Blackbird
Turdus merula

Kanat Açıklığı
34-38 cm

Boy
25-28 cm

Ağırlık
80-110 gr

Özellikleri

Erişkin erkeğinin siyah gövdesinde, sarı göz halkası ve gagası oldukça dikkat çeker. Dişisi ve genci kahverengidir. Uçarken kısa kanatları, koyu gövdesi ve uzun kuyruğu ile tanımlanabilir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, çalılıklar, parklar, korular ve bahçelerde görülür.

Beslenme

Böcekler, solucanlar, meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyu görülebilen yerli bir kuştur. Beykoz'un koruluk ve ormanlık alanlarında sıkça görülmektedir.



Tarla Ardıcı

Fieldfare
Turdus pilaris

Kanat Açıklığı
39-42 cm

Boy
25-28 cm

Ağırlık
80-140 gr

Özellikleri

Büyük, iri yapılı ve uzun kuyruklu bir ardıçtır. Kızıl sırtı, gri başı ve gri kuyruk sokumu dikkat çeker. Hardal rengi olan göğsü yoğun çizgilidir. Oldukça ince olan kaşı beyaz, gagası sarı-siyah renklerdedir. Uçarken görüldüğünde beyaz kanat altı örtüleri ve siyah uzun kuyruğu ile tanımlanabilir. Genellikle sürüler halinde görülür.

Yaşam Alanları

Seyrek iğne yapraklı ve yaprak döken ormanlar, park ve korular ile diğer ağaçlık alanlarda görülür. Kış aylarında tarım arazileri gibi açık alanlarda da görülebilir.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, diğer küçük omurgasızlar, meyveler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış göçmeni bir türdür, göç dönemlerinde de görülmektedir. Riva ve civarında düzenli olarak bu dönemlerde kayıtları bulunmaktadır.



Kızıl Ardıç

Redwing
Turdus iliacus

Kanat Açıklığı
33-34 cm

Boy
20-24 cm

Ağırlık
55-75 gr

Özellikleri

Uzunca beyaz kaşı, sarı-siyah gagası, kızılımsı böğrü ve kızıl kanat altı örtüleri ile rahatlıkla tanınır. Öter ardıç ve ökse ardıcından daha küçüktür. Kısa kuyrukludur.

Yaşam Alanları

Korular, parklar, bahçeler ile çevresinde açık arazi bulunan ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Meyveler, tohumlar, böcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Ekim ayından itibaren kış döneminde ve ilkbahar döneminde ormanlık ve koruluk alanlarda görülebilmektedir.



Öter Ardıç

Song Thrush
Turdus philomelos

Kanat Açıklığı
33-36 cm

Boy
20-23 cm

Ağırlık
65-90 gr

Özellikleri

Orta boylu, benekli bir ardıç türüdür. Üst tarafı yeşilimsi kahverengidir. Beyaz alt tarafındaki koyu benekler ters kalp şeklindedir. Ökse ardıcı ile sık sık karıştırılır. Daha küçük olması, alt tarafındaki beneklerin daha düzgün, temiz ve ters kalp şeklinde olması ve kanat altı örtü tüylerinin turuncumsu olmasıyla ökse ardıcından ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Yaprak döken veya karışık ormanlarda, park ve korular ile meyve bahçeleri gibi çeşitli ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları, solucanlar, diğer küçük omurgasızlar, tohumlar ve meyvelerle beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un ormanlık ve koruluk alanlarında görülebilmektedir.



Ökse Ardıcı

Mistle Thrush
Turdus viscivorus

Kanat Açıklığı
42-48 cm

Boy
27-28 cm

Ağırlık
110-140 gr

Özellikleri

Ülkemizde görülen en büyük ardıçkuşudur. Dik duruşu ve boyutu ile kendini belli eder. Sırtı gridir. Göğsündeki benekler düzensiz dağılır ve yelpaze şeklindedir. Uçarken seçilen kanat altı örtü tüyleri bembeyazdır. Erkek ve dişi birbirine benzer. Gençleri daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Karışık veya iğne yapraklı ormanlar, kırsal alanların kenarındaki ağaçlık alanlar, parklar ve bahçelerde görülür. Kış aylarında daha açık arazilerde görülebilir.

Beslenme

Tohumlar, meyveler, böcekler, böcek larvaları ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde daha nadir, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde nispeten daha sık ve yüksek sayılarda görülmektedirler.



Boğmaklı Ardıç

Ring Ouzel
Turdus torquatus

Kanat Açıklığı
33-38 cm

Boy
23-24 cm

Ağırlık
90-130 gr

Özellikleri

Erişkini geniş, açık renk göğüs kuşağı (erkeğinin bembeyaz, dişinin beyazımsı), koyu gövdesi (dişi kahverengi, erkek siyah) ve pullu görünümü ile alandaki ardıç türlerinden rahatlıkla ayırt edilir. Yerdeyken kanatlarındaki beyaz panel dikkat çeker. Göğüs kuşağı silik olan genç bireyler karatavuk ile karıştırılabilir; alt tarafının daha benekli olması ve kanatlarındaki beyaz panel ile ondan ayırt edilebilir.

Yaşam Alanları

Seyrek ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Böcekler, solucanlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Sık görülmeyen bir geçit kuşudur. Mart-Nisan aylarında Riva'dan kayıtları vardır.



Benekli Sinekkapan

Spotted Flycatcher
Muscicapa striata

Kanat Açıklığı
23-25 cm

Boy
12-15 cm

Ağırlık
13-19 gr

Özellikleri

Üst tarafı gri, alt tarafı beyazımsıdır. Tepesi, boğazı ve göğsündeki çizgiler dikkat çeker. Bacakları ve büyükçe olan gözü siyahtır. Genellikle bir dalın ucunda tüneyerek avlanır ve çoğunlukla aynı dala geri döner.

Yaşam Alanları

Ormanlar, orman kenarları, çalılıklar, parklar ve korularda görülür.

Beslenme

Uygun bir dala tüneyerek etrafında uçuşan sinekler ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'un ağaçlık arazilerinde Nisan-Eylül ayları arasında görülmektedir.



Halkalı Sinekkapan

Collared Flycatcher
Ficedula albicollis

Kanat Açıklığı
22-24 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
12-16 gr

Özellikleri

Erişkin erkeği boynunu tamamen çevreleyen beyaz boyun kuşağı ile rahatlıkla tanınır. Birincil kanat teleklerinin kökündeki ve kanatlarındaki beyazlık kara sinekkapana göre daha fazladır. Alnındaki beyaz benek iridir. Dişisi ve birinci kışındaki genci gri-kahverengidir.

Yaşam Alanları

Yaprak döken ve karışık ormanlar, parklar, bahçeler ve korularda görülür.

Beslenme

Küçük böcekler, sinekler ve örümcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde Beykoz'daki tüm ağaçlık alanlarda görülmektedir.



Kara Sinekkapan

European Pied Flycatcher
Ficedula hypoleuca

Kanat Açıklığı
21-24 cm

Boy
12-13 cm

Ağırlık
9-15 gr

Özellikleri

Üreme dönemindeki erkeği alaca sinekkapan erkeği ile sıklıkla karıştırılır. Alnında iki küçük beyaz benek bulunur. Beyaz boyun lekesi alaca sinekkapana göre daha kısa, primer ve kuyruk kökündeki beyazlık daha sınırlıdır. Dişisi ve genci kahverengidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, korular ve parklar ile meyve bahçelerinde bulunur.

Beslenme

Sinekler ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbaharda Nisan-Mayıs aylarında ve sonbaharda Ağustos-Eylül aylarında Beykoz'da pek çok alanda görülmektedir.



Alaca Sinekkapan

Semicollared Flycatcher
Ficedula semitorquata

Kanat Açıklığı
22-24 cm

Boy
12-13,5 cm

Ağırlık
8-17 gr

Özellikleri

Sıklıkla kara sinekkapan ve halkalı sinekkapan ile karıştırılır. Üreme döneminde erkeğinin boyun halkası kara sinekkapana göre daha çok enseye sokulur ancak halkalı sinekkapandaki gibi halka oluşturmaz ve çift kanat bandı bulunur. Alnında iki küçük beyaz leke vardır. Dişileri ve gençleri kara sinekkapan ve halkalı sinekkapanın aynı formları ile ayırmak oldukça güçtür. Halkalama da dahi bazı bireyleri ayırmak çok zor olabilmektedir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, koruluk alanlar, orman açıklıkları, korular ve büyük parklar görülme alanlarındandır.

Beslenme

Sinekler ve böcekler temel besinleri olmasının yanında tırtıl ve örümcek yediği de gözlemlenmiştir.

Görüldüğü Dönem

Alandaki en nadir görülen sinekkapandır. İlkbahar, sonbahar göç dönemlerinde biraz daha sık olmakla birlikte, yaz döneminde de uygun habitatlarda görülmektedir.



Küçük Sinekkapan

Red-breasted Flycatcher
Ficedula parva

Kanat Açıklığı
18-21 cm

Boy
10-12 cm

Ağırlık
8-11 gr

Özellikleri

Alanda görülen en küçük sinekkapan türüdür. İri gözleri, beyaz göz halkası ve dış kuyruk teleklerinin kökünün beyaz olması dikkat çeker. Sık sık kuyruğunu aşağı-yukarı hareket ettirir. Erkeğinin başı gri, boğazı ve göğsü turuncudur. Dişisinin başı ve sırtı kahverengi olup alt tarafı devetüyü rengindedir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, parklar, korular gibi çeşitli ağaçlık alanlar, bahçeler ve çalılıklarda görülür.

Beslenme

Örümcekler ile sinek benzeri küçük böceklerle beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde uygun yaşam alanına sahip bölgelerde görülebilir.



Kızılgerdan

European Robin
Erithacus rubecula

Kanat Açıklığı
20-22 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
14-22 gr

Özellikleri

Tombul ve yuvarlak vücudu, koca kafası, kızıl göğsü ve başı ile rahatlıkla tanınır. Küçük ve narin gagası siyahtır. Erkek ve dişisi birbirine benzer. Yuvadan yeni uçmuş genç bireyleri oldukça beneklidir.

Yaşam Alanları

Bahçeler, parklar, korular ve ormanlar türün gözlemlendiği yerlerdendir.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir türdür, yıl boyunca koruluk alanlarda, park ve bahçelerde görülmektedir. Kış aylarında şehir merkezlerinde bile rahatça görülür.



Bülbül

Common Nightingale
Luscinia megarhynchos

Kanat Açıklığı
23-26 cm

Boy
16-17 cm

Ağırlık
18-27 gr

Özellikleri

Gizli kalmayı sever, çoğu zaman sadece "meşhur" ötüşü ile kendini belli eder. Gövdesi kızıl kahverengi, alt tarafı boz, kuyruğu kızıl renktedir. Benekli bülbül ile sık sık karıştırılır. Ondan daha açık ve canlı renklidir. Bıyık çizgisi belirsizdir, göğsünde belirgin çizgiler bulunmaz. 1.primeri, primer örtü tüylerini genellikle aşar.

Yaşam Alanları

Ormanlar, dere boyları, çalılıklar, koru ve parklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve küçük yumuşakçalar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Bahar ve yaz aylarında görülebilir. Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarında habitatına uygun alanlarda görülebilir ve yaz gecelerinde sesi duyulabilir.



Benekli Bülbül

Thrush Nightingale
Luscinia luscinia

Kanat Açıklığı
24-26 cm

Boy
16-17 cm

Ağırlık
21-29 gr

Özellikleri

Genel görünümü ve renklenmesi ile bülbüle oldukça benzer. Üst tarafı daha koyu ve donuk kahverengi, kuyruk sokumu ve kuyruğu az kızıl tonlardadır. Gri tonlardaki göğsünde silik benekler bulunur. Yakından fotoğrafı çekildiğinde veya halkalamada eldeyken, çoğunlukla 1.primerinin primer örtü tüylerinden kısa olması ile ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Çalılık alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetini böcekler, larvalar ve tohumlar oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbaharda ve yaz sonunda geçit yaparken görülür.



Kızılkuyruk

Common Redstart
Phoenicurus phoenicurus

Kanat Açıklığı
21-24 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
12-17 gr

Özellikleri

İsmini kızılımsı kuyruk tüylerinden alır. Erişkin erkeği siyah boğazı, alnı ve kulak örtüleri; mavimsi-gri tepesi ve üst tarafı ve kızıl alt tarafı ile rahatlıkla tanınır. Gözünün üstünden alnına doğru uzanan beyazlık göze çarpar. Dişisi daha sade görünümlüdür; üst tarafı açık kahverengi, alt tarafı açık krem rengi veya turuncudur.

Yaşam Alanları

Ormanlar, parklar, korular gibi çeşitli ağaçlık alanlarda bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir. Özellikle sonbahar göçünde meyve ve tohumda tüketir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar döneminde, göçleri sırasında Beykoz'un meyvelik ve ağaçlık alanlarında gözlemlenmektedir.



Kara Kızılkuyruk

Black Redstart
Phoenicurus ochruros

Kanat Açıklığı
23-26 cm

Boy
13-15 cm

Ağırlık
14-20 gr

Özellikleri

Kızıl renkli kuyruğunun ortası koyu renklidir. Üreme döneminde erkeğinin başı, alt tarafı, sırtı ve kanatları siyah veya siyahımsıdır. Kanadında beyaz bir panel bulunabilir. Dişisi ve genci daha soluk renklidir; gri-kahverengidir.

Yaşam Alanları

Kayalık yamaçlar, yarlar ve yaylalarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Sonbahar ve ilkbahar göç dönemleri ile kış aylarında uygun alanlarda görülmektedir.



Çayır Taşkuşu

Whinchat
Saxicola rubetra

Kanat Açıklığı
21-24 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
16-24 gr

Özellikleri

İri başlı, kısa kuyruklu, ötücü bir kuştur. Belirgin, uzun açık renkli kaşı ile taşkuşundan rahatlıkla ayırt edilir. Göğsü turuncu, kulak örtüleri ve tepesi koyu, sırtı ve kuyruk sokumu kahverengi üzerine koyu desenlidir. Kuyruk ucunda geniş, siyah bir bant bulunur. Kuyruk teleklerinin kökü beyazdır. Erişkin erkeğinin tepesi ve kulak örtüleri siyahımsı, kaşı belirgin beyazdır. Beyaz omuz ve kanat lekesi bulunur. Göğsü parlak turuncu renktedir. Dişisi erkeğe göre daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Çayırlar, yüksek otlu meralar, tarlalar, fundalıklar ve çalılarda yaşar.

Beslenme

Böcekler, küçük omurgasızlar ve meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemlerinde fundalık ve çalılık alanlarda sıkça rastlanır. Riva çayırları türün en sık görüldüğü alanlardandır.



Taşkuşu

European Stonechat
Saxicola rubicola

Kanat Açıklığı
18-22 cm

Boy
12-13 cm

Ağırlık
14-18 gr

Özellikleri

Kısa kuyruklu, dik duruşlu, tıknaz ve tombulca küçük bir kuştur. Erkeğinin simsiyah başı, pas kızılı göğsü ve beyaz boyun halkası dikkat çeker. Kışın, erkeğin siyah tüyleri kahverengiye döner. Dişisi erkeğe göre oldukça sade olup genel olarak açık kahverengi renklerdedir. Gençleri dişilere benzer.

Yaşam Alanları

Makilik alanlar, çalılıklar, fundalıklar, kırsal alanlar ve özellikle kış aylarında sulak alanların çevresindeki sazlıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ile diğer küçük omurgasızlar diyetinin önemli bir kısmını oluşturur. Küçük meyveler ve tohum ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup yıl boyu gözlenebilir. Kış aylarında ve göç dönemlerinde sayılarında artış gözlemlenmiştir.



Sibirya Taşkuşu

Siberian Stonechat
Saxicola maurus

Kanat Açıklığı
16-21 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
12-17 gr

Özellikleri

Genel görünümü ile taşkuşuna oldukça benzer ve bu iki türü birbirinden ayırmak çok zordur. Genel olarak Sibirya taşkuşunun göğüsteki turunculuğu daha ufak, beyaz boyun lekesi daha geniştir. Kuyruk sokumu lekesiz ve bembeyaz olup kanat altı örtü tüyleri simsiyahtır.

Yaşam Alanları

Çayırlık alanlar, makilikler ve çalılık alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını böcekler ve böcek larvaları oluşturur.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde seyrek olarak görülmektedir. Riva çayırlarından kayıtları vardır.



Kuyrukkakan

Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe

Kanat Açıklığı
26-32 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
17-30 gr

Özellikleri

Alanda en sık ve bol rastlanan kuyrukkakan türüdür. Erkeğin tepesi ve sırtı gri, kanatları siyahtır. Uzun beyaz kaşı, siyah göz pınarı ve kulak örtüleri dikkat çeker. Dişisinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı kirli sarıdır. Genç bireylerin benekli bir görünümü vardır.

Yaşam Alanları

Çok çeşitli ağaçsız ve kayalık arazilerde bulunur.

Beslenme

Böcekler, diğer küçük omurgasızlar ve küçük meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yaz dönemi ve göç dönemlerinde ağırlıklı olarak, Riva çayırları olmak üzere Beykoz genelinde gözlemlenebilir.



Boz Kuyrukkakan

Isabelline Wheatear
Oenanthe isabellina

Kanat Açıklığı
27-31 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
27-33 gr

Özellikleri

Dik duruşlu, boz renkli bir kuyrukkakandır. Kuyruk ucu bandı oldukça geniştir. Kaşı gözünün önünde belirgindir; göz pınarı koyudur. Kanatları ve sırtı boz renklidir. Siyah alulası göze çarpar.

Yaşam Alanları

Bozkırlar, tarım araziler, yarı kurak alanlar ve seyrek çalılık alanlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin çoğunluğunu böcekler oluşturur. Nadiren tohumlar ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Göç dönemleri ve yaz aylarında uygun yaşam alanına sahip alanlarda gözlemlenmektedir. Riva çayırları bu türün düzenli olarak görüldüğü alanlardandır.



Karakulaklı Kuyrukkakan

Eastern Black-eared Wheatear
Oenanthe melanoleuca

Kanat Açıklığı
25-27 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
15-22 gr

Özellikleri

Üreme döneminde erkeğinin alt tarafı beyaz, başı ve sırtı hafiften turuncu, ince sürmesi ve kanatları siyahtır. İlkbaharda ise boğazı ve kulak örtüleri tamamıyla siyahtır. Dişisi daha soluk renklidir; kanatları, boğazı ve kulak örtüleri siyahımsı, sırtı kahverengi, göğsü kirli turuncudur. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Makilikler ve çalılık arazilerde görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde, kayalık ve fundalık alanlarda gözlemlenebilir.



Serçe

House Sparrow
Passer domesticus

Kanat Açıklığı
19-25 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
27-30 gr

Özellikleri

İstanbul'daki ve Beykoz'daki en yaygın ötücü kuş türüdür. Şehir hayatına çok iyi adapte olmuş bu tür hemen hemen herkes tarafından tanınır. Erkeği siyah sürmesi ve gıdısı ile dişisinden rahatlıkla ayırt edilir. Gri tepesi ve alt tarafı ile söğüt serçesi erkeğinden ayrılır. Dişileri ile gençleri birbirine çok benzer.

Yaşam Alanları

Parklar, bahçeler, korular, kırsal alanlar, şehir merkezleri görüldüğü alanlardır.

Beslenme

Ana besin kaynağı tohumlardır; üreme mevsiminde böcekler, böcek larvaları, örümcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un her yerinde gözlemlenebilen yerli bir türdür.



Ağaç Serçesi

Eurasian Tree Sparrow
Passer montanus

Kanat Açıklığı
20-22 cm

Boy
14-15 cm

Ağırlık
18-28 gr

Özellikleri

Genel görünümü ile serçeyi andırır. Ancak beyaz yanağında bulunan siyah leke, kahverengi tepesi ve boyutça küçük olması ile kolaylıkla ondan ayırt edilir. Boğazındaki siyah tüyler daha küçük bir alan kaplar. Eşlerin görünüşleri benzerdir. Gençlerin görünüşü ise daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Ağaçlık ve çalılık alanlar, tarım arazileri, bahçeler, koru ve parklar görüldüğü alanlardandır.

Beslenme

Tohum ve küçük omurgasız canlılar besin listesinde yer almaktadır.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca Beykoz'un uygun tabiat alanlarında gözlemlenmektedir.



Söğüt Serçesi

Spanish Sparrow
Passer hispaniolensis

Kanat Açıklığı
20-26 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
20-32 gr

Özellikleri

Boyutu ve şekli ile genel olarak serçeye benzer. Erkeği serçe erkeğinden kestane rengi tepesi, beyaz yanakları, siyah göğsü ile sırtında ve alt tarafında bulunan alın siyah çizgilerle ayrılır. Dişisi erkeğe göre oldukça sade görünümlüdür. Serçe ve söğüt serçesi dişisini halkalama çalışmalarında dahi birbirinden ayırmak pek mümkün olmamaktadır.

Yaşam Alanları

Tarım arazilerinde ve kırsal yerleşimlerin çevresinde bulunur. Ağaçlara ve leylek yuvalarının altına yuva yapar.

Beslenme

Böcekler, tohumlar ve küçük meyveler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar aylarında Riva çayırlarında görülmektedir. Az sayıda diğer aylarda da görülebilir. Özellikle Beykoz'un köylerindeki leylek yuvalarında üremeleri muhtemeldir.



Dağbülbülü

Dunnock
Prunella modularis

Kanat Açıklığı
19-21 cm

Boy
14-18 cm

Ağırlık
25-35 gr

Özellikleri

Hemen hemen serçe boyutlarındadır. Kahverengi üzerine siyah çizgili olan sırtı serçeyi andırır. İnce koyu gagası ve kırmızı bacakları dikkat çeker. Göğsü gri olup böğrü yoğun çizgilidir.

Yaşam Alanları

Çalılıklar, ormanlar, makilikler ve orman açıklıklarında görülür.

Beslenme

Böcekler, solucanlar ve örümcekler ile beslenir. Kış aylarında bitkisel gıdaları da tercih eder.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile kış aylarında, az sayıda görülen bir kuştur.



Ak Kuyruksallayan

White Wagtail
Motacilla alba

Kanat Açıklığı
25-30 cm

Boy
17-19 cm

Ağırlık
18-27 gr

Özellikleri

Siyah-beyaz renklerde ve uzun kuyruklu bir kuyruksallayandır. Düzenli olarak kuyruğunu yukarı aşağı sallar. Üreme döneminde erkeğinin alnı, yanakları ve boynunun yanları beyaz, tepesi, boğazı ve göğsü siyahtır. Sırtı ve omuz örtüleri gri, kuyruğu siyah, kuyruk dış telekleri beyazdır. Üreme dışı döneminde boğazı beyaz olup göğsünde siyah bir şerit bulunur. Dişisi ve genci daha soluk renklerdedir. Şehir hayatına da adapte olmuş bu tür, yuvasını binalardaki çatlaklara, taşların arasındaki oyuklara yapar.

Yaşam Alanları

Beykoz'daki park ve bahçeler, sahil şeridi, çayırlık ve bataklık alanlar.

Beslenme

Böcekler, örümcekler ve tohumlar ile beslenir. Avlanmak için suya yakın alanları ve açık arazileri tercih eder.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'daki popülasyonun büyük kısmı yerel olmasına rağmen, göç dönemlerinde daha sık ve yüksek sayılarda görülür.



Dağ Kuyruksallayanı

Grey Wagtail
Motacilla cinerea

Kanat Açıklığı
25-29 cm

Boy
18-20 cm

Ağırlık
14-23 gr

Özellikleri

Alanda görülen en büyük ve en uzun kuyruklu kuyruksallayandır. Parlak sarı kuyruk altı tüyleri dikkat çeker. Üreme döneminde erkeğin başı, ensesi ve sırtı mavimsi gri, boğazı ve gagası simsiyah, alt tarafı tamamen sarıdır. 1. Kışındaki bireylerin gaga kökü pembe, boğazı, göğsü ve karnı beyazımsı, kuyruk altı tüyleri parlak sarıdır.

Yaşam Alanları

Debisi yüksek derelerde üreyen bu tür, kışı sulak alanların çevresinde, kırsal ve kentsel yerleşimlere yakın alanlarda geçirir.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçü ile kış döneminde sulak alanlar çevresinde, hatta şehir içinde bile rahatça gözlemlenmektedir.



Sarı Kuyruksallayan

Western Yellow Wagtail
Motacilla flava

Kanat Açıklığı
17-28 cm

Boy
16-17 cm

Ağırlık
16-19 gr

Özellikleri

Uzun ve devamlı hareketli olan bir kuyruğa sahip, ince vücutlu bir ötücüdür. Ülkemizde görülen diğer kuyruksallayan türlerinden küçüktür. Kuyruğu uzun, ince ve siyah, kuyruk dış telekleri beyazdır. İnce uzun bacakları siyahtır. Renklenmesi cinsiyete, yaşa ve alt türe göre değişiklik gösterir. Genel olarak alt tarafı sarı, sırtı ise yeşilimsi kahverengidir. Genç bireylerin koyu bir göğüs kuşağı bulunur.

Yaşam Alanları

Islak çayırlık alanlarda üremektedir. Göç döneminde ıslak ve kuru çayırlar ile tarım arazilerinde görülmektedir.

Beslenme

Böcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir. Genellikle sığır, koyun veya atların yanında gezerek beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde uygun yaşam alanına sahip bölgelerde küçük veya büyük gruplar halinde görülebilmektedir. Riva'daki küçük göletlerin çevresinde üremesi muhtemeldir.



Sarıbaşlı Kuyruksallayan

Citrine Wagtail
Motacilla citreola

Kanat Açıklığı
24-27 cm

Boy
16-20 cm

Ağırlık
17-22 gr

Özellikleri

Üreme döneminde erkeği, sapsarı başı ve alt tarafı ile rahatlıkla tanınır. Sırtı gridir, siyah boyun bandı ensesine doğru genişler. Beyaz renkli çift kanat çizgisi dikkat çeker. Dişisi ve üreme dışı giysisindeki erkeği daha soluk renklidir; tepesi ve kulak örtüleri kahverengi, kaşı ve alt tarafı soluk sarıdır.

Yaşam Alanları

Bataklıklar, ıslak çayırlar ve sazlık alanlarda yaşar.

Beslenme

Böcekler ve diğer küçük omurgasızlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde az sayıda Riva çayırlarında kayıtları mevcuttur.



Kır İncirkuşu

Tawny Pipit
Anthus campestris

Kanat Açıklığı
25-28 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
20-28 gr

Özellikleri

Alandaki en büyük incirkuşudur. Uzun gagalı, boz renkli ve dik duruşludur. Uzun kaşı beyaz, göz pınarı ve bıyık çizgisi koyudur. Erişkin bireylerin alt tarafı çizgisizdir. Genç bireylerde hafif çizgilenme görülebilir.

Yaşam Alanları

Kırsal alanlar, çayırlar, tarlalar, bozkırlar, kumullar ve fundalıklarda görülür.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile yaz aylarında uygun doğal alanlarda görülebilir.



Çayır İncirkuşu

Meadow Pipit
Anthus pratensis

Kanat Açıklığı
22-25 cm

Boy
14-15 cm

Ağırlık
16-25 gr

Özellikleri

Genel olarak ağaç incirkuşuna ve 1. kışındaki kızılgerdanlı incirkuşuna benzer. Ağaç incirkuşundan alt gaga kökünün sarımsı olması ve böğründeki çizgilerin daha kalın olmasıyla ayırt edilir. Bu iki türü arazide ayırt etmek için seslerini bilmek önemlidir. 1. kışındaki kızılgerdanlı incirkuşundan çizgisiz kuyruksokumu ve sırtındaki çizgilerin daha ince olmasıyla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresindeki açık arazilerde bulunur.

Beslenme

Böcekler, böcek larvaları ve örümcekler ile beslenir. Göç döneminde ve kışın tohumları da tüketir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile kış aylarında, tüm açık arazilerde görülebilen bir türdür.



Ağaç İncirkuşu

Tree Pipit
Anthus trivialis

Kanat Açıklığı
25-27 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
20-25 gr

Özellikleri

Boyutu, renklenmesi ve davranışları ile çayır incirkuşuna oldukça benzer. Ondan alt gaga kökünün pembe olması ve böğür kenarındaki çizgilerin daha ince olmasıyla ayırt edilir. Ayrıca gagası daha kalın, arka tırnağı daha kısadır. Uçuşu çayır incirkuşuna göre daha dalgalıdır.

Yaşam Alanları

Orman içleri ve açıklıkları, açık alanlar, korular, parklar, bahçeler görüldüğü alanlardandır.

Beslenme

Omurgasızlar ve böcekler besin listesinde bulunmaktadır. Kış aylarında bitki tohumlarını da tüketir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde Beykoz'un tüm yeşil alanlarında görülebilirler.



Dağ İncirkuşu

Water Pipit
Anthus spinoletta

Kanat Açıklığı
23-28 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
21-30 gr

Özellikleri

Çayır ve ağaç incirkuşundan daha büyük, iri ve koyu renklidir. Bacakları ve gagası siyah, sırtındaki çizgiler ince ve belirsizdir. Üreme formunda göğsü pembe, üst tarafı kahverengi, başı gridir. Gri başında, beyaz kaşı ve siyah göz pınarı dikkat çeker.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde, bataklıklarda, deniz kıyılarında ve yüksek dağlık alanlarda görülür. Yüksek dağlardaki çayırlarda ürer.

Beslenme

Böcekler ve böcek larvaları ile beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemleri ile kış aylarında, sulak alanlar çevresinde görülebilmektedir.



Kızılgerdanlı İncirkuşu

Red-throated Pipit
Anthus cervinus

Kanat Açıklığı
25-27 cm

Boy
14-15 cm

Ağırlık
25-30 gr

Özellikleri

Üreme döneminde kızıl başı, boğazı ve göğsünün üst tarafı ile rahatlıkla tanınır. Genç bireylerde bu kızıllık görülmez, bu nedenle sık sık çayır incirkuşu ile karıştırılır. Böğründeki çizgilerin daha kalın ve iç içe olması, sırtındaki boyuna çizgilerin daha kalın olması ve yine sırtında iki beyaz çizgi barındırmasıyla ondan ayırt edilebilir.

Yaşam Alanları

Sulak alanların çevresinde, çayırlarda, tarım arazilerinde ve diğer açık arazilerde görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını böcekler oluşturur, nadiren tohumlarla da beslenir.

Görüldüğü Dönem

Genellikle Riva çayırlarında nisan ve mayıs aylarında görülmektedir. Az sayıda sonbahar göç döneminde de kayıtları vardır.



İspinoz

Common Chaffinch
Fringilla coelebs

Kanat Açıklığı
24-28 cm

Boy
14-16 cm

Ağırlık
17-30 gr

Özellikleri

Serçe boyutlarında yaygın görülen bir türdür. Beyaz kanat barları ve dış kuyruk telekleri ile yeşil kuyruk sokumu göze çarpar. Üreme döneminde erkeğinin tepesi ve ensesi gri-mavi, kulak örtüleri ve alt tarafı pas kızılı, sırtı kestane kızılıdır. Genci ve dişisi daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, orman açıklıkları ve çeşitli açık arazilerde görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını tohumlar oluşturur. Ancak özellikle üreme döneminde böcekler ve böcek larvaları ile de beslendiği görülür.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir tür olup Beykoz'un hemen hemen her yerinde gözlemlenmektedir. Kış aylarında şehir içlerinde daha yaygınken, yaz aylarında orman içlerine giderler.



Dağ İspinozu

Brambling
Fringilla montifringilla

Kanat Açıklığı
23-26 cm

Boy
13-16 cm

Ağırlık
18-30 gr

Özellikleri

Üreme dönemindeki erkeğin başı ve sırtı simsiyah, kanat örtülerinin bir kısmı ve göğsü koyu turuncudur. Böğründeki büyük siyah noktalar dikkat çeker. Dişisi daha soluk ve kahverengidir. Üreme dışı döneminde erkeği dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Ormanlar, orman açıklıkları, tarım arazileri ve açık arazilerde görülür.

Beslenme

Tohumlar, meyveler ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göçü ile kış döneminde genellikle koruluk, bahçelik ve ormanlık alanlarda, ayrıca tarım alanlarında gözlemlenmektedir.



Kocabaş

Hawfinch
Coccothraustes coccothraustes

Kanat Açıklığı
29-33 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
48-62 gr

Özellikleri

Alanda görülen en büyük ispinoz türüdür. İsmini oldukça büyük olan başından alır. Güçlü ve iri bir gagası vardır. Tepesi, kulak örtüleri ve kuyruk sokumu turuncu, göz pınarı ve gıdısı siyah, sırtı kızıl renktedir.

Yaşam Alanları

Karışık ormanlar, park ve korular gibi çeşitli ağaçlık alanlarda görülür.

Beslenme

Meyveler, tohumlar ve böcekler ile beslenir. Güçlü gagası ile oldukça sert ve kalın meyve çekirdeklerini bile kırabilir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca ağaçlık alanlarda görülebilen bu türün sayıları göç ve kış dönemlerinde yükselmektedir.



Çütre

Common Rosefinch
Carpodacus erythrinus

Kanat Açıklığı
19-24 cm

Boy
14-15 cm

Ağırlık
19-33 gr

Özellikleri

Kalın gagalı, serçe boyutlarında bir kuştur. Erkeği koyu kırmızı başı, göğsü ve kuyruk sokumu ile başka hiçbir türle karıştırılmaz. Çift kanat çizgisi dikkat çeker. Dişisi ve genci kahverengidir; göğsü ve böğrü çizgilidir.

Yaşam Alanları

Nemli çayırlar, nehir kenarları ve ormanlarda görülür.

Beslenme

Yılın çoğunluğunda tohumlar ile beslenen çütre, üreme zamanı böcekleri ve böcek larvalarını da tüketir.

Görüldüğü Dönem

Mayıs ayında göç ederken az sayıda veya haziran ve temmuz aylarında çok seyrek olarak Beykoz ormanlarında ve korularında rastlanabilir.



Florya

European Greenfinch
Chloris chloris

Kanat Açıklığı
25-28 cm

Boy
15-16 cm

Ağırlık
25-34 gr

Özellikleri

Büyük ve kalın gagalı, iri bir ispinozdur. Erkeğinin alt tarafı sarımsı yeşil, üst tarafı ve tepesi yosun yeşili, yanakları gridir. El teleklerinin kenarları ve kuyruk kökü sarıdır. Dişisi daha soluk renklidir. Genci oldukça çizgilidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, parklar, korular, bahçelerde görülür.

Beslenme

Tohumlar, meyveler ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'da yıl boyunca, özellikle ibreli ağaçların bulunduğu alanlarda düzenli olarak gözlemlenmektedir.



Ketenkuşu

Common Linnet
Linaria cannabina

Kanat Açıklığı
21-25 cm

Boy
13-14 cm

Ağırlık
15-20 gr

Özellikleri

Kahverengi sırtı, gri başı, kızıl göğsü ve kanatlarında bulunan beyazlık ile rahatlıkla tanınır. Gagası gri, ayakları siyahtır. Dişilerin ve genç bireylerin göğsünde kızıllık yoktur ve sırtı ince, göğsü belirgin çizgilidir.

Yaşam Alanları

Makilikler, fundalıklar, ağaçlık açık araziler ve tarım alanlarında görülür.

Beslenme

Böcekler ve tohumlar ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Yıl boyunca, az sayıda, uygun habitata sahip alanlarda görülmektedir.



Çaprazgaga

Red Crossbill
Loxia curvirostra

Kanat Açıklığı
27-30 cm

Boy
14-20 cm

Ağırlık
23-45 gr

Özellikleri

İsmini de aldığı iç içe geçmiş, çapraz, özgün gagasıyla alanda görülen başka hiçbir tür ile karıştırılmaz. Erişkin erkeği parlak turuncudur ya da kırmızıdır. Dişisi yeşilimsi kahverengidir. Kahverengi olan genç bireyleri oldukça çizgili görülür.

Yaşam Alanları

İbreli ormanlar, korular ve parklarda görülür.

Beslenme

Göknar, ladin, çam gibi ağaçların kozalakları ile beslenmede uzmandır. Diğer bitkilerin tohumlarını da tüketir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde Toygartepe'de rastlanabilmektedir.



Saka

European Goldfinch
Carduelis carduelis

Kanat Açıklığı
21-25 cm

Boy
12-14 cm

Ağırlık
14-18 gr

Özellikleri

Çoğu kişi tarafından tanınan, ülkemizin en renkli ötücü kuşlarından birisidir. Başının ön kısmında kırmızı maskesi, kırmızı maskeyi çevreleyen beyaz yanağı ve gerdanı ile başının üstünden başlayan, enseye kadar ilerleyerek beyaz alanı çevreleyen siyah çerçevesi, kahverengi sırtı, beyaz karnı ile oldukça karakteristik bir türdür. Genç bireylerin kafasındaki kırmızı, siyah ve beyaz renklenme görülmez.

Yaşam Alanları

Ağaçlık alanlar, bozkırlar, bahçeler, orman açıklıkları, makilikler, sulak alan kenarlarında görülür.

Beslenme

Tohumlar, meyveler ve böcekler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Yerli olanlar ve göç edenler yıl boyunca Beykoz'da görülebilir. Sonbahar ve kış aylarında sayıları artar.



Küçük İskete

European Serin
Serinus serinus

Kanat Açıklığı
20-23 cm

Boy
10-12 cm

Ağırlık
10-14 gr

Özellikleri

Oldukça küçük ve kısa gagalı bir ispinoz türüdür. Alt tarafı sarı, üst tarafı yeşil üzerine koyu çizgilidir. Parlak sarı olan kuyruk sokumu göze çarpar. Kuyruk çatalı derindir. Erkeğinin başı ve göğsü sarıdır. Dişisi erkeğe göre daha soluk renklidir.

Yaşam Alanları

İbreli ormanlar, park ve bahçeler ile içerisinde ağaçlık alanlar bulunan açık arazilerde görülür.

Beslenme

Tohumlar, tomurcuklar, meyveler ve böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Az sayıda da olsa yıl boyunca Beykoz'un uygun tabiat alanlarında görülebilir. Göç dönemlerinde ve kışın görülme şansı daha yüksektir.



Karabaşlı İskete

Eurasian Siskin
Spinus spinus

Kanat Açıklığı
20-22 cm

Boy
11-12 cm

Ağırlık
10-14 gr

Özellikleri

Sivri gagalı, küçük bir ispinoz türüdür. Genel olarak sarı-siyah renklerdedir ve çizgili bir görünümü vardır. Kuyruk sokumu, kanat bandı ve kuyruğun dip kısımları sarıdır. Erkeğinin tepesi ve gıdısı siyah, yanakları, büyük örtü tüyleri ve alt tarafı sarıdır. Dişisi ve genci daha kahverengi ve çizgilidir.

Yaşam Alanları

Ormanlar, orman açıklıkları, çalılıklar ve açık arazilerde görülür.

Beslenme

Tohumlar, meyveler ve küçük böcekler ile beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış döneminde oldukça yaygın görülen bir tür olup, ilkbahar ve sonbahar göç döneminde de görülebilmektedir.



Tarla Çintesi

Corn Bunting
Emberiza calandra

Kanat Açıklığı
26-32 cm

Boy
18-19 cm

Ağırlık
38-55 gr

Özellikleri

Alandaki çinteler arasında en büyüğüdür. Kendine has olan gagası tıknaz ve kalındır. Üst tarafı kahverengi üzerine koyu çizgili, alt tarafı ise beyazımsıdır. Göğsü kalın, böğrü ince çizgilidir. Çoğu zaman bir tele, direğe veya çalının en üst dalına konmuş bir şekilde öterken görülür. Ötüşü tipiktir; şıkırdayan bir anahtarlığa benzer: 'tik-tik-tik, trililiririlili...'.

Yaşam Alanları

İçerisinde tek tük çalılık alanlar bulunan açık arazilerde, tarım alanlarında ve fundalıklarda görülür. Yuvasını yere yapar.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını yerde dolaşırken bulduğu tohumlar oluşturur. Ancak özellikle üreme döneminde diyetine böcekleri ve diğer küçük omurgasızları da dahil eder.

Görüldüğü Dönem

Beykoz'un uygun alanlarında yıl boyu gözlemlenmektedir.



Sarı Çinte

Yellowhammer
Emberiza citrinella

Kanat Açıklığı
23-29 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
24-31 gr

Özellikleri

Sarı, kızıl ve yeşil renklerde, uzun kuyruklu, serçeden küçük bir ötücüdür. Erkeğin başı ve karnı sarı, sırtı kızıl kahverengidir ve kuyruk sokumu kızıldır. Dişisinin başındaki sarı alan erkeğe göre daha küçüktür veya yoktur. Genci dişisine benzer. Özellikle genç bireyler sık sık bahçe çintesi ile karıştırılır. Kızıl kahverengi kuyruk sokumu ve primer kenarlarının sarı olması ile bahçe çintesinden rahatlıkla ayırt edilir.

Yaşam Alanları

Orman açıklıkları, tarım arazileri, fundalıklar ve çayırlarda görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını tohumlar oluşturur. Özellikle üreme zamanında böcekler ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

Kış göçmeni olan bu kuşu, kış aylarında ve göç dönemlerinde özellikle Riva çayırlarında ve diğer açık arazilerde gözlemlemek mümkündür.



Bahçe Çintesi

Cirl Bunting
Emberiza cirlus

Kanat Açıklığı
17-25 cm

Boy
15-17 cm

Ağırlık
18-24 gr

Özellikleri

Gagası kalın ve köşelidir. Erkeği sarı-siyah yüzü ve siyah boğazı ile rahatlıkla tanınır. Tepesi, ensesi, göğsünün üst tarafı ve kuyruk sokumu zeytini yeşildir. Sırtı, omuz örtüleri, göğsünün alt tarafı ve böğrü kızıl-kahverengidir. Boğazı ile göğsü arasında açık sarı bir şerit bulunur. Dişisi ve genci daha sade görünümlüdür ve sarı çintenin aynı formdaki bireyleri ile karıştırılır. Zeytini yeşil kuyruk sokumu ile ondan rahatlıkla ayırt edilebilir.

Yaşam Alanları

Çalılık araziler, fundalıklar, orman açıklıkları, bahçeler, tarım arazilerinin yakınlarında bulunan ağaç ve çalılar.

Beslenme

Diyetini tohumlar, küçük böcekler ve küçük omurgasızlar oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Yerli bir türdür. Yıl boyunca Beykoz'da uygun habitatlara sahip alanlarda gözlemlenmektedir.



Kirazkuşu

Ortolan Bunting
Emberiza hortulana

Kanat Açıklığı
22-26 cm

Boy
16-17 cm

Ağırlık
19-27 gr

Özellikleri

Üreme dönemindeki erkeğin bıyıkları ve boğazı sarı, başı ve göğsünün üst tarafı gri, alt tarafı kızıl renktedir. Gagası ve bacakları pembedir. Dişisi erkeğe göre daha soluk renklidir; bıyığı ve boğazı daha açık sarı, göğsü ve böğrü çizgili, alt tarafı soluk kızıldır. Genci dişisine benzer.

Yaşam Alanları

Makilikler, çalılık alanlar ve çeşitli ağaçlık alanlarda görmek mümkündür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını tohumlar oluşturur. Ancak özellikle üreme döneminde böcekler ve böcek larvaları ile de beslenmektedir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar ve sonbahar göç döneminde daha sık ve yüksek sayılarda, yaz aylarında ise daha seyrek olarak Beykoz'un fundalık alanlarında gözlemlenmektedir.



Karabaşlı Çinte

Black-headed Bunting
Emberiza melanocephala

Kanat Açıklığı
23-29 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
23-33 gr

Özellikleri

Erkeği üreme döneminde başka hiçbir tür ile karıştırılmaz; siyah başı, kızıl sırtı ve sapsarı alt tarafı dikkat çekicidir. Dişisi erkeğe göre daha soluk renklidir; alt tarafı açık sarı, sırtı ve başı kahverengidir. Genci ve kış formundaki erişkin dişinin başı çizgilidir.

Yaşam Alanları

Tarlalar, bozkırlar, ağaçlık açık araziler, çalılıklar ve makiliklerde görülür.

Beslenme

Diyetinin önemli bir kısmını tohumlar oluşturur. Ancak özellikle üreme döneminde böcekler ile de beslenir.

Görüldüğü Dönem

İlkbahar göç döneminde ve yaz döneminde fundalık alanlarda görülür. Ağustos ayında erkenden göç eder.



Bataklık Çintesi

Common Reed Bunting
Emberiza schoeniclus

Kanat Açıklığı
23-25 cm

Boy
16-18 cm

Ağırlık
16-25 gr

Özellikleri

Üreme dönemindeki erkeğinin başı, boğazı ve göğsünün üst tarafı simsiyah, bıyığı ve boyun halkası bembeyazdır. Sırtı ve kanatları kızıl kahverengi ve siyahtır. Göğüs kenarında ve böğründe belli belirsiz ince çizgiler vardır. Kışın daha sade görünümlüdür. Başındaki ve boğazındaki siyahlık kaybolur. 1.kışındaki erkeği gri kuyruk sokumu ile dişisinden ayırt edilir. Dişisi erkeğin kış formuna benzer. Kuyruk sokumu kahverengidir. Göğsü ve böğründeki kızıl-kahverengi çizgiler belirgindir.

Yaşam Alanları

Bataklık ve sazlık alanlar, göller ve sulak alanların etrafında görülebilirler.

Beslenme

Tohumlar, omurgasızlar ve bazı bitkiler diyetini oluşturur.

Görüldüğü Dönem

Kış göçmeni bir tür olup kasım-şubat ayları arasında uygun ortamlarda gözlemlenmektedir.

Beykoz'da Kaydı Olan Diğer Kuş Türleri

Beykoz ilçe sınırları içerisinde nispeten az sayıda görülen (nadir) veya göç sırasında rastlantısal olarak alana uğramış kuş türleri de mevcuttur. Gelecek yıllarda kuş fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi sayısının artmasıyla aşağıda listesi verilmiş olan kuş türleri haricinde, yeni kayıtların da gerçekleşmesi mümkündür.





	Türkçe	İngilizce	Latince
1	Ak Çaylak	Black-winged Kite	*Elanus caeruleus*
2	Akgözlü Ötleğen	Eastern Orphean Warbler	*Sylvia crassirostris*
3	Akkuyruklu Kartal	White-tailed Eagle	*Haliaeetus albicilla*
4	Aksırtlı Ağaçkakan	White-backed Woodpecker	*Dendrocopos leucotos*
5	Alaca Kuyrukkakan	Pied Wheatear	*Oenanthe pleschanka*
6	Bıldırcınkılavuzu	Corn Crake	*Crex crex*
7	Bıyıklı Doğan	Lanner Falcon	*Falco biarmicus*
8	Bıyıklı Kamışçın	Moustached Warbler	*Acrocephalus melanopogon*
9	Büyük Karabaş Martı	Pallas's Gull	*Ichthyaetus ichthyaetus*
10	Büyük Karasırtlı Martı	Greater Black-backed Gull	*Larus marinus*
11	Çalı Bülbülü	Rufuos-tailed Scrub Robin	*Cercotrichas galactotes*
12	Çalıkuşu Çıvgını	Pallas's Leaf Warbler	*Phylloscopus proregulus*
13	Çöl Kuyrukkakanı	Desert Wheatear	*Oenanthe deserti*
14	Çulhakuşu	Eurasian Penduline Tit	*Remiz pendulinus*
15	Gülen Sumru	Gull-billed Tern	*Gelochelidon nilotica*
16	İpekkuyruk	Bohemian Waxwing	*Bombycilla garrulus*
17	Kara akbaba	Cinereous Vulture	*Aegypius monachus*
18	Kara Kızılbacak	Spotted Redshank	*Tringra erythropus*
19	Karaayaklı Martı	Black-legged Kittiwake	*Rissa tridactyla*
20	Kaya Çintesi	Rock Bunting	*Emberiza cia*
21	Kaya Kartalı	Golden Eagle	*Aquila chrysaetos*
22	Kaya Serçesi	Rock Sparrow	*Petronia petronia*
23	Kılıçgaga	Pied Avocet	*Recurvirostra avocetta*
24	Kır Baykuşu	Short-eared Owl	*Asio flammeus*
25	Kızıl Çaylak	Red Kite	*Milvus milvus*
26	Kızıl Kirazkuşu	Cretzschmar's Bunting	*Emberiza caesia*
27	Kızıl Kumkuşu	Curlew Sandiper	*Calidris ferruginea*
28	Kızılboyunlu Batağan	Red-necked Grebe	*Podiceps grisegena*
29	Kocagöz	Eurasian Stone Curlew	*Burhinus oedicnemus*
30	Korsanmartı	Parasitic Jaeger	*Stercorarius parasiticus*
31	Kulaklı Batağan	Horned Grebe	*Podiceps auritus*
32	Kuzey Gümüş Martısı	European Herring Gull	*Larus argentatus*
33	Küçük Suçulluğu	Jack Snipe	*Lymnocryptes minimus*
34	Küçük Sumru	Little Tern	*Sternula albifrons*
35	Macar Ördeği	Red-crested Pochard	*Netta rufina*
36	Mahmuzlu İncirkuşu	Richard's Pipit	*Anthus richardi*
37	Mavigerdan	Bluethroat	*Luscinia svecica*
38	Mezgeldek	Little Bustard	*Tetrax tetrax*
39	Ötücü Kuğu	Whooper Swan	*Cygnus cygnus*
40	Pasbaş Patka	Ferruginous Pochard	*Aythya nyroca*
41	Peçeli Baykuş	Western Barn Owl	*Tyto Alba*
42	Poyrazkuşu	Eurasian Oystercatcher	*Haematopus ostralegus*
43	Pufla	Common Eider	*Somateria mollissima*
44	Sakallı Akbaba	Bearded Vulture	*Gypaetus barbatus*
45	Sakarca	Greater White-fronted Goose	*Anser albifrons*
46	Sarıbacaklı Kumkuşu	Temminck's Sandpiper	*Calidris temminckii*
47	Sarıkaşlı Çıvgın	Yellow-browed Warbler	*Phylloscopus inornatus*
48	Sürmeli Kervançulluğu	Whimbrel	*Numenius phaeopus*
49	Sürmeli Kumkuşu	Broad-billed Sandpiper	*Calidris falcinellus*
50	Şakrak	Eurasian Bullfinch	*Pyrrhula pyrrhula*
51	Taşkızılı	Common Rock Thrush	*Monticola saxatilis*
52	Tepeli Guguk	Great Spotted Cuckoo	*Clamator glandarius*
53	Toy	Great Bustard	*Otis tarda*
54	Ulu Doğan	Saker Falcon	*Falco cherrug*
55	Yeşil Arıkuşu	Blue-cheeked Bee-eater	*Merops persicus*

Türlerin Listesi ve Koruma Durumu

IUCN Kırmızı liste kategorileri türlerin tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ve nüfus dağılım kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

LC (Least Concern - Düşük Riskli): Geniş yayılışlı ve nüfusu yüksek olan popülasyonları ifade eder.

NT (Near Threatened - Tehdide Yakın): Kritik tehlikede ya da duyarlı sınıfına girmeyen fakat yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanması olasılığı olan popülasyonları ifade eder.

VU (Vulnerable - Duyarlı/Hassas): Neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu popülasyonları ifade eder.

EN (Endangered - Tehlikede): Neslinin doğada tükenme riskinin aşırı yüksek olduğu popülasyonları ifade eder.

	Takım	Bilimsel Adı	İngilizce Adı	Türkçe Adı	İUCN
1	*GALLIFORMES / TAVUKSULAR*	*Coturnix coturnix*	Common Quail	Bıldırcın	LC
2		*Phasianus colchicus*	Common Pheasant	Sülün	LC
3	*ANSERİFORMES / KAZSILAR*	*Cygnus olor*	Mute Swan	Kuğu	LC
4		*Cygnus cygnus*	Whooper Swan	Ötücü Kuğu	LC
5		*Anser albifrons*	Greater White-fronted Goose	Sakarca	LC
6		*Tadorna tadorna*	Common Shelduck	Suna	LC
7		*Spatula querquedula*	Garganey	Çıkrıkçın	LC
8		*Spatula clypeata*	Northern Shoveler	Kaşıkgaga	LC
9		*Mareca strepera*	Gadwall	Boz Ördek	LC
10		*Mareca penelope*	Eurasian Wigeon	Fiyu	LC
11		*Anas platyrhynchos*	Mallard	Yeşilbaş	LC
12		*Anas acuta*	Northern Pintail	Kılkuyruk	LC
13		*Anas crecca*	Eurasian Teal	Çamurcun	LC
14		*Netta rufina*	Red-crested Pochard	Macar Ördeği	LC
15		*Aythya nyroca*	Ferruginous Pochard	Pasbaş Patka	**NT**
16		*Aythya ferina*	Common Pochard	Elmabaş Patka	**VU**
17		*Aythya fuligula*	Tufted Duck	Tepeli Patka	LC
18		*Somateria mollissima*	Common Eider	Pufla	**NT**
19	*CAPRIMULGIFORMES / ÇOBANALDATANLAR*	*Caprimuulgus europaeus*	European Nightjar	Çobanaldatan	LC
20	*APODIFORMES / EBABİLLER*	*Apus apus*	Common Swift	Ebabil	LC
21		*Apus pallidus*	Pallid Swift	Boz Ebabil	LC
22		*Tachymarptis melba*	Alpine Swift	Akkarınlı Ebabil	LC
23	*OTIDIFORMES / TOYLAR*	*Otis tarda*	Great Bustard	Toy	**VU**
24		*Tetrax tetrax*	Little Bustard	Mezgeldek	**NT**
25	*CUCULIFORMES / GUGUKKUŞLARI*	*Cuculus canorus*	Common Cuckoo	Guguk	LC
26		*Clamator glandarius*	Great Spotted Cuckoo	Tepeli Guguk	LC
27	*COLUMBIFORMES / GÜVERCİNLER*	*Columba livia*	Rock Pigeon	Kaya Güvercini	LC
28		*Columba palumbus*	Wood Pigeon	Tahtalı	LC
29		*Columba oenas*	Stock Dove	Gökçe Güvercin	LC
30		*Streptopelia turtur*	Eurasian Turtle Dove	Üveyik	**VU**
31		*Streptopelia decaocto*	Eurasian Collared Dove	Kumru	LC
32		*Spilopelia senegalensis*	Laughing Dove	Küçük Kumru	LC
33	*GRUIFORMES / YELVELER VE TURNALAR*	*Rallus aquaticus*	Water Rail	Sukılavuzu	LC
34		*Crex crex*	Corn Crake	Bıldırcınkılavuzu	LC
35		*Porzana parva*	Little Crake	Bataklık Suyelvesi	LC
36		*Porzana porzana*	Spotted Crake	Benekli Suyelvesi	LC
37		*Gallinula chloropus*	Common Moorhen	Sutavuğu	LC
38		*Fulica atra*	Eurasian Coot	Sakarmeke	LC
39		*Grus grus*	Common Crane	Turna	LC
40	*PODICIPEDIFORMES / BATAĞANLAR*	*Tachybaptus ruficollis*	Little Grebe	Küçük Batağan	LC
41		*Podiceps cristatus*	Great Crested Grebe	Bahri	LC

42		*Podiceps nigricollis*	Black-necked Grebe	Karaboyunlu Batağan	LC
43		*Podiceps auritus*	Horned Grebe	Kulaklı Batağan	**VU**
44		*Podiceps grisegana*	Red-necked Grebe	Kızılboyunlu Batağan	LC
45	*CHARADRIIFORMES / YAĞMURKUŞLARI*	*Himantopus himantopus*	Black-winged Stilt	Uzunbacak	LC
46		*Recurvirostra avocetta*	Pied Avocet	Kılıçgaga	LC
47		*Burhinus oedicnemus*	Eurasian Stone Curlew	Kocagöz	LC
48		*Haematopus ostralegus*	Eurasian Oystercatcher	Poyrazkuşu	**NT**
49		*Vanellus vanellus*	Northern Lapwing	Kızkuşu	**NT**
50		*Pluvialis apricaria*	European Golden Plover	Altın Yağmurcun	LC
51		*Pluvialis squatarola*	Grey Plover	Gümüş Yağmurcun	LC
52		*Charadrius hiaticula*	Common Ringed Plover	Halkalı Cılıbıt	LC
53		*Charadrius dubius*	Little Ringed Plover	Halkalı Küçük Cılıbıt	LC
54		*Charadrius morinellus*	Eurasian Dotterel	Dağ Cılıbıtı	LC
55		*Numenius phaeopus*	Whimbrel	Sürmeli Kervançulluğu	LC
56		*Numenius arquata*	Eurasian Curlew	Kervançulluğu	**NT**
57		*Limosa limosa*	Black-tailed Godwit	Çamurçulluğu	**NT**
58		*Calidris pugnax*	Ruff	Döğüşkenkuş	LC
59		*Calidris alpina*	Dunlin	Karakarınlı Kumkuşu	LC
60		*Calidris ferruginea*	Curlew Sandpiper	Kızıl Kumkuşu	**NT**
61		*Calidris falcinellus*	Broad-billed Sandpiper	Sürmeli Kumkuşu	LC
62		*Calidris temminckii*	Temminck's Sandpiper	Sarıbacaklı Kumkuşu	LC
63		*Calidris minuta*	Little Stintt	Küçük Kumkuşu	LC
64		*Scolopax rusticola*	Eurasian Woodcock	Çulluk	LC
65		*Gallinago gallinago*	Common Snipe	Suçulluğu	LC
66		*Lymnocryptes minimus*	Jack Snipe	Küçük suçulluğu	LC
67		*Actitis hypoleucos*	Common Sandpiper	Dere Düdükçünü	LC
68		*Tringa ochropus*	Green Sandpiper	Yeşil Düdükçün	LC
69		*Tringa glareola*	Wood Sandpiper	Orman Düdükçünü	LC
70		*Tringa totanus*	Common Redshank	Kızılbacak	LC
71		*Tringa erythropus*	Spotted Redshank	Kara Kızılbacak	LC
72		*Tringa stagnatilis*	Marsh Sandpiper	Bataklık düdükçünü	LC
73		*Tringa nebularia*	Common Greenshank	Yeşilbacak	LC
74		*Glareola pratincola*	Collared Pratincole	Bataklıkkırlangıcı	LC
75		*Stercorarius parasiticus*	Parasitic Jaeger	Korsanmartı	LC
76		*Chroicocephalus genei*	Slender-billed Gull	İncegagalı Martı	LC
77		*Chroicocephalus ridibundus*	Black-headed Gull	Karabaş Martı	LC
78		*Hydrocoloeus minutus*	Little Gull	Küçük Martı	LC
79		*Ichthyaerus melanocephalus*	Mediterranean Gull	Akdeniz Martısı	LC
80		*Ichthyaerus ichthyaerus*	Pallas's Gull	Büyük Karabaş Martı	LC
81		*Rissa tridactyla*	Black-legged Kittiwake	Karaayaklı Martı	**VU**
82		*Larus canus*	Mew Gull	Küçük Gümüş Martı	LC
83		*Larus cachinnas*	Caspian Gull	Hazar Martısı	LC
84		*Larus michahellis*	Yellow-legged Gull	Gümüş Martı	LC
85		*Larus argentatus*	European Herring Gull	Kuzey Gümüş Martısı	LC
86		*Larus fuscus*	Lesser Black-backed Gull	Karasırtlı Martı	LC
87		*Larus marinus*	Greater Black-backed Gull	Büyük Karasırtlı Martı	LC
88		*Thalasseus sandvicensis*	Sandwich Tern	Karagagalı Sumru	LC

89		*Gelochelidon nilotica*	Gull-billed Tern	Gülen Sumru	LC
90		*Sterna hirundo*	Common Tern	Sumru	LC
91		*Sternula albifrons*	Little Tern	Küçük Sumru	LC
92		*Chlidonias hybrida*	Whiskered Tern	Bıyıklı Sumru	LC
93		*Chlidonias leucopterus*	White- winged Tern	Akkanatlı Sumru	LC
94		*Chlidonias niger*	Black Tern	Kara Sumru	LC
95	*GAVIIFORMES / DALGIÇ KUŞLARI*	*Gavia arctica*	Black-throated Loon	Karagerdanlı Dalgıç	LC
96	*PROCELLARIIFORMES / TÜPBURUNLULAR*	*Puffinus yelkouan*	Yelkouan shearwater	Yelkovan	**VU**
97	*CICONIIFORMES / LEYLEKSİLER*	*Ciconia ciconia*	White Stork	Leylek	LC
98		*Ciconia nigra*	Black Stork	Kara Leylek	LC
99	*SULIFORMES / SÜMSÜKKUŞLARI*	*Microcarbo pygmeus*	Pygmy Cormorant	Küçük Karabatak	LC
100		*Phalacrocorax aristotelis*	European Shag	Tepeli Karabatak	LC
101		*Phalacrocorax carbo*	Great Cormorant	Karabatak	LC
102	*PELECANIFORMES / PELİKANSILAR*	*Plegadis falcinellus*	Glossy Ibis	Çeltikçi	LC
103		*Platalea leucorodia*	Eurasian Spoonbill	Kaşıkçı	LC
104		*Botaurus stellaris*	Eurasian Bittern	Balaban	LC
105		*Ixobrychus minutus*	Little Bittern	Küçük Balaban	LC
106		*Nycticorax nycticorax*	Black-crowned Night Heron	Gece Balıkçılı	LC
107		*Ardeola ralloides*	Squacco Heron	Alaca Balıkçıl	LC
108		*Bubulcus Ibis*	Western Cattle Egret	Sığır Balıkçılı	LC
109		*Ardea cinerea*	Grey Heron	Gri Balıkçıl	LC
110		*Ardea purpurea*	Purple Heron	Erguvani Balıkçıl	LC
111		*Ardea alba*	Great Egreet	Büyük Ak Balıkçıl	LC
112		*Egretta garzetta*	Little Egret	Küçük Ak Balıkçıl	LC
113		*Pelecanus onocrotalus*	Great White Pelikan	Ak Pelikan	LC
114	ACCIPITRIFORMES / GÜNDÜZ YIRTICILARI	*Pandion haliaetus*	Western Osprey	Balık Kartalı	LC
115		*Elanus caeruleus*	Black-winged Kite	Ak Çaylak	LC
116		*Gypaetus barbatus*	Bearded Vulture	Sakallı Akbaba	**NT**
117		*Gyps fulvus*	Griffon Vulture	Kızıl Akbaba	LC
118		*Aegypius monachus*	Cinereous Vulture	Kara Akbaba	**NT**
119		*Neophron percnopterus*	Egyptian Vulture	Küçük Akbaba	**EN**
120		*Circaetus gallicus*	Short-toed Snake Eagle	Yılan Kartalı	LC
121		*Hieraaetus pennatus*	Booted Eagle	Küçük Kartal	LC
122		*Haliaeetus albicilla*	White-tailed Eagle	Akkuyruklu Kartal	LC
123		*Clanga pomarina*	Lesser Spotted Eagle	Küçük Orman Kartalı	LC
124		*Clanga clanga*	Greater Spotted Eagle	Büyük Orman Kartalı	**VU**
125		*Aquila heliaca*	Eastern Imperial Eagle	Şah Kartalı	**VU**
126		*Aquila nipalensis*	Steppe Eagle	Bozkır Kartalı	**EN**
127		*Aquila chrysaetos*	Golden Eagle	Kaya Kartalı	LC
128		*Buteo buteo*	Common Buzzard	Şahin	LC
129		*Buteo rufinus*	Long-legged Buzzard	Kızıl Şahin	LC
130		*Buteo lagopus*	Rough-legged Buzzard	Paçalı Şahin	LC
131		*Pernis apivorus*	European Honey Buzzard	Arı Şahini	LC
132		*Circus aeruginosus*	Western Marsh Harrier	Saz Delicesi	LC

133		*Circus cyaneus*	Hen Harrier	Gökçe Delice	LC
134		*Circus pygargus*	Montagu's Harrier	Çayır Delicesi	LC
135		*Circus macrourus*	Pallid Harrier	Bozkır Delicesi	**NT**
136		*Milvus milvus*	Red Kite	Kızıl Çaylak	**NT**
137		*Milvus migrans*	Black Kite	Kara Çaylak	LC
138		*Accipiter breviper*	Levant Sparrowhawk	Yaz Atmacası	LC
139		*Accipiter nisus*	Eurasian Sparrowhawk	Atmaca	LC
140		*Accipiter gentilis*	Northern Goshawk	Çakırkuşu	LC
141	*STRIGIFORMES / BAYKUŞLAR*	*Asio otus*	Long-eared Owl	Kulaklı Orman Baykuşu	LC
142		*Asio flammeus*	Short-eared Owl	Kır Baykuşu	LC
143		*Tyto alba*	Western Barn Owl	Peçeli Baykuş	LC
144		*Otus scops*	Eurasian Scops Owl	İshakkuşu	LC
145		*Strix aluco*	Tawny Owl	Alaca Baykuş	LC
146		*Athene noctua*	Little Owl	Kukumav	LC
147	*BUCEROTIFORMES / BOYNUZGAGALAR*	*Upupa epops*	Eurasian Hoopoe	İbibik	LC
148	*CORACIIFORMES / GÖKKUZGUNLAR*	*Coracias garrulus*	European Roller	Gökkuzgun	LC
149		*Alcedo atthis*	Common Kingfisher	Yalıçapkını	LC
150		*Merops apiaster*	European Bee-eater	Arıkuşu	LC
151		*Merops persicus*	Blue-cheeked Bee-eater	Yeşil Arıkuşu	LC
152	*PICIFORMES / AĞAÇKAKANLAR*	*Jynx torquilla*	Eurasian Wryneck	Boyunçeviren	LC
153		*Dendrocopos syriacus*	Syrian Woodpecker	Alaca Ağaçkakan	LC
154		*Dendrocopos major*	Great Spotted Woodpecker	Orman Alaca Ağaçkakanı	LC
155		*Dendrocopos leucotos*	White-backed Woodpecker	Aksırtlı Ağaçkakan	LC
156		*Drybates minor*	Lesser Spotted Woodpecker	Küçük Ağaçkakan	LC
157		*Dendrocoptes medius*	Middle Spotted Woodpecker	Ortanca Ağaçkakan	LC
158		*Picus canus*	Grey-headed Woodpecker	Küçük Yeşil Ağaçkakan	LC
159		*Picus viridis*	Green Woodpecker	Yeşil Ağaçkakan	LC
160	*FALCONIFORMES / DOĞANLAR*	*Falco naumanni*	Lesser Kestrel	Küçük Kerkenez	LC
161		*Falco tinnunculus*	Common Kestrel	Kerkenez	LC
162		*Falco vespertinus*	Red-footed Falcon	Ala Doğan	**NT**
163		*Falco eleonorae*	Eleonora's Falcon	Ada Doğanı	LC
164		*Falco columbarius*	Merlin	Bozdoğan	LC
165		*Falco subbuteo*	Eurasian Hobby	Delice Doğan	LC
166		*Falco peregrinus*	Peregrine Falcon	Gökdoğan	LC
167		*Falco biarmicus*	Lanner Falcon	Bıyıklı Doğan	LC
168		*Falco cherrug*	Saker Falcon	Ulu Doğan	**EN**
169	*PSITTACIFORMES / PAPAĞANLAR*	*Psittacula krameri*	Rose-ringed Parakeet	Yeşil Papağan	LC
170		*Psittacula eupatria*	Alexandrine Parakeet	İskender Papağanı	**NT**
171	*PASSERIFORMES / ÖTÜCÜ (TÜNEYEN) KUŞLAR*	*Lanius collurio*	Red-backed Shrike	Kızılsırtlı Örümcekkuşu	LC
172		*Lanius senator*	Woodchat Shrike	Kızılbaşlı Örümcekkuşu	LC
173		*Lanius nubicus*	Masked Shrike	Maskeli Örümcekkuşu	LC
174		*Lanius minor*	Lesser Grey Shrike	Karaalınlı Örümcekkuşu	LC
175		*Lanius excubitor*	Great Grey Shrike	Büyük Örümcekkuşu	LC

176		*Oriolus oriolus*	Eurasian Golden Oriole	Sarıasma	LC
177		*Garrulus glandarius*	Eurasian Jay	Alakarga	LC
178		*Pica pica*	Eurasian Magpie	Saksağan	LC
179		*Coloeus modedula*	Western Jackdaw	Küçük Karga	LC
180		*Corvus frugilegus*	Rook	Ekin Kargası	LC
181		*Corvus cornix*	Hooded Crow	Leş Kargası	LC
182		*Corcus corax*	Northern Raven	Kuzgun	LC
183		*Bombycilla garrulus*	Bohemian Waxwing	İpekkuyruk	LC
184		*Cyanistes caerulues*	Blue Tit	Mavi Baştankara	LC
185		*Parus major*	Great Tit	Büyük Baştankara	LC
186		*Periparus ater*	Coal Tit	Çam Baştankarası	LC
187		*Poecile palustris*	Marsh Tit	Kayın Baştankarası	LC
188		*Aegithalos caudatus*	Long-tailed Tit	Uzunkuyruklu Baştankara	LC
189		*Remiz pendulinus*	Eurasian Penduline Tit	Çulhakuşu	LC
190		*Lullula arborea*	Woodlark	Orman Toygarı	LC
191		*Alauda arvensis*	Eurasian Skylark	Tarlakuşu	LC
192		*Galerida cristata*	Crested Lark	Tepeli Toygar	LC
193		*Calandrella brachydactyla*	Greater Short-toed Lark	Bozkır Toygarı	LC
194		*Melanocorypha calandra*	Calandra Lark	Boğmaklı Toygar	LC
195		*Riparia riparia*	Sand Martin	Kum Kırlangıcı	LC
196		*Hirundo rustica*	Barn Swallow	Kır Kırlangıcı	LC
197		*Delichon urbicum*	Common House Martin	Ev Kırlangıcı	LC
198		*Cecropis daurica*	Red-rumped Swallow	Kızıl Kırlangıç	LC
199		*Cettia cetti*	Cetti's Warbler	Kamışbülbülü	LC
200		*Phylloscopus collybita*	Common Chiffchaff	Çıvgın	LC
201		*Phylloscopus trochilus*	Willow Warbler	Söğütbülbülü	LC
202		*Phylloscopus sibilatrix*	Wood Warbler	Orman Çıvgını	LC
203		*Phylloscopus proregulus*	Pallas's Leaf Warbler	Çalıkuşu Çıvgını	LC
204		*Phylloscopus inornatus*	Yellow-browed Warbler	Sarıkaşlı Çıvgın	LC
205		*Acrocephalus arundinaceus*	Great Reed Warbler	Büyük Kamışçın	LC
206		*Acrocephalus palustris*	Marsh Warbler	Çalı Kamışçını	LC
207		*Acrocephalus scirpaceus*	Eurasian Reed Warbler	Saz Kamışçını	LC
208		*Acrocephalus melanopogon*	Moustached Warbler	Bıyıklı Kamışçın	LC
209		*Acrocephalus schoenobaenus*	Sedge Warbler	Kındıra Kamışçını	LC
210		*Locustella luscinioides*	Savi's Warbler	Bataklık Kamışçını	LC
211		*Iduna pallida*	Eastern Olivaceous Warbler	Ak Mukallit	LC
212		*Hippolais icterina*	Icterine Warbler	Sarı Mukallit	LC
213		*Sylvia atricapilla*	Blackcap	Karabaşlı Ötleğen	LC
214		*Sylvia borin*	Garden Warbler	Boz Ötleğen	LC
215		*Slyvia communis*	Common Whitethroat	Akgerdanlı Ötleğen	LC
216		*Sylvia curruca*	Lesser Whitethroat	Küçük Akgerdanlı Ötleğen	LC
217		*Sylvia crassirostris*	Eastern Orphean Warbler	Akgözlü Ötleğen	LC
218		*Sylvia melanocephala*	Sardinian Warbler	Maskeli Ötleğen	LC
219		*Sylvia nisoria*	Barred Warbler	Çizgili Ötleğen	LC
220		*Regulus regulus*	Goldcrest	Çalıkuşu	LC
221		*Regulus ignicapilla*	Common Firecrest	Sürmeli Çalıkuşu	LC
222		*Troglodytes troglodytes*	Eurasian Wren	Çitkuşu	LC

223		*Sitta europaea*	Eurasian Nuthatch	Sıvacı	LC
224		*Certhia brachydactyla*	Short-toed Treecreeper	Bahçe Tırmaşıkkuşu	LC
225		*Sturnus vulgaris*	Common Starling	Sığırcık	LC
226		*Pastor roseus*	Rosy Starling	Alasığırcık	LC
227		*Turdus merula*	Blackbird	Karatavuk	LC
228		*Turdus pilaris*	Fieldfire	Tarla Ardıcı	LC
229		*Turdus iliacus*	Redwing	Kızıl Ardıç	**NT**
230		*Turdus philomeles*	Song Thrush	Öter Ardıç	LC
231		*Turdus viscivorus*	Mistle Thrush	Ökse Ardıcı	LC
232		*Turdus torquatus*	Ring Ouzel	Boğmaklı Ardıç	LC
233		*Cercotrichas galactotes*	Rufuos-tailed Scrub Robin	Çalı Bülbülü	LC
234		*Muscicapa streata*	Spotted Flycatcher	Benekli Sinekkapan	LC
235		*Fidecula albicollis*	Collared Flycatcher	Halkalı Sinekkapan	LC
236		*Ficedula hypoleuca*	European Pied Flycatcher	Kara Sinekkapan	LC
237		*Fidecula semitorquata*	Semicollared Flycatcher	Alaca Sinekkapan	LC
238		*Ficedula parva*	Red-breasted Flycatcher	Küçük Sinekkapan	LC
239		*Erithacus rubecola*	European Robin	Kızılgerdan	LC
240		*Luscinia svecica*	Bluethroat	Mavigerdan	LC
241		*Luscinia megarhynchos*	Common Nightingale	Bülbül	LC
242		*Luscinia luscinia*	Thrush Nightingale	Benekli Bülbül	LC
243		*Phoenicurus phoenicurus*	Common Redstart	Kızılkuyruk	LC
244		*Phoenicurus ochuros*	Black Redstart	Kara Kızılkuyruk	LC
245		*Monticola saxatilis*	Common Rock Thrush	Taşkızılı	LC
246		*Saxicola rubetra*	Whinchat	Çayır Taşkuşu	LC
247		*Saxicola rubicola*	European Stonechat	Taşkuşu	LC
248		*Saxicola maurus*	Siberian Stonechat	Sibirya Taşkuşu	
249		*Oenanthe oenanthe*	Northern Wheatear	Kuyrukkakan	LC
250		*Oenanthe isabellina*	Isabelline Wheatear	Boz Kuyrukkakan	LC
251		*Oenanthe melanoleuca*	Eastern Black-eared Wheatear	Karakulaklı Kuyrukkakan	LC
252		*Oenanthe pleschanka*	Pied Wheatear	Alaca Kuyrukkakan	LC
253		*Oenanthe deserti*	Desert Wheatear	Çöl Kuyrukkakanı	LC
254		*Passer domesticus*	House Sparrow	Serçe	LC
255		*Passer montanus*	Eurasian Tree Sparrow	Ağaç Serçesi	LC
256		*Passer hispaniolensis*	Spanish Sparrow	Söğüt Serçesi	LC
257		*Petronia petronia*	Rock Sparrow	Kaya Serçesi	LC
258		*Prunella modularis*	Dunnock	Dağbülbülü	LC
259		*Motacilla alba*	White Wagtail	Ak Kuyruksallayan	LC
260		*Motacilla cinerea*	Grey Wagtail	Dağ Kuyruksallayanı	LC
261		*Motacilla flava*	Western Yellow Wagtail	Sarı Kuyruksallayan	LC
262		*Motacilla citreola*	Citrine Wagtail	Sarıbaşlı Kuyruksallayan	LC
263		*Anthus campestris*	Tawny Pipit	Kır İncirkuşu	LC
264		*Anthus richardi*	Richard's Pipit	Mahmuzlu İncirkuşu	LC
265		*Anthus pratensis*	Meadow Pipit	Çayır İncirkuşu	LC
266		*Anthus trivialis*	Tree Pipit	Ağaç İncirkuşu	LC
267		*Anthus spinoletta*	Water Pipit	Dağ İncirkuşu	LC
268		*Anthus cervinus*	Red-throated Pipit	Kızılgerdanlı İncirkuşu	LC
269		*Fringilla coelebs*	Common Chaffinch	İspinoz	LC
270		*Fringilla montifringilla*	Brambling	Dağ İspinozu	LC

271		*Coccothraustes coccothraustes*	Hawfinch	Kocabaş	LC
272		*Pyrrhula pyrrhula*	Eurasian Bullfinch	Şakrak	LC
273		*Carpodacus erythrinus*	Common Rosefinch	Çütre	LC
274		*Chloris chloris*	European Greenfinch	Florya	LC
275		*Linaria cannabina*	Common Linnet	Ketenkuşu	LC
276		*Loxia curvirostra*	Red Crossbill	Çaprazgaga	LC
277		*Carduelis carduelis*	European Goldfinch	Saka	LC
278		*Serinus serinus*	European serin	Küçük İskete	LC
279		*Spinus spinus*	European siskin	Karabaşlı İskete	LC
280		*Emberiza calandra*	Corn Bunting	Tarla Çintesi	LC
281		*Emberiza citrinella*	Yellowhammer	Sarı Çinte	LC
282		*Emberiza cirlus*	Cirl Bunting	Bahçe Çintesi	LC
283		*Emberiza cia*	Rock Bunting	Kaya Çintesi	LC
284		*Emberiza hortuluna*	Ortolan Bunting	Kirazkuşu	LC
285		*Emberiza caesia*	Cretzschmar's Bunting	Kızıl Kirazkuşu	LC
286		*Emberiza melanocephala*	Black-headed Bunting	Karabaşlı Çinte	LC
287		*Emberiza schoeniclus*	Common Reed Bunting	Bataklık Çintesi	LC

Kaynakça

[1] **INULA, 2013**. *Birds in quarries and gravel pits; Flying gemstones and swift hunters.* (Editor: Rademacher M.),Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse, Freiburg, ISBN 978-3-9815050-4- 7.

[2] **Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2020**. *IOC World Bird List (v10.1).* doi : 10.14344/IOC.ML.10.1.

[3] **Demirsoy A., 1995.** *Yaşamın Temel Kuralları – Omurgalılar / Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler).* Meteksan AŞ, ISBN 975-7746-08-8.

[4] **Pough F.H., Janis C.M. and Heiser J.B., 2014**. Vertebrate Life (Ninth Edition). Pearson, ISBN 978-0-321-77336-

[5] **Nyffeler M., Şekercioğlu, ÇH., Whelan CJ., 2018**. Insectivorous birds consume an estimated 400–500 million tons of prey annually. The Science of Nature. 105: 47

[6] **Barış S. 2003**. *Kuşlarda Göç ve Türkiye'nin Göç Açısından Önemi. Halkalamaya Giriş Kursu Ders Notları*, Ankara

[7] **Welty, J, C., Baptista, L. 1988**. *The Life of Birds*. Saunders College, New York

[8] **Karataş A., 2016**. *Yılanboyun Anısına*, National Geographic, Mart 2016.

[9] **Keşaplı Can, Ö., 2004**, *A study of passerine migration at METU (Ankara, Central Turkey) based on the mist-netting method*. Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ.

Aye, R., Schweizer, M., Roth, T. 2012. *Birds of Central Asia*. Christopher Helm. London.

Bacak, E., Güngör, U., Arslangündoğdu, Z. 2019. *Gala Gölü Kuşları*. T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.Bölge Müdürlüğü, Edirne Şube Müdürlüğü. Edirne

Bacak, E., Özkoç, Ö. Ü., Bilgin, S., Beşkardeş, V. 2015. *İstanbul Kuşları*. T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü. İstanbul.

Boyla, K.A., Sinav, L. ve Dizdaroğlu D.E. 2019. *Türkiye Üreyen Kuş Atlası*. WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı. İstanbul.

Heinzel, H., Fitter, H. Parslow, J. 1995. *Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları*. (Çeviri editörü: Boyla, K.A) Doğal Hayatı Koruma Derneği. Rotolito Lombarda

Kirwan, G.M., Boyla, K. A., Castell, P., Demirci, B., Özen, M., Welch, H., Marlow, T. 2008. The Birds of Turkey. Christopher Helm. London.

Porter, R, F., Christensen, S., Schiermacker-Hansen, P. 2004. *Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları*. (Çeviri Editörü: Boyla, K.A., Çapacı, K.) Christopher Helm. London.

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D. 2010. *Collins Bird Guide (Second edition).* HarperCollins Publishers Ltd. Trento

http://www.istanbultabiatparklari.gov.tr/ Son Erişim Tarihi: 04.03.2020

https://ebird.org/home Son Erişim Tarihi: 04.03.2020

https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=@ Son Erişim Tarihi: 04.03.2020

https://www.oiseaux.net/ Son Erişim Tarihi: 04.03.2020

https://www.wikipedia.org/ Son Erişim Tarihi: 04.03.2020

YAZAR ve FOTOĞRAFÇILAR



Yazarlar



Berat Akkaş

Yaban Hayat Fotoğrafçısı

1987 Beykoz doğumlu. Beykent Üniversitesi Hazır Yemek-Aşçılık Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Beş yıl turizm otelcilik sektöründe çalıştıktan sonra eğitmenliği seçip üç yıl özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak bulundu.

Daha sonra kuş ve yaban hayat fotoğrafçılığına yöneldi. Altı yıldır kuş ve yaban hayat fotoğrafları çekmekte olup, özel bir televizyon kanalında yayınlanmış kuşlar üzerine iki belgeselin çekimlerini ve yönetmenliğini yapmıştır. Fotoğrafçılık ve yönetmenlik kariyerine projeleri ile devam etmektedir.



Arda Dönerkayalı

Doğa Fotoğrafçısı

1992 yılında doğduğundan beri Beykoz'un doğasıyla iç içe bir çocukluk dönemi geçirdi. 2014 yılında babasından ilham alarak doğa fotoğrafçılığına başladı. Fotoğraf çekerken farklı kuşları keşfettikçe onları daha detaylı tanıma ve araştırma merakıyla kuş gözlemciliğine başladı. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünde aldı. Şu anda aynı okulun aynı ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte ve özel bir şirketin Ar-Ge bölümünde çalışmaktadır.



Umut Güngör

2013 – 2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde eğitim gördü. Üniversite eğitimi sırasında başlayan kelebek fotoğrafçılığı tutkusu daha sonra kuş fotoğrafçılığına ve 2016 yılında katıldığı Kış Ortası Sukuşu Sayımları sırasında ise kuş gözlemciliğine dönüştü. Kuş gözlemciliği ile tanışmasından bir süre sonra ornitolog olmaya karar verdi. Kuşlarla ilgili birçok araştırmada gönüllü veya araştırmacı olarak yer aldı. 2019 yılında Ulusal Halkalama Programı kapsamındaki gereklilikleri yerine getirerek tecrübeli halkacı lisansı almaya hak kazandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında ornitoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.



Ergün Bacak

Öğr. Görevlisi

1984 yılında, İvrindi/Balıkesir'de doğdu. Ornitolog (Kuş bilimci) olma yolunda İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünü seçti. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde yaptığı yüksek lisans ile akademik çalışmalara başladı. 2013 yılında İ.Ü. Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayatı Programında öğr. görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında "İstanbul Kuşları" kitabını çıkaran ekipte yer aldı. Ayrıca akademik anlamda bilimsel çalışmalar ve yayınlarda bulundu. 2016'dan itibaren tecrübeli halkalamacı lisansına sahiptir. Ayrıca; kelebek, sürüngen, amfibi ve böcekler konusunda araştırmalar yapmaktadır. Eğitmen ve doktora öğrencisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.



Vedat Beşkardeş

Dr. Öğr. Üyesi

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında 2002 yılında yüksek lisans eğitimini, 2010 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kuş ve memeli biyoçeşitliliği, yaban hayatı ekolojisi, yaban hayatı yönetimi ve avcılık konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Fotoğrafçılar



Emrah Kayhan

1981 Hakkari / Yüksekova'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Lise mezuniyeti sonrasında, kendisini müziğe adadı.

2013 yılından itibaren kuş ve doğa sevgisinin peşinde Türkiye'nin tüm bölgelerini gezdi ve fotoğrafladı. Samsun Kızılırmak deltasında yapılan üniversite destekli kuş halkalama eğitimine katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aktif olarak nadir kuşlar hedefli kuş fotoğrafçılarına rehberlik yapmaktadır.



Mustafa Özdemir

1981 Samsun'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Özel sektörde çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra yaklaşık 12 senedir bir kamu bankasının hazine biriminde çalışmaktadır. 10 senedir hobi olarak fotoğrafçılık ile uğraşmakta olup, bu sürenin son beş yılı kuş ve doğa fotoğraflarından oluşmaktadır. Hayatı boyunca doğanın içinde oldu, kuş ve doğa fotoğrafçılığına hobi olarak devam etmektedir.



Hüseyin Buğday

1978 yılında Aydın, Söke'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2009 yılında edindiği dijital fotoğraf makinesinden sonra kuş fotoğrafçılığına merak sardı. Kuşları tanıyıp öğrendikçe bu ilgisi bir tutkuya dönüştü. Halihazırda Türkiye'de 300'ün üzerinde kuş türünü fotoğrafladı. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır.



Turhan Alak

Nişantaşı Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği okumaktadır. 2013 yılından itibaren kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliği ile ilgilenmektedir. Kuş fotoğrafçılığına başlama hikayesi yol kenarlarındaki ağaç ve direkler üzerinde gördüğü şahinler olmuştur. Bu şekilde kuş fotoğrafçılığına başlamış ve 200'ün üzerinde farklı kuş türünü fotoğraflamış ve gözlemlemiştir.



Mücahit Oğuzhan Topçu

1991 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Ortaokul öğrenciliği döneminde resme merak sardı. Bu konuda katıldığı kurslardan sertifikalar aldı. Lise yıllarında resim ile fotoğraf arasındaki tercihini fotoğrafçılıktan yana kullanarak kendisini bu konuda yetiştirmeye karar verdi.

Bu zaman zarfında doğa ve kuş fotoğrafçılığında uzmanlaştı. Farklı şehirlerde sergiler açtı aynı zamanda dergilerde yayınlanan yaban hayat fotoğrafları vardır.



Ozan Abdullah Karaoğlan

1994 yılında Malatya'da doğdu. İlkokul, lise ve üniversiteyi Malatya'da okudu. 2012 yılında almış olduğu fotoğraf makinesiyle fotoğrafçılığa başladı. Manzara fotoğrafları çekimleri sırasında etrafındaki kuşları da çekmeye başladı ve bu şekilde kuş fotoğrafçılığına olan ilgisi arttı.

2015 yılında İnönü Üniversitesinde Kuş Gözlem Topluluğunu kurdu. Üniversite topluluğu olarak kuş fotoğrafçılığı ve gözlem konulu iki seminer ve fotoğraf sergisi düzenledi. Kuş fotoğrafçılığına başladığından bu yana birçok kuş fotoğrafçısı ile tanışma imkanı ve daha önce gitmediği birçok ilin doğal tabiat alanlarını gezme imkanı buldu.



Nevzat Dönerkayalı

1957 yılında Beykoz'da doğdu ve halen Beykoz'da ikamet etmektedir. Babasının merakı sayesinde fotoğraf çekmeye başladı ve bu hobiyi kendi oğluna da aktarmayı başardı. Beykoz'da genç yaşlardan itibaren sıklıkla insanlardan uzakta doğada kamp yaptığı için yaban hayatını ve kuşları gözlemleme fırsatı buldu. Çeşitli alanlarda çalışıp emekli olduktan sonra da ilgi duyduğu doğa fotoğrafçılığını ailesiyle birlikte sürdürmektedir.



Elif Dilara Gülderen

1994 Zeytinburnu doğumlu. Kırklareli Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunudur. Özel bir anaokulunda yardımcı öğretmenlik ve Kırklareli Ticaret Borsasında gıda teknikeri olarak stajyerlik yaptı. Daha sonra geleneksel çizim ve dijital çizime yöneldi. Illustrator, bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu üzerine eğitimler aldı. Çizim konusunda kendisini geliştirmek adına güzel sanatlar fakültesine hazırlanmaktadır.

Kuş Fotoğrafları ve Fotoğrafçıları Listesi

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
1	Ada Doğanı	Arda Dönerkayalı
2	Ağaç İncirkuşu	Ergün Bacak
3	Ağaç Serçesi	Arda Dönerkayalı
4	Ak Kuyruksallayan	Arda Dönerkayalı
5	Ak Mukallit	Arda Dönerkayalı
6	Ak Pelikan	Mustafa Özdemir
7	Akdeniz Martısı	Mustafa Özdemir
8	Akgerdanlı Ötleğen	Arda Dönerkayalı
9	Akkanatlı Sumru	Arda Dönerkayalı
10	Akkarınlı Ebabil	Arda Dönerkayalı
11	Alaca Ağaçkakan	Emrah Kayhan
12	Alaca Balıkçıl	Arda Dönerkayalı
13	Alaca Baykuş	Berat Akkaş
14	Alaca Sinekkapan	Umut Güngör
15	Aladoğan	Ergün Bacak
16	Alakarga	Arda Dönerkayalı
17	Alasığırcık	Ozan Abdullah Karaoğlan
18	Altın Yağmurcun	Arda Dönerkayalı
19	Arı Şahini	Nevzat Dönerkayalı
20	Arıkuşu	Arda Dönerkayalı
21	Atmaca	Emrah Kayhan
22	Bahçe Çintesi	Arda Dönerkayalı
23	Bahçe Tırmaşıkkuşu	Arda Dönerkayalı
24	Bahri	Arda Dönerkayalı
25	Balaban	Turhan Alak
26	Balık Kartalı	Mustafa Özdemir
27	Bataklık Çintesi	Emrah Kayhan
28	Bataklık Düdükçünü	Mustafa Özdemir
29	Bataklık Kamışçını	Umut Güngör
30	Bataklık Suyelvesi	Arda Dönerkayalı
31	Bataklıkkırlangıcı	Berat Akkaş
32	Benekli Bülbül	Arda Dönerkayalı
33	Benekli Sinekkapan	Arda Dönerkayalı
34	Benekli Suyelvesi	Arda Dönerkayalı
35	Bıldırcın	Emrah Kayhan
36	Bıyıklı Sumru	Emrah Kayhan
37	Boğmaklı Ardıç	Burak Biçici

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
38	Boğmaklı Toygar	Arda Dönerkayalı
39	Boyunçeviren	Hüseyin Buğday
40	Boz Ebabil	Hüseyin Buğday
41	Boz Kuyrukkakan	Emrah Kayhan
42	Boz Ördek	Emrah Kayhan
43	Boz Ötleğen	Arda Dönerkayalı
44	Bozdoğan	Arda Dönerkayalı
45	Bozkır Delicesi	Arda Dönerkayalı
46	Bozkır Kartalı	Emrah Kayhan
47	Bozkır Toygarı	Arda Dönerkayalı
48	Bülbül	Emrah Kayhan
49	Büyük Ak Balıkçıl	Berat Akkaş
50	Büyük Baştankara	Berat Akkaş
51	Büyük Kamışçın	Berat Akkaş
52	Büyük Orman Kartalı	Hüseyin Buğday
53	Büyük Örümcekkuşu	Arda Dönerkayalı
54	Çakırkuşu	Arda Dönerkayalı
55	Çalı Kamışçını	Burak Biçici
56	Çalıkuşu	Arda Dönerkayalı
57	Çam Baştankarası	Nevzat Dönerkayalı
58	Çamurcun	Emrah Kayhan
59	Çamurçulluğu	Berat Akkaş
60	Çaprazgaga	Arda Dönerkayalı
61	Çayır Delicesi	Emrah Kayhan
62	Çayır İncirkuşu	Arda Dönerkayalı
63	Çayır Taşkuşu	Arda Dönerkayalı
64	Çeltikçi	Arda Dönerkayalı
65	Çıkrıkçın	Arda Dönerkayalı
66	Çıvgın	Arda Dönerkayalı
67	Çitkuşu	Emrah Kayhan
68	Çizgili Ötleğen	Hüseyin Buğday
69	Çobanaldatan	Berat Akkaş
70	Çulluk	Emrah Kayhan
71	Çütre	Emrah Kayhan
72	Dağ Cılıbıtı	Berat Akkaş
73	Dağ İncirkuşu	Arda Dönerkayalı
74	Dağ İspinozu	Arda Dönerkayalı

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
75	Dağ Kuyruksallayan	Mustafa Özdemir
76	Dağbülbülü	Arda Dönerkayalı
77	Delice Doğan	Arda Dönerkayalı
78	Dere Düdükçünü	Turhan Alak
79	Döğüşkenkuş	Arda Dönerkayalı
80	Ebabil	Ozan Abdullah Karaoğlan
81	Ekin Kargası	Turhan Alak
82	Elmabaş Patka	Arda Dönerkayalı
83	Erguvani Balıkçıl	Arda Dönerkayalı
84	Ev Kırlangıcı	Berat Akkaş
85	Fiyu	Arda Dönerkayalı
86	Florya	Berat Akkaş
87	Gece Balıkçılı	Turhan Alak
88	Gökçe Delice	Arda Dönerkayalı
89	Gökçe Güvercin	Mustafa Özdemir
90	Gökdoğan	Arda Dönerkayalı
91	Gökkuzgun	Arda Dönerkayalı
92	Gri Balıkçıl	Arda Dönerkayalı
93	Guguk	Arda Dönerkayalı
94	Gümüş Martı	Berat Akkaş
95	Gümüş Yağmurcun	Arda Dönerkayalı
96	Halkalı Cılıbıt	Berat Akkaş
97	Halkalı Küçük Cılıbıt	Berat Akkaş
98	Halkalı Sinekkapan	Arda Dönerkayalı
99	Hazar Martısı	Berat Akkaş
100	İbibik	Emrah Kayhan
101	İncegagalı Martı	Berat Akkaş
102	İshakkuşu	Berat Akkaş
103	İskender Papağanı	Arda Dönerkayalı
104	İspinoz	Arda Dönerkayalı
105	Kamışbülbülü	Emrah Kayhan
106	Kara Başlı Çinte	Emrah Kayhan
107	Kara Başlı İskete	Umut Güngör
108	Kara Başlı Ötleğen	Arda Dönerkayalı
109	Kara Çaylak	Emrah Kayhan
110	Kara Kızılkuyruk	Arda Dönerkayalı
111	Kara Leylek	Arda Dönerkayalı
112	Kara Sinekkapan	Arda Dönerkayalı
113	Kara Sumu	Arda Dönerkayalı
114	Karaalınlı Örümcekkuşu	Nevzat Dönerkayalı
115	Karabaş Martı	Berat Akkaş
116	Karabatak	Arda Dönerkayalı
117	Karaboyunlu Batağan	Arda Dönerkayalı
118	Karagagalı Sumru	Arda Dönerkayalı
119	Karagerdanlı Dalgıç	Emrah Kayhan
120	Karakarınlı Kumkuşu	Berat Akkaş
121	Karakulaklı Kuyrukkakan	Arda Dönerkayalı
122	Karasırtlı Martı	Arda Dönerkayalı
123	Karatavuk	Arda Dönerkayalı

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
124	Kaşıkçı	Ozan Abdullah Karaoğlan
125	Kaşıkgaga	Arda Dönerkayalı
126	Kaya Güvercini	Ergün Bacak
127	Kayın Baştankarası	Arda Dönerkayalı
128	Kerkenez	Hüseyin Buğday
129	Kervançulluğu	Arda Dönerkayalı
130	Ketenkuşu	Umut Güngör
131	Kılkuyruk	Arda Dönerkayalı
132	Kındıra Kamışçını	Emrah Kayhan
133	Kır İncirkuşu	Arda Dönerkayalı
134	Kır Kırlangıcı	Arda Dönerkayalı
135	Kızıl Akbaba	Emrah Kayhan
136	Kızıl Ardıç	Turhan Alak
137	Kızıl Kırlangıç	Berat Akkaş
138	Kızıl Şahin	Arda Dönerkayalı
139	Kızılbacak	Turhan Alak
140	Kızılbaşlı Örümcekkuşu	Mustafa Özdemir
141	Kızılgerdan	Arda Dönerkayalı
142	Kızılgerdanlı İncirkuşu	Arda Dönerkayalı
143	Kızılkuyruk	Arda Dönerkayalı
144	Kızılsırtlı Örümcekkuşu	Berat Akkaş
145	Kızkuşu	Arda Dönerkayalı
146	Kirazkuşu	Arda Dönerkayalı
147	Kocabaş	Berat Akkaş
148	Kuğu	Berat Akkaş
149	Kukumav	Arda Dönerkayalı
150	Kulaklı Orman Baykuşu	Berat Akkaş
151	Kum Kırlangıcı	Emrah Kayhan
152	Kumru	Nevzat Dönerkayalı
153	Kuyrukkakan	Arda Dönerkayalı
154	Kuzgun	Arda Dönerkayalı
155	Küçük Ağaçkakan	Emrah Kayhan
156	Küçük Ak Balıkçıl	Arda Dönerkayalı
157	Küçük Akbaba	Umut Güngör
158	Küçük Akgerdanlı Ötleğen	Mücahit Oğuzhan Topçu
159	Küçük Balaban	Mücahitt Oğuzhan Topçu
160	Küçük Batağan	Arda Dönerkayalı
161	Küçük Gümüş Martı	Berat Akkaş
162	Küçük İskete	Arda Dönerkayalı
163	Küçük Karabatak	Umut Güngör
164	Küçük Karga	Berat Akkaş
165	Küçük Kartal	Arda Dönerkayalı
166	Küçük Kerkenez	Arda Dönerkayalı
167	Küçük Kumkuşu	Emrah Kayhan
168	Küçük Kumru	Arda Dönerkayalı
169	Küçük Martı	Arda Dönerkayalı
170	Küçük Orman Kartalı	Umut Güngör
171	Küçük Sinekkapan	Arda Dönerkayalı
172	Küçük Yeşil Ağaçkakan	Arda Dönerkayalı

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
173	Leş Kargası	Berat Akkaş
174	Leylek	Berat Akkaş
175	Maskeli Örümcekkuşu	Emrah Kayhan
176	Maskeli Ötleğen	Mücahit Oğuzhan Topçu
177	Mavi Baştankara	Umut Güngör
178	Orman Alaca Ağaçkakanı	Arda Dönerkayalı
179	Orman Çıvgını	Mücahit Oğuzhan Topçu
180	Orman Düdükçünü	Umut Güngör
181	Orman Toygarı	Berat Akkaş
182	Ortanca Ağaçkakan	Nevzat Dönerkayalı
183	Ökse Ardıcı	Emrah Kayhan
184	Öter Ardıç	Arda Dönerkayalı
185	Paçalı Şahin	Hüseyin Buğday
186	Saka	Ergün Bacak
187	Sakarmeke	Berat Akkaş
188	Saksağan	Arda Dönerkayalı
189	Sarı Çinte	Arda Dönerkayalı
190	Sarı Kuyruksallayan	Mustafa Özdemir
191	Sarı Mukallit	Emrah Kayhan
192	Sarıasma	Arda Dönerkayalı
193	Sarıbaşlı Kuyruksallayan	Umut Güngör
194	Saz Delicesi	Arda Dönerkayalı
195	Saz Kamışçını	Burak Biçici
196	Serçe	Arda Dönerkayalı
197	Sığır Balıkçılı	Berat Akkaş
198	Sığırcık	Arda Dönerkayalı
199	Sıvacı	Arda Dönerkayalı
200	Sibirya Taşkuşu	Mücahit Oğuzhan Topçu
201	Söğüt Serçesi	Arda Dönerkayalı
202	Söğütbülbülü	Arda Dönerkayalı

NO	KUŞ TÜRÜ	Fotoğraf Sahibi
203	Suçulluğu	Arda Dönerkayalı
204	Sukılavuzu	Arda Dönerkayalı
205	Sumru	Arda Dönerkayalı
206	Suna	Berat Akkaş
207	Sutavuğu	Arda Dönerkayalı
208	Sülün	Nevzat Dönerkayalı
209	Sürmeli Çalıkuşu	Hüseyin Buğday
210	Şah Kartal	Emrah Kayhan
211	Şahin	Arda Dönerkayalı
212	Tahtalı	Emrah Kayhan
213	Tarla Ardıcı	Arda Dönerkayalı
214	Tarla Çintesi	Arda Dönerkayalı
215	Tarlakuşu	Arda Dönerkayalı
216	Taşkuşu	Arda Dönerkayalı
217	Tepeli Karabatak	Arda Dönerkayalı
218	Tepeli Patka	Arda Dönerkayalı
219	Tepeli Toygar	Arda Dönerkayalı
220	Turna	Arda Dönerkayalı
221	Uzunbacak	Berat Akkaş
222	Uzunkuyruklu Baştankara	Arda Dönerkayalı
223	Üveyik	Berat Akkaş
224	Yalıçapkını	Arda Dönerkayalı
225	Yaz Atmacası	Ozan Abdullah Karaoğlan
226	Yelkovan	Turhan Alak
227	Yeşil Ağaçkakan	Berat Akkaş
228	Yeşil Düdükçün	Ozan Abdullah Karaoğlan
229	Yeşil Papağan	Arda Dönerkayalı
230	Yeşilbacak	Arda Dönerkayalı
231	Yeşilbaş	Arda Dönerkayalı
232	Yılan Kartalı	Arda Dönerkayalı

Dizin

A

Accipiter brevipes 312
Accipiter brevipes 178
Accipiter gentilis 180, 312
Accipiter nisus 179, 312
Acrocephalus arundinaceus 313
Acrocephalus melanopogon 307, 313
Acrocephalus narundinaceus 235
Acrocephalus nschoenobaenus 238
Acrocephalus palustris 236, 313
Acrocephalus schoenobaenus 313
Acrocephalus scirpaceus 237, 313
Actitis hypoleucos 121, 310
Ada Doğanı 199, 312
Aegithalos caudatus 221, 313
Ağaç İncirkuşu 62, 286, 287, 314
Ağaçkakan 193
Ağaçkakanı 312
Ağaç Serçesi 278, 314
ak çaylak 50
Ak Çaylak 307, 311
Akdeniz Martısı 131, 310
Akgerdanlı Ötleğen 54, 245, 313
Akkanatlı Sumru 42, 139, 140, 311
Akkarınlı Ebabil 90, 309
Akkuyruklu Kartal 307, 311
Ak Kuyruksallayan 281, 314
Ak Mukallit 240, 313
Ak Pelikan 159, 311
Aksırtlı Ağaçkakan 31, 307, 312
Alaca Ağaçkakan 61, 64, 190, 191, 193, 312
Alaca Balıkçıl 153, 311
Alaca Baykuş 31, 42, 59, 62, 69, 183, 312
Alaca Kuyrukkakan 307, 314
Alaca Sinekkapan 263, 264, 314
Aladoğan 198
Ala Doğan 312
Alakarga 17, 39, 64, 211, 313
Alasığırcık 254, 314
Alauda arvensis 223, 313
Alcedo atthis 187, 312
Alexandrine Parakeet 204, 312
Alpine Swift 90, 309
Altın Yağmurcun 109, 110, 310
Anas acuta 83, 309
Anas crecca 41, 84, 309
Anas platyrhynchos 82, 309
Anser albifrons 51, 307, 309
Anthus campestris 285, 314
Anthus cervinus 289, 314
Anthus pratensis 286, 314
Anthus richardi 307, 314
Anthus spinoletta 288, 314
Anthus trivialis 287, 314
Apus apus 88, 309
Apus pallidus 89, 309
Aquila chrysaetos 307, 311
Aquila heliaca 167, 311
Aquila nipalensis 168, 311
Ardea alba 157, 311
Ardea cinerea 155, 311
Ardea purpurea 156, 311
Ardeola ralloides 153, 311
Arıkuşu 33, 188, 312
Arı Şahini 172, 311
Asio flammeus 307, 312
Asio otus 181, 312
Athene noctua 184, 312
Atmaca 16, 31, 54, 64, 179, 312
Aythya ferina 85, 309
Aythya fuligula 86, 309
Aythya nyroca 307, 309

B

Bahçe Çintesi 301, 302, 315
Bahçe Tırmaşıkkuşu 62, 64, 252, 314
Bahri 52, 53, 55, 57, 105, 309
Balaban 150, 311
Balıkçıl 156
Balık Kartalı 160, 311
Barn Swallow 228, 313
Barred Warbler 247, 313
Bataklık Çintesi 305, 315
Bataklık düdükçünü 310
Bataklık Düdükçünü 125
Bataklık Kamışçını 239, 313
Bataklıkkırlangıcı 127, 310
Bataklık Suyelvesi 99, 309
Bearded Vulture 307, 311
Benekli Bülbül 53, 268, 314
Benekli Sinekkapan 53, 261, 314
Benekli Suyelvesi 100, 309
Bıldırcın 74, 309
Bıldırcınkılavuzu 307, 309
Bıyıklı Doğan 307, 312
Bıyıklı Kamışçın 238, 307, 313
Bıyıklı Sumru 138, 140, 311
Blackbird 314
Blackcap 313
Black-crowned Night Heron 152, 311
Black-headed Bunting 304, 315
Black-headed Gull 129, 310
Black Kite 177, 312
Black-legged Kittiwake 307, 310
Black-necked Grebe 106, 310
Black Redstart 270, 314
Black Stork 144, 311
Black-tailed Godwit 115, 310
Black Tern 140, 311
Black-throated Loon 141, 311
Black-winged Kite 307, 311
Black-winged Stilt 107, 310
Bluethroat 307, 314
Blue Tit 313
Boğmaklı Ardıç 260, 314
Boğmaklı Toygar 226, 313
Bohemian Waxwing 307, 313
Bombycilla garrulus 307, 313
Booted Eagle 164, 311
Botaurus stellaris 150, 311
Boyunçeviren 54, 189, 312
Bozdoğan 200, 312
Boz Ebabil 89, 309
Bozkır Delicesi 175, 176, 312
Bozkır Kartalı 168, 311

Bozkır Toygarı 225, 313
Boz Kuyrukkakan 275, 314
Boz Ördek 80, 309
Boz Ötleğen 243, 247, 313
Brambling 291, 314
Broad-billed Sandpiper 307, 310
Bubulcus ibis 154
Bubulcus Ibis 311
Burhinus oedicnemus 307, 310
Buteo buteo 47, 169, 311
Buteo lagopus 171, 311
Buteo rufinus 170, 311
Bülbül 16, 18, 54, 62, 267, 314
Büyük Ak Balıkçıl 157, 158, 311
Büyük Baştankara 31, 33, 39, 53, 61, 64, 218, 313
Büyük Kamışçın 56, 235, 313
Büyük Karabaş Martı 307, 310
Büyük Karasırtlı Martı 307, 310
Büyük Orman Kartalı 165, 166, 311
Büyük Örümcekkuşu 209, 312

C

Calandra Lark 226, 313
Calandrella brachydactyla 225, 313
Calidris alpina 117, 310
Calidris falcinellus 307, 310
Calidris ferruginea 307, 310
Calidris minuta 118, 310
Calidris pugnax 116, 310
Calidris temminckii 307, 310
Caprimulgus europaeus 87
Caprimuulgus europaeus 309
Carduelis carduelis 297, 315
Carpodacus erythrinus 293, 315
Caspian Gull 133, 310
Cecropis daurica 230, 313
Cercotrichas galactotes 307, 314
Certhia brachydactyla 252, 314
Cetti's Warbler 231
Cettia cetti 231, 313
Cetti's Warbler 313
Charadrius dubius 112, 310
Charadrius hiaticula 111, 310
Charadrius morinellus 310
Charadrius Morinellus 113
Chlidonias hybrida 138, 311
Chlidonias leucopterus 139, 311
Chlidonias niger 140, 311
Chloris chloris 294, 315
Chroicocephalus genei 128, 310
Chroicocephalus ridibundus 56, 129, 310
Ciconia ciconia 41, 47, 143, 311
Ciconia nigra 144, 311
Circaetus gallicus 163, 311
Circus aeruginosus 173, 311
Circus cyaneus 174, 312
Circus macrourus 176, 312
Circus pygargus 175, 312
Cirl Bunting 302, 315
Citrine Wagtail 284, 314
Clamator glandarius 307, 309
Clanga clanga 166, 311
Clanga pomarina 165, 311
Coal Tit 219, 313
Coccothraustes coccothraustes 292, 315
Collared Flycatcher 262, 314
Collared Pratincole 127, 310
Coloeus modedula 313
Coloeus monedula 213
Columba livia 92, 309
Columba oenas 94, 309
Columba palumbus 309
Common Blackbird 255
Common Buzzard 169, 311
Common Chaffinch 290, 314
Common Chiffchaff 232, 313
Common Crane 103, 309
Common Cuckoo 91, 309
Common Eider 307, 309
Common Firecrest 249, 313
Common Greenshank 126, 310
Common House Martin 229, 313
Common Kestrel 197, 312
Common Kingfisher 187, 312
Common Linnet 295, 315
Common Moorhen 101, 309
Common Nightingale 267, 314
Common Pheasant 75, 309
Common Pochard 85, 309
Common Quail 74, 309
Common Redshank 124, 310
Common Redstart 269, 314
Common Reed Bunting 305, 315
Common Ringed Plover 111, 310
Common Rock Thrush 307, 314
Common Rosefinch 293, 315
Common Sandpiper 121, 310
Common Shelduck 77, 309
Common Snipe 120, 310
Common Starling 253, 314
Common Swift 88, 309
Common Tern 137, 311
Common Whitethroat 245, 313
Common Wood Pigeon 93
Coracias garrulus 186, 312
Corcus corax 313
Corn Bunting 300, 315
Corn Crake 307, 309
Corvus corax 216
Corvus cornix 215, 313
Corvus frugilegus 214, 313
Coturnix coturnix 74, 309
Crested Lark 224, 313
Cretzschmar's Bunting 307, 315
Crex crex 307, 309
Cuculus canorus 91, 309
Curlew Sandiper 307
Curlew Sandpiper 310
Cyanistes caeruleus 217
Cyanistes caerulues 313
Cygnus cygnus 307, 309
Cygnus olor 76, 309

Ç

çakır 64
Çakırkuşu 180, 312
Çalı Bülbülü 307, 314
Çalı Kamışçını 235, 236, 237, 313
Çalıkuşu 54, 61, 248, 313
Çalıkuşu Çıvgını 307, 313
Çam Baştankarası 219, 313
Çamurçulluğu 115, 310
Çamurcun 41, 84, 309
Çaprazgaga 54, 296, 315
Çayır Delicesi 175, 176, 312
Çayır İncirkuşu 286, 287, 289, 314
Çayır Taşkuşu 271, 314
Çeltikçi 148, 311
Çıkrıkçın 78, 84, 309
Çıvgın 62, 64, 232, 313
Çitkuşu 62, 64, 250, 313
Çizgili Ötleğen 247, 313
Çobanaldatan 42, 87, 309
Çöl Kuyrukkakanı 307, 314
Çulhakuşu 307, 313
Çulluk 53, 119, 310
Çütre 58, 293, 315

D

Dağbülbülü 280, 314
Dağ Cılıbıtı 113, 310
Dağ İncirkuşu 288, 314
Dağ İspinozu 61, 291, 314
Dağ Kuyruksallayanı 282, 314
Delice Doğan 35, 54, 61, 64, 201, 312
Delichon urbicum 229, 313
Dendrocopos leucotos 307, 312
Dendrocopos major 191, 312
Dendrocopos syriacus 190, 312
Dendrocoptes medius 193, 312
Dere Düdükçünü 121, 310
Desert Wheatear 307, 314
Döğüşkenkuş 116, 310
Drybates minor 312
Drybates minör 192
Dunlin 117, 310
Dunnock 280, 314

E
Eastern Black-eared Wheatear 276, 314
Eastern Imperial Eagle 167, 311
Eastern Olivaceous Warbler 240, 313
Ebabil 41, 88, 309
Egretta garzetta 158, 311
Egyptian Vulture 162, 311
Ekin Kargası 62, 64, 214, 313
Elanus caeruleus 307, 311
Eleonora's Falcon 199, 312
Elmabaş Patka 85, 309
Emberiza caesia 307, 315
Emberiza calandra 300, 315
Emberiza cia 307, 315
Emberiza cirlus 302, 315
Emberiza citrinella 301, 315
Emberiza hortulana 303
Emberiza hortuluna 315
Emberiza melanocephala 304, 315
Emberiza schoeniclus 305, 315
Erguvani 156
Erguvani Balıkçıl 311
Erithacus rubecola 314
Erithacus rubecula 266
Eurasian Bittern 150, 311
Eurasian Blackcap 242
Eurasian Blue Tit 217
Eurasian Bullfinch 307, 315
Eurasian Collared Dove 96, 309
Eurasian Coot 102, 309
Eurasian Curlew 114, 310
Eurasian Dotterel 113, 310
Eurasian Golden Oriole 210, 313
Eurasian Hobby 201, 312
Eurasian Hoopoe 185, 312
Eurasian Jay 211, 313
Eurasian Magpie 212, 313
Eurasian Nuthatch 251, 314
Eurasian Oystercatcher 307, 310
Eurasian Penduline Tit 307, 313
Eurasian Reed Warbler 237, 313
Eurasian Scops Owl 182, 312
Eurasian Siskin 299
Eurasian Skylark 223, 313
Eurasian Sparrowhawk 179, 312
Eurasian Spoonbill 149, 311
Eurasian Stone Curlew 307, 310
Eurasian Teal 84, 309
Eurasian Tree Sparrow 278, 314
Eurasian Turtle Dove 309
Eurasian Wigeon 81, 309
Eurasian Woodcock 119, 310
Eurasian Wren 250, 313
Eurasian Wryneck 189, 312
European Bee-eater 188, 312
European Golden Plover 109, 310
European Goldfinch 297, 315
European Greenfinch 294, 315
European Green Woodpecker 195
European Herring Gull 307, 310
European Honey Buzzard 172, 311
European Nightjar 87, 309
European Pied Flycatcher 263, 314
European Robin 266, 314
European Roller 186, 312
European serin 315
European Serin 298
European Shag 146, 311
European siskin 315
European Stonechat 272, 314
European Turtle Dove 95
Ev Kırlangıcı 229, 313

F
Falco biarmicus 307, 312
Falco cherrug 307, 312
Falco columbarius 200, 312
Falco eleonorae 199, 312
Falco naumanni 196, 312
Falco peregrinus 18, 202, 312
Falco subbuteo 201, 312
Falco tinnunculus 197, 312
Falco vespertinus 198, 312
Ferruginous Pochard 307, 309
Ficedula albicollis 262
Ficedula hypoleuca 263, 314
Ficedula parva 265, 314
Ficedula semitorquata 264
Fidecula albicollis 314
Fidecula semitorquata 314
Fieldfare 256
Fieldfire 314
Fiyu 81, 309
Florya 33, 54, 61, 64, 294, 315
Fringilla coelebs 290, 314
Fringilla montifringilla 291, 314
Fulica atra 102, 309

G
Gadwall 80, 309
Galerida cristata 224, 313
Gallinago gallinago 120, 310
Gallinula chloropus 101, 309
Garden Warbler 243, 313
Garganey 78, 309
Garrulus glandarius 211, 313
Gavia arctica 141, 311
Gece Balıkçılı 57, 152, 311
Gelochelidon nilotica 307, 311
Glareola pratincola 127, 310
Glossy Ibis 148, 311
Goldcrest 248, 313
Golden Eagle 307, 311
Gökçe Delice 174, 175, 312
Gökçe Güvercin 94, 309
Gökdoğan 18, 202, 312
Gökkuzgun 186, 312
Great Bustard 307, 309
Great Cormorant 147, 311
Great Crested Grebe 105, 309
Great Egreet 311
Great Egret 157
Greater Black-backed Gull 307, 310
Greater Short-toed Lark 225, 313
Greater Spotted Eagle 166, 311
Greater White-fronted Goose 307, 309
Great Grey Shrike 209, 312
Great Reed Warbler 235, 313
Great Spotted Cuckoo 307, 309
Great Spotted Woodpecker 191, 312
Great Tit 218, 313
Great White Pelican 159
Great White Pelikan 311
Green Sandpiper 122, 310
Green Woodpecker 312
Grey-headed Woodpecker 194, 312
Grey Heron 155, 311
Grey Plover 110, 310
Grey Wagtail 282, 314
Gri Balıkçıl 41, 55, 57, 155, 311
Griffon Vulture 161, 311
Grus grus 103, 309
Guguk 91, 309
Gülen Sumru 307, 311
Gull-billed Tern 307, 311
Gümüş Martı 53, 55, 57, 134, 310
gümüş yağmurcun 110
Gümüş Yağmurcun 110, 310
Gypaetus barbatus 46, 307, 311
Gyps fulvus 161, 311

H
Haematopus ostralegus 307, 310
Haliaeetus albicilla 307, 311
Halkalı Cılıbıt 111, 112, 310
Halkalı Küçük Cılıbıt 112, 310
Halkalı Sinekkapan 262, 264, 314
Hawfinch 292, 315
Hazar Martısı 53, 57, 133, 310
Hen Harrier 174, 312
Hieraaetus pennatus 164, 311
Himantopus himantopus 107, 310
Hippolais icterina 241, 313
Hirundo rustica 228, 313
Hooded Crow 215, 313
Horned Grebe 307, 310
House Sparrow 277, 314
Hydrocoloeus minutus 130, 310

I - İ

Ichthyaerus ichthyaerus 310
Ichthyaerus melanocephalus 310
Ichthyaetus ichthyaetus 307
Ichthyaetus melanocephalus 131
Icterine Warbler 241, 313
Iduna pallida 240, 313
Isabelline Wheatear 275, 314
Ixobrychus minutus 151, 311
İbibik 33, 185, 312
İncegagalı Martı 42, 128, 310
İpekkuyruk 307, 313
İshakkuşu 42, 182, 312
İskender Papağanı 62, 204, 312
İspinoz 31, 33, 59, 61, 64, 290, 292, 294, 298, 299, 314

J

Jack Snipe 307, 310
Jynx torquilla 189, 312

K

Kamışbülbülü 231, 313
Karaalınlı Örümcekkuşu 57, 208, 209, 312
Karaayaklı Martı 307, 310
Karabaşlı Çinte 57, 304, 315
Karabaşlı İskete 31, 33, 54, 59, 61, 64, 299, 315
Karabaşlı Ötleğen 64, 242, 313
Karabaş Martı 52, 53, 55, 56, 57, 129, 131, 132, 310
Karabatak 41, 53, 54, 145, 146, 147, 311
Karaboyunlu Batağan 52, 53, 55, 57, 106, 310
Kara Çaylak 177, 312
Karagagalı Sumru 52, 136, 310
Karagerdanlı Dalgıç 53, 141, 311
Karakarınlı Kumkuşu 117, 310
Kara Kızılbacak 307, 310
Kara Kızılkuyruk 270, 314
Karakulaklı Kuyrukkakan 276, 314
Kara Leylek 144, 311
Kara Sinekkapan 262, 263, 264, 314
Karasırtlı Martı 42, 135, 310
Kara Sumru 42, 139, 140, 311
Karatavuk 31, 33, 62, 64, 255, 314
Kaşıkçı 149, 311
Kaşıkgaga 79, 309
Kaya Çintesi 307, 315
Kaya Güvercini 92, 94, 309
Kaya Kartalı 167, 307, 311
Kaya Serçesi 307, 314
Kayın Baştankarası 220, 313
Kerkenez 163, 196, 197, 312
Kervançulluğu 114, 310
Ketenkuşu 295, 315
Kirazkuşu 303, 315
Kılıçgaga 307, 310
Kılkuyruk 83, 309
Kındıra Kamışçını 56, 238, 313
Kır Baykuşu 307, 312
Kır İncirkuşu 285, 314
Kır Kırlangıcı 228, 229, 230, 313
Kızıl Akbaba 161, 311
Kızıl Ardıç 61, 257, 314
Kızılbacak 124, 310
Kızılbaşlı Örümcekkuşu 206, 207, 312
Kızılboyunlu Batağan 52, 307, 310
Kızıl Çaylak 50, 307, 312
Kızılgerdan 33, 39, 53, 59, 61, 64, 266, 314
Kızılgerdanlı İncirkuşu 286, 289, 314
Kızıl Kirazkuşu 307, 315
Kızıl Kırlangıç 230, 313
Kızıl Kumkuşu 307, 310
Kızılkuyruk 269, 314
Kızıl Şahin 170, 311
Kızılsırtlı Örümcekkuşu 54, 57, 205, 206, 312
Kızkuşu 108, 310
Kocabaş 31, 54, 61, 64, 292, 315
Kocagöz 307, 310
Korsanmartı 307, 310
Kuğu 52, 53, 76, 309
Kukumav 69, 184, 312
Kulaklı Batağan 56, 106, 307, 310
Kulaklı Orman Baykuşu 42, 181, 312
Kum Kırlangıcı 227, 313
Kumru 18, 64, 95, 96, 97, 309
Kuyrukkakan 18, 41, 274, 275, 314
Kuzey Gümüş Martısı 307, 310
Kuzgun 16, 64, 214, 216, 313
Küçük Ağaçkakan 54, 61, 64, 192, 193, 312
Küçük Akbaba 19, 162, 311
Küçük Ak Balıkçıl 158, 311
Küçük Akgerdanlı Ötleğen 54, 244, 313
Küçük Balaban 57, 151, 311
Küçük Batağan 104, 309
Küçük Gümüş Martı 53, 57, 131, 132, 310
Küçük İskete 61, 298, 315
Küçük Karabatak 53, 145, 311
Küçük Karga 39, 62, 64, 186, 213, 313
Küçük Kartal 64, 164, 311
Küçük Kerkenez 196, 312
Küçük Kumkuşu 118, 310
Küçük Kumru 97, 309
Küçük Martı 42, 53, 130, 310
Küçük Orman Kartalı 64, 165, 311
Küçük Sinekkapan 265, 314
Küçük suçulluğu 310
Küçük Suçulluğu 307
Küçük Sumru 307, 311
Küçük Yeşil Ağaçkakan 61, 194, 312

L

Lanius collurio 205, 312
Lanius excubitor 209, 312
Lanius minor 208, 312
Lanius nubicus 207, 312
Lanius senator 206, 312
Lanner Falcon 307, 312
Larus argentatus 307, 310
Larus cachinnans 133
Larus cachinnas 310
Larus canus 132, 310
Larus fuscus 135, 310
Larus marinus 307, 310
Larus michahellis 134, 310
Laughing Dove 97, 309
Leş Kargası 39, 62, 64, 214, 215, 313
Lesser Black-backed Gull 135, 310
Lesser Grey Shrike 208, 312
Lesser Kestrel 196, 312
Lesser Spotted Eagle 165, 311
Lesser Spotted Woodpecker 192, 312
Lesser Whitethroat 244, 313
Levant Sparrowhawk 178, 312
Leylek 17, 26, 40, 41, 46, 47, 54, 58, 63, 143, 279, 311
Limosa limosa 115, 310
Linaria cannabina 295, 315
Little Bittern 151, 311
Little Bustard 307, 309
Little Crake 99, 309
Little Egret 158, 311
Little Grebe 104, 309
Little Gull 130, 310
Little Owl 184, 312
Little Ringed Plover 112, 310
Little Stint 118
Little Stintt 310
Little Tern 307, 311
Locustella luscinioides 239, 313
Long-eared Owl 181, 312
Long-legged Buzzard 170, 311
Long-tailed Tit 221, 313
Loxia curvirostra 296, 315
Lullula arborea 222, 313
Luscinia luscinia 268, 314
Luscinia megarhynchos 267, 314
Luscinia svecica 307, 314
Lymnocryptes 307
Lymnocryptes minimus 310

M

Macar Ördeği 307, 309
Mahmuzlu İncirkuşu 307, 314
Mallard 82, 309
Mareca penelope 81, 309
Mareca strepera 80, 309

Marsh Sandpiper 125, 310
Marsh Tit 220, 313
Marsh Warbler 236, 313
Masked Shrike 207, 312
Maskeli Örümcekkuşu 207, 312
Maskeli Ötleğen 54, 246, 313
Mavi Baştankara 31, 53, 61, 64, 217, 313
Mavigerdan 307, 314
Meadow Pipit 286, 314
Mediterranean Gull 131, 310
Melanocorypha calandra 226, 313
Merlin 200, 312
Merops apiaster 188, 312
Mew Gull 132, 310
Mezgeldek 307, 309
Microcarbo pygmeus 145, 311
Middle Spotted Woodpecker 193, 312
Milvus migrans 177, 312
Milvus milvus 307, 312
Mistle Thrush 259, 314
Montagu's Harrier 175
Montagu's Harrier 312
Monticola saxatilis 307, 314
Motacilla alba 281, 314
Motacilla cinerea 282, 314
Motacilla citreola 284, 314
Motacilla flava 43, 283, 314
Moustached Warbler 307, 313
Muscicapa streata 314
Muscicapa striata 261
Mute Swan 76, 309

N

Neophron percnopterus 19, 162, 311
Netta rufina 307, 309
Northern Goshawk 180, 312
Northern Lapwing 108, 310
Northern Pintail 83, 309
Northern Raven 216, 313
Northern Shoveler 79, 309
Northern Wheatear 274, 314
Numenius arquata 114, 310
Numenius phaeopus 307, 310
Nycticorax nycticorax 152, 311

O - Ö

Oenanthe deserti 307, 314
Oenanthe isabellina 275, 314
Oenanthe melanoleuca 276, 314
Oenanthe oenanthe 274, 314
Oenanthe pleschanka 307, 314
Oriolus oriolus 210, 313
Orman 234
Orman Alaca 312
Orman Alaca Ağaçkakanı 31, 54, 61, 64, 191
Orman Çıvgını 61, 64, 313
Orman Düdükçünü 122, 123, 310
Orman Toygarı 222, 313
Ortanca 193
Ortanca Ağaçkakan 31, 312
Ortolan Bunting 303, 315
Otis tarda 307, 309
Otus scops 182, 312
Ökse Ardıcı 62, 200, 257, 258, 259, 314
Öter Ardıç 62, 64, 257, 258, 314
Ötücü Kuğu 307, 309

P

Paçalı Şahin 171, 311
Pallas's Gull 307, 310
Pallas's Leaf Warbler 307, 313
Pallid Harrier 176, 312
Pallid Swift 89, 309
Pandion haliaetus 160, 311
Parasitic Jaeger 307
Parus major 218, 313
Pasbaş Patka 307, 309
Passer domesticus 277, 314
Passer hispaniolensis 279, 314
Passer montanus 278, 314
Pastor roseus 254, 314
Peçeli Baykuş 307, 312
Pelecanus onocrotalus 159, 311
Peregrine Falcon 202, 312
Periparus ater 219, 313
Pernis apivorus 172, 311
Petronia petronia 307, 314
Phalacrocorax aristotelis 54, 146, 311
Phalacrocorax carbo 54, 147, 311
Phasianus colchicus 75, 309
Phoenicurus ochruros 270
Phoenicurus ochuros 314
Phoenicurus phoenicurus 269, 314
Phylloscopus collybita 232, 313
Phylloscopus inornatus 307, 313
Phylloscopus proregulus 307, 313
Phylloscopus sibilatrix 234, 313
Phylloscopus trochilus 233, 313
Pica pica 212, 313
Picus canus 194, 312
Picus viridis 195, 312
Pied Avocet 307, 310
Pied Wheatear 307, 314
Platalea leucorodia 149, 311
Plegadis falcinellus 148, 311
Pluvialis apricaria 109, 310
Pluvialis squatarola 110, 310
Podiceps auritus 56, 307, 310
Podiceps cristatus 105, 309
Podiceps grisegana 310
Podiceps grisegena 52, 307
Podiceps nigricollis 106, 310
Poecile palustris 220, 313
Porzana parva 99, 309
Porzana porzana 100, 309
Poyrazkuşu 307, 310
Prunella modularis 280, 314
Psittacula eupatria 204, 312
Psittacula krameri 203, 312
Puffinus yelkouan 142, 311
Pufla 307, 309
Purple Heron 156, 311
Pygmy Cormorant 145, 311
Pyrrhula pyrrhula 307, 315

R

Rallus aquaticus 98, 309
Recurvirostra avocetta 307, 310
Red-backed Shrike 205, 312
Red-breasted Flycatcher 265, 314
Red-crested Pochard 307, 309
Red Crossbill 296, 315
Red-footed Falcon 198, 312
Red Kite 307, 312
Red-necked Grebe 307, 310
Red-rumped Swallow 230, 313
Red-throated Pipit 289, 314
Redwing 257, 314
Regulus ignicapilla 249, 313
Regulus regulus 248, 313
Remiz pendulinus 307, 313
Richard's Pipit 307, 314
Ring Ouzel 260, 314
Riparia riparia 227, 313
Rissa tridactyla 307, 310
Rock Bunting 307, 315
Rock Dove 92
Rock Pigeon 309
Rock Sparrow 307, 314
Rook 214, 313
Rose-ringed Parakeet 203, 312
Rosy Starling 254, 314
Rough-legged Buzzard 171, 311
Ruff 116, 310
Rufuos-tailed Scrub Robin 307, 314

S - Ş

Saka 31, 54, 59, 61, 64, 297, 315
Sakallı Akbaba 46, 50, 307, 311
Sakarca 51, 52, 307, 309
Sakarmeke 52, 53, 102, 309
Saker Falcon 307, 312
Saksağan 31, 39, 57, 179, 212, 313
Sand Martin 227, 313
Sandwich Tern 136, 310
Sardinian Warbler 246, 313
Sarıasma 210, 313
Sarıbacaklı Kumkuşu 307, 310
Sarıbaşlı Kuyruksallayan 284, 314
Sarı Çinte 301, 302, 315
Sarıkaşlı Çıvgın 307, 313

Sarı Kuyruksallayan 43, 283, 314
Sarı Mukallit 241, 313
Savi's Warbler 239, 313
Saxicola maurus 273, 314
Saxicola rubetra 271, 314
Saxicola rubicola 272, 314
Saz 313
Saz Delicesi 173, 311
Saz Kamışçını 56, 235, 236, 237, 239, 240
Scolopax rusticola 119, 310
Sedge Warbler 238, 313
Semicollared Flycatcher 264, 314
Serçe 15, 18, 31, 39, 192, 251, 277, 278, 279, 280, 290, 293, 301, 314
Serinus serinus 298, 315
Short-eared Owl 307, 312
Short-toed Snake Eagle 163, 311
Short-toed Treecreeper 252, 314
Sığır Balıkçılı 154, 311
Sığırcık 41, 58, 62, 253, 314
Sıvacı 18, 61, 64, 251, 314
Siberian Stonechat 273, 314
Sibirya Taşkuşu 273, 314
Sitta europaea 251, 314
Slender-billed Gull 128, 310
Slyvia communis 313
Somateria mollissima 307, 309
Song Thrush 258, 314
Söğütbülbülü 232, 233, 234, 313
Söğüt Serçesi 277, 279, 314
Spanish Sparrow 279, 314
Spatula clypeata 79, 309
Spatula querquedula 78, 309
Spilopelia senegalensis 97, 309
Spinus spinus 299, 315
Spotted Crake 100, 309
Spotted Flycatcher 261, 314
Spotted Redshank 307, 310
Squacco Heron 153, 311
Steppe Eagle 168, 311
Stercorarius parasiticus 307, 310
Sterna hirundo 137, 311
Sternula albifrons 307, 311
Stock Dove 94
Streptopelia decaocto 96, 309
Streptopelia turtur 95, 309
Strix aluco 183, 312
Sturnus vulgaris 253, 314
Suçulluğu 119, 120, 310
Sukılavuzu 98, 309
Sumru 41, 52, 130, 136, 137, 311
Suna 77, 309
Sutavuğu 41, 57, 101, 102, 309
Sülün 29, 31, 53, 57, 75, 309
Sürmeli Çalıkuşu 61, 249, 313
Sürmeli Kervançulluğu 307, 310
Sürmeli Kumkuşu 307, 310
Sylvia atricapilla 242, 313
Sylvia borin 243, 313
Sylvia communis 245
Sylvia curruca 244, 313
Sylvia melanocephala 246, 313
Sylvia nisoria 247, 313
Syrian Woodpecker 190, 312
Şahin 16, 17, 19, 31, 35, 47, 54, 61, 64, 164, 169, 170, 171, 172, 180, 216, 311
Şah Kartal 167
Şah Kartalı 311
Şakrak 307, 315

T

Tachybaptus ruficollis 104, 309
Tachymarptis melba 90, 309
Tadorna tadorna 77, 309
Tahtalı 93, 309
Tarla Ardıcı 256, 314
Tarla Çintesi 300, 315
Tarlakuşu 223, 224, 313
Taşkızılı 307, 314
Taşkuşu 54, 57, 271, 272, 273, 314
Tawny Owl 183, 312
Tawny Pipit 285, 314
Temminck's Sandpiper 307, 310
Tepeli Guguk 307, 309
Tepeli Karabatak 53, 54, 55, 146, 311
Tepeli Patka 86, 309
Tepeli Toygar 223, 224, 313
Tetrax tetrax 307, 309
Thalasseus sandvicensis 136, 310
Thrush Nightingale 268, 314
Toy 307, 309
Tree Pipit 287, 314
Tringa erythropus 310
Tringa glareola 123, 310
Tringa nebularia 126, 310
Tringa ochropus 122, 310
Tringa stagnatilis 310
Tringa Stagnatilis 125
Tringa totanus 124, 310
Tringra erythropus 307
Troglodytes troglodytes 250, 313
Tufted Duck 86, 309
Turdus iliacus 257, 314
Turdus merula 255, 314
Turdus philomeles 314
Turdus philomelos 258
Turdus pilaris 256, 314
Turdus torquatus 260, 314
Turdus viscivorus 259, 314
Turna 103, 309
Tyto alba 312
Tyto Alba 307

U

Ulu Doğan 307, 312
Upupa epops 185, 312
Uzunbacak 107, 310
Uzunkuyruklu Baştankara 61, 64, 221, 313
Üveyik 31, 54, 95, 309

V


Vanellus vanellus 108, 310

W

Water Pipit 288, 314
Water Rail 98, 309
Western Barn Owl 307, 312
Western Cattle Egret 154, 311
Western Jackdaw 213, 313
Western Marsh Harrier 173, 311
Western Osprey 160, 311
Western Yellow Wagtail 283, 314
Whimbrel 307, 310
Whinchat 271, 314
Whiskered Tern 138, 311
White-backed Woodpecker 307, 312
White Stork 143, 311
White-tailed Eagle 307, 311
White Wagtail 281, 314
White- winged Tern 311
White-winged Tern 139
Whooper Swan 307, 309
Willow Warbler 233, 313
Woodchat Shrike 206, 312
Woodlark 222, 313
Wood Pigeon 93, 309
Wood Sandpiper 123, 310
Wood Warbler 234, 313

Y

Yalıçapkını 41, 52, 187, 312
Yaz Atmacası 178, 312
Yelkouan shearwater 311
Yelkouan Shearwater 142
Yelkovan 52, 53, 58, 142, 311
Yellow-browed Warbler 307, 313
Yellowhammer 301, 315
Yellow-legged Gull 134, 310
Yeşil Ağaçkakan 31, 54, 61, 64, 194, 195, 312
Yeşilbacak 126, 310
Yeşilbaş 53, 80, 82, 309
Yeşil Düdükçün 122, 310
Yeşil Papağan 62, 203, 204, 312
Yılan Kartalı 163, 311



Ülkemizde şimdiye kadar 487 kuş türü gözlenmiştir. 287 tür ise Beykoz sınırları içerisinde görülmüştür. Başka bir deyişle ülkemizdeki kuş türlerinin yarısından fazlası Beykoz'da kayıt altına alınmıştır.

Bu kitapta Beykoz'un önemli tabiat alanları ve başta kuşlar olmak üzere canlı türleri tanıtılmıştır. Kuşların fiziksel özellikleri, hangi zamanda hangi habitatlarda bulunduğu ve beslenmeleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Beykoz Belediyesi

9 786050 678413